


FONDEMENTS

DE LA SCIENCE MÉTHODIQUE

DES MALADIES.



CONFIDENTIAL

THE UNITED STATES OF AMERICA

1988

DECLASSIFIED

FONDEMENTS

DE LA SCIENCE MÉTHODIQUE

DES MALADIES,

*POUR servir de suite à l'essai d'un
système chimique de la science de
l'homme, et d'introduction à la
nosologie méthodique que va bientôt
publier le même Auteur ;*

32362

Par J. B. TH. BAUMES,

Ci-devant Professeur de médecine en l'Université de
Montpellier, etc. ; etc.

Aujourd'hui Professeur de pathologie, météorologie et
nosologie à l'école de médecine de Montpellier ; Secré-
taire perpétuel de l'Institut de santé et de salubrité
du Gard ; Membre des Sociétés de médecine de
Paris, Bordeaux, Marseille ; du Lycée du Gard et
de Vaucluse, de la Société des sciences et président de
la Société de médecine-pratique de Montpellier, etc.

TOME SECOND.

A MONTPELLIER,

Chez l'Auteur et à l'École de Médecine.

AN X — 1801.

REVUE MEDICALE

DE LA SOCIÉTÉ MEDICALE

DE PARIS

Par J. B. BAUDET, Médecin en chef de l'Hôtel-Dieu de Paris, et de la Faculté de Médecine de Paris.



TOME SECOND.

A PARIS, CHEZ L'ÉDITEUR, M. DEBAILLON.

chez l'Éditeur, à l'École de Médecine.

AN X - 1801.

EXPOSÉ MÉTHODIQUE

*Des classes, des genres, des espèces
et des formes des maladies.*

CLASSE DEUXIÈME.

CETTE deuxième classe est destinée aux maladies dans lesquelles l'état du système paroît lié avec un vice remarquable dans la quantité d'oxigène qui entre dans le corps des animaux vivans pour l'entretien et la coordination de leurs fonctions.

OXYGÉNÈSES.

Eth. Dénomination tirée de deux mots, dont l'un est *oxigène* s'élidant avec le dérivé de *nosos*, terme grec qui veut dire *maladie*.

Dans les considérations générales qui ont précédé la première classe, on a vu le calorique, dont il faut une si grande partie pour

l'entretien de la vie , mériter la principale attention ; relativement à l'explication des phénomènes propres à jeter du jour sur l'étiologie des maladies qui composent cette classe. Les autres substances élémentaires n'ont concouru que très-secondairement à les produire et à en varier la nature. En jetant un coup-d'œil sur la théorie de cette seconde classe , nous allons voir l'oxigène prendre le premier rang dans l'analyse sommaire des phénomènes qui peuvent nous frapper ; sans toutefois en exclure le concours des autres principes qui influent sur les différences que présentent les maladies d'une même classe.

Cette réflexion mérite d'autant plus d'être faite , que l'on peut dire que le calorique est le premier principe de la nature ; que toutes les compositions ou décompositions qui ont lieu et qui varient la scène du monde , ne consistent en dernier résultat que dans le dégagement ou l'absorption du calorique , ou , en d'autres termes , dans les effets propres au changement de température. Cependant le calorique , malgré ce qui vient d'être dit , n'a pas toujours la première part dans la cause des phénomènes dus à la série des mouvemens et

des actes chimiques qui s'opèrent ; et c'est sous ce rapport que nous avons classé, sous les effets généraux de l'oxygène, plusieurs circonstances qui vont être brièvement retracées.

Le rôle que joue l'oxygène dans les divers phénomènes de la nature, est aujourd'hui connu de tous ceux qui ont la plus légère connaissance en chimie pneumatique. On sait que cet être singulier et unique en propriétés diverses, fondu et tenu en dissolution dans le calorique et dans la lumière, constitue un gaz connu sous le nom d'*air vital* ; et si un composé a jamais mérité ce nom, c'est sans doute celui qui est strictement nécessaire à l'entretien de la vie ; sans lequel il est impossible d'exister ; et qui est le principal agent des combinaisons qui se font, à tous les instans, dans l'économie des animaux pour l'entretien et la série coordonnée de leurs fonctions.

L'oxygène ne parvenant (a), en grande par-

(a) Il y parvient en état de radical à l'aide des alimens. M. Josse, dans son traité de la chaleur animale, considère l'oxygène sous un rapport plus précieux encore qu'on ne l'a fait avant lui, puisque, suivant

tie , dans les corps vivans que sous la forme de gaz , produit des effets complexes , c'est-à-dire , des effets résultans de plusieurs principes combinés. Les organes et les diverses parties soit liquides , soit solides des animaux étant fort avides de la base ou du radical de ce gaz , celui-ci doit se décomposer dès qu'il est en contact avec les substances qui l'attirent par le degré d'affinité qui se trouve entr'elles.

Un premier phénomène de cette décomposition est la liberté du calorique , de la lumière ; conséquemment un changement de température ; et avec ce changement naît une cause de combinaisons nouvelles qui n'ont lieu qu'en vertu de la température et du degré de pression atmosphérique. Encore cette pression est-elle subordonnée au calorique , puisque la compression ou condensation et la dilatation ou raréfaction de l'air atmosphérique sont dépendans de cette substance.

L'oxygène , à raison de ce premier ordre

cet auteur , les fonctions du poumon sont presque exclusivement oxigénantes ; la caloricité dépendant plus immédiatement des phénomènes de la digestion.

de phénomènes ou d'effets , est tellement stimulant , qu'il excite fortement les solides du corps vivant , augmente la densité de certaines parties : ce qui tient à la fixation du radical du gaz oxigène ; accroit la fluidité de certaines autres : ce qui dépend de l'action du calorique ; qu'enfin il modifie la couleur : ce qui est imputable , en grande partie , à l'action de la lumière.

La fixation de l'oxigène se fait par une opération que l'on nomme *combustion* , et ses produits sont la formation d'un oxide , d'un acide ou d'un sel. Les parties oxidées deviennent plus pesantes ; les substances acidifiées acquièrent une saveur nouvelle ou des qualités qui leur sont propres selon que ces acides sont concrêts , fluides ou gazeux.

Ces principes communs à la chimie morte et à la chimie vivante sont démontrés relativement au premier point de vue ; ils le sont aussi, sous le second, par les faits que l'on possède et qui sont plus ou moins positifs.

On a observé que, si l'on place, sous une cloche pleine de gaz oxigène, un animal à sang chaud ; sa respiration s'accélère , sa poitrine

se dilate à un point considérable , le cœur et les artères se contractent avec force , ses yeux deviennent rouges et saillans , la sueur coule de toutes parts , et la température de tout son corps augmente.

Ainsi quand le gaz-oxygène se décompose dans les corps des animaux , il s'y comporte d'après des lois physiques et chimiques. Son radical se fixe en retenant une portion de son calorique (a) ; mais la plus grande partie de ce principe se dégage , se répand dans le système et produit de la chaleur.

Or, tandis que les animaux vivans s'échauffent et augmentent de température en s'oxygénant , comment pourroit-on avancer que la respiration , qui est une grande fonction calorinante , quoiqu'elle ne soit pas exclusive , sert à rafraîchir le sang et à diminuer la

(a) M. BRUGNATELLI , qui paroît avoir bien saisi cette idée , a insisté sur la nécessité de distinguer le véritable oxygène ou la base pure et isolée de l'air vital , de l'oxygène passé à l'état concrèt avec une portion de calorique , qu'il propose d'appeler et qu'il nomme lui-même *thermoxigène*. Voyez *journal de physique* , réflexion sur les différences qui se trouvent entre l'oxygène et le *thermoxigène* , tom. LIII , pag. 353.

température ? Seroit-ce parce que la première impression de l'air sur les surfaces du corps, de la bouche et des bronches paroît réellement rafraîchissante ? Mais qu'on réfléchisse qu'un air plus ou moins frais se trouvant en contact avec des surfaces échauffées produit au premier instant un sentiment de fraîcheur : sentiment qui se dissipe avec la rapidité de l'éclair et que remplace celui d'une chaleur que tend encore à tempérer une évaporation soutenue.

De pareilles idées se retrouveroient au besoin dans les écrits des anciens.

En effet, dans la haute antiquité on admettoit un *pneuma* continuel dans l'air atmosphérique qui, par l'acte de la respiration, selon ARISTOTE, se combinait dans le cœur avec le sang, et que les artères répandoient dans les parties musculaires. HIPPOCRATE reconnut même l'influence que ce *pneuma* avoit dans la production de la chaleur. La secte pneumatique qui s'établit vers le commencement du premier siècle de l'ère chrétienne, à la tête de laquelle on voit CHRYSIPPE, qu'ATHÉNÉE fit valoir, et qu'ARRETÉE embrassa, expliquoit principalement les phénomènes des corps vivans,

par les effets de cet élément qu'ils appeloient *esprit*, dont la propriété étoit de pénétrer tous les corps et de les conserver dans leur état naturel. Bien long-temps après, le chancelier BACON prouva l'influence du sang imprégné du *pneuma* ou *esprit vital* sur les nerfs; et connoissant assez bien les propriétés de l'air, distinguant entre un air plus ou moins vital, et voyant que la respiration des animaux est aussi nécessaire que la nutrition, il observa, avec l'instinct du génie, que toute la vie peut être regardée comme une sorte de combustion que peuvent seule entretenir l'air et les substances combustibles. MAYOW connut plus clairement la partie respirable de l'atmosphère. HENRI MUND, mort au commencement du dernier siècle, parla même de l'action de l'air sur la peau, et présente son *esprit nitreux* comme l'aliment de l'âme corporelle. Avec l'augmentation des connoissances chimiques, la vérité paroît dans tout son jour, et les phénomènes dus à la décomposition du gaz oxygène se montrent dans leur vraie étendue. Toutes les expériences dans lesquelles l'oxygène a été immédiatement appliqué aux ani-

maux , confirment que cette substance a toujours donné à ceux qui l'ont respiré plus de force , plus d'agilité. Il a ranimé la vigueur des gens foibles et languissans ; il leur a donné de la vivacité et une disposition remarquable à la gaieté. Son action est si prompte et si énergique que , quand on le respire pur , on le sent dans la poitrine comme un esprit ardent ; il semble qu'il brûle. Appliqué sur la peau quand elle est privée de son épiderme après l'effet d'un vésicatoire , il produit de vives douleurs , une sensibilité beaucoup plus exaltée. Aussi lorsqu'on a voulu le faire respirer aux personnes irritées , échauffées , en proie à une inflammation lente et chronique ; ce gaz a-t-il empiré leur situation et augmenté l'intensité de leurs symptômes.

La nature a donc eu son but de réunir dans l'atmosphère le gaz oxygène avec le gaz azote ; afin que le premier ne pût s'introduire qu'en petite quantité par l'acte de la respiration , et qu'il ne portât pas trop loin le principal foyer de la chaleur des animaux. Mais le gaz azote ne se décompose pas dans les poumons ; le gaz oxygène seul éprouve cette décomposition ; et lorsqu'on veut apprécier les

phénomènes de la respiration , lorsqu'il s'agit de l'air atmosphérique relativement à cette fonction ; on ne peut avoir en vue que les résultats que donne la décomposition seule du gaz oxygène. Combien seroit donc vaine et contraire aux moindres connoissances en chimie une objection qui , pour combattre une opinion fondée sur les effets d'une quantité augmentée d'oxygène dans un air atmosphérique condensé , feroit valoir l'augmentation proportionnelle du gaz azote. L'objection se réfute d'elle-même.

En appréciant les effets du gaz oxygène , tenus dans de justes bornes , on se fait une idée de ce que ce gaz peut produire lorsqu'il agit trop activement et par une surabondance relative.

Les corps sont pénétrés d'un principe doué de facultés excitantes. Ce stimulus , appliqué sur des surfaces sensibles doit déterminer des irritations , des combustions , des inflammations qui ne sont que des combustions plus ou moins vives dans leurs effets , leurs symptômes et leurs conséquences.

Les vrais observateurs ne compareront point

les circonstances favorables à la production des maladies inflammatoires avec les qualités physiques et chimiques de la température, sans être frappés du rapport qui se trouve entre les unes et les autres.

Les inflammations règnent dans les régions habitables élevées, dans les sites septentrionaux, pendant les températures boréales (a), c'est-à-dire, dans tous les cas où l'air est plus vif, plus pur, plus condensé, plus piquant; et où, sous un volume donné d'air atmosphérique, le radical du gaz oxigène est plus abondant et se présente en plus grande quantité aux organes qui doivent se l'approprier.

(a) On a cherché, avec quelque prétention, à infirmer cette vérité en avançant que les fièvres inflammatoires sont très-rares en Russie et en Allemagne, fort communes au contraire en Italie et dans les régions ou climats chauds. Mais un homme instruit peut-il réfuter sérieusement un pareil énoncé? sa réponse ne trouve-t-elle pas dans les écrits de LANCISI, de BAGLIVI, d'ORLANDI, de VASTAPANI, de LIND, de CLARKE, d'HILLARY, etc., qui ont si bien tracé le caractère des maladies des climats chauds; ainsi que dans ceux de MERTENS, de SAMOILOWITS, de VANSWIETEN, de STORCK, de DE HAEN qui ont écrit sur les maladies propres à leurs contrées.

Il est hors de doute que lorsque l'air est plus condensé , ou le calorique se combine plus intimement avec lui , ou ce principe est en quantité moindre dans sa masse , par une suite du principe que la solidification relative d'une substance composée se fait toujours au dépens du calorique.

La lumière est nécessaire , elle est indispensable pour une parfaite dispensation de l'oxygène ; sans elle ce principe se combine trop abondamment dans le corps ; il s'y combine d'une manière inégale , insuffisante pour la régularité des fonctions. Aussi ceux qui se soustraient à ses influences favorables , comme une foule de citadins , un grand nombre de femmes , quelques artisans , sont tourmentés par des maladies qui dépendent du désordre de la mobilité soit nerveuse soit musculaire ; et ces phénomènes paroissent liés avec un certain degré d'étiollement qui ne va point jusqu'à l'asthénie , jusqu'à la cachexie par une suite de circonstances qui se rencontrent ici.

Ces résultats sont très-différens de ceux qu'on trouve chez les personnes dont le corps s'oxygène sous l'influence de la chaleur et de la lumière : témoin la vigueur des gens de campagne ,

pagne , des terrassiers , des laboureurs. L'expérience a démontré que l'effet de l'oxigène sur les muscles est de leur donner plus de densité. Il est du moins très-certain que les chairs des animaux suroxigénés ont été trouvées , dans les essais imaginés par le docteur BEDDOES , plus fermes et plus compactes.

Une chose qui vient appuyer ces considérations et qui est relative aux suites de l'oxigénation dans la production des inflammations phlegmoneuses , car les inflammations érysipélateuses ou érythématisques sont d'un autre ordre ; c'est que les membranes affectées d'inflammation s'épaississent à l'instar des métaux qui s'oxydent , et qu'elles deviennent plus consistantes. L'albumine du sang et des autres humeurs acquiert de même une plus grande concrescibilité , quoique ses molécules bien pénétrées de calorique , dans l'inflammation , tendent de plus en plus à s'écarter , parce que l'écartement des molécules par le principe de la chaleur est une loi générale de la nature.

Et voilà ce qui donne la mesure de l'état du sang dans les maladies inflammatoires ; ce qui rend raison de la disposition qu'a le sang inflammatoire de former la coenne ; à résister

plus ou moins aux mélanges refroidissans. Il n'est point jusqu'aux terminaisons possibles et observables de l'inflammation qui ne montrent les effets d'une suroxigénation portée à l'excès ; et combien cette théorie , à laquelle conduit évidemment l'analyse d'une foule de faits , ne se renforce-t-elle pas de l'opinion énoncée par M. JOSSE (a) , que le poumon est l'organe condensateur dominant de l'oxigène ; ainsi que des résultats généraux de cette observation : que les maladies inflammatoires phlegmoneuses sont essentiellement liées avec le degré de condensation de ce principe , et sur-tout avec le degré d'affinité que le sang et ses organes ont pour lui. On pourroit également invoquer les témoignages de REICH , de BUSCH , etc.

Lorsque des faits d'un certain ordre prouvent qu'il y a oxigénation trop forte dans l'économie des animaux ; lorsqu'on est assuré , par des faits d'un autre ordre , qu'en voulant dans ces cas suroxigéner le système , on porte à l'extrême les effets de la suroxigénation : sans doute on réunit , pour faire une preuve , les méthodes analytique et synthétique. Tout le monde

(a) De la chaleur animale , etc.

peut se convaincre qu'un certain régime qu'on ne peut s'empêcher d'appeler oxigénant ; qu'un air trop pur , trop vif , trop vierge selon l'expression de BORDEU , et pour parler le langage chimique , un air suroxigéné ; que la respiration ou une application quelconque de l'oxigène au corps des animaux plus ou moins éloignés de l'état de santé , font le plus grand mal dans les cas plus ou moins prononcés d'inflammation , d'irritation générale ou particulière. Les observations sont déjà suffisamment multipliées sur ce point , pour qu'on n'ose ou qu'on ne puisse point contredire cette assertion.

Un principe incontestable et général est que par-tout où il se forme des acides fluides ou concrets , il y a eu oxigénation ; puisque l'acidité n'est que le résultat de l'oxigène avec une base acidifiable. Une foule de faits , qu'il ne peut venir dans l'esprit de personne de contester , prouve que dans les corps vivans il se forme , soit en santé , soit en maladie , des humeurs ascécentes , même décidément acides ; qu'il y naît des corps étrangers , des calculs qui ne sont autre chose qu'une concrétion d'une substance acide. Donc il est plu-

sieurs circonstances dans lesquelles des esprits ; même prévenus , ne peuvent point nier qu'il ne se passe , dans l'économie des animaux , des opérations oxigénantes ; et que leurs produits ne soient des causes plus ou moins puissantes de maladie.

Les effets de l'oxigène sur les corps vivans , l'existence d'une chimie vivante sauroient ils être mieux prouvés ? Il n'est pas moins incontestable que , tandis que la suroxigénation du système produit des maux caractérisés par plus ou moins d'inflammation , d'irritation , de ce qu'on appelle spasme , enfin d'acidification ; la diminution ou la privation relative d'oxigène doit influencer sur l'état des forces ; et produire des affections frappées d'un caractère particulier d'asthénie et de dégénération.

L'oxigène est fort avide de carbone ; ce principe , abondant dans les végétaux , est introduit dans les corps vivans où , plus ou moins brûlé par l'oxigène , il contribue à la formation des oxides. Mais l'oxigène étant absorbé , employé , dissipé pendant l'exercice des fonctions , le carbone devient libre , il surabonde dans le sang veineux , influe sur la production des sucs gélatineux , bilieux et gras-

et la partie qui reste va, dans les poumons et dans l'organe cutané, se combiner avec l'oxygène et le calorique, et s'échapper sous la forme d'un gaz impropre aux diverses fonctions de l'économie animale vivante.

La diminution respective de l'oxygène influe donc sur l'augmentation respective du carbone et même de l'hydrogène ; dès-lors les fonctions languissent, les mouvemens deviennent foibles, les humeurs se dépravent, et la suspension des actions organiques va jusqu'à produire un état de mort apparente.

Pour se confirmer dans les idées que je viens de présenter, tant sur les effets de l'oxygénation que sur ceux de la désoxygénation, on n'a qu'à considérer que les plongeurs supportent d'autant plus la soustraction de l'air atmosphérique, c'est-à-dire, qu'ils restent d'autant plus long-temps dans l'eau, qu'ils ont oxygéné davantage le système, soit à l'aide de quelques remèdes, soit avec le secours de la nourriture. Ceux qui se trouvent dans le cas de la diathèse inflammatoire, ou voisins d'une inflammation, supportent plus long-temps un air, comme on dit méphitique ; soit qu'un air hydrocarboné contribue à calmer des

parties qui sont dans un état habituel d'irritation; soit que le sang étant plus oxygéné dans ceux qui éprouvent des maladies inflammatoires, la privation, jusqu'à un certain point, d'air vital, leur est moins incommode.

Ne pourroit-on pas citer encore la force extraordinaire des maniaques, leur résistance habituelle aux diverses impressions de l'air, etc. etc. ?

Ainsi donc l'oxygène est une substance très-importante, et sa considération est d'une utilité majeure dans l'étiologie des maladies. Ses phénomènes dans ses rapports de gaz oxygène ou d'oxygène concrét, solide, sont très-nombreux et variés. Soumis à des lois d'attraction ou d'affinité, soumis à des anomalies dans ces mêmes lois, il devient le principe, la cause, l'instrument d'une foule de modifications auxquelles tiennent essentiellement la santé et les maladies, la vie ou la mort.

En excès, l'oxygène occasionne des maladies inflammatoires, spasmodiques, des affections dues à la production des sucs acides, à la formation des corps étrangers; et ces faits pathologiques incontestables viennent à l'appui

de la manière d'agir de l'oxygène dans l'économie des animaux vivans.

En défaut, l'oxygène favorise la génération d'une foule de maladies marquées par la faiblesse, par la prédominance d'autres principes plus ou moins nuisibles au système.

Ainsi considérant l'oxygène dans l'universalité de ses effets, nous verrons naître une classe de maladies à laquelle sera affectée la dénomination d'OXYGÉNÈSES.

Cette classe aura deux sous-classes ; l'une comprendra les maladies par suroxygénation ou par surabondance présumée d'oxygène ; l'autre embrassera les affections par désoxygénation ou par diminution présumée de ce principe.

L'utilité pratique que présente cette classification, est que, dans les maladies par suroxygénation, les méthodes curatives qui emploient des remèdes dont la principale action consiste à céder leur oxygène, sont pernicieuses. Leur indication fondamentale est de priver l'économie animale du principe qui surabonde en elle. La clinique des maladies inflammatoires, celle des affections spasmodiques peut donc être

épurée ; et ce n'est point le seul service que peut rendre à la médecine pratique , une sage application des connoissances chimiques.

Dans les maladies par désoxygénation , aussi débilitantes ou asthéniques , que les maladies par suroxygénation sont actives , excitantes , sthéniques ; il faut oxigéner fortement les corps vivans et se servir de tous les moyens que la nature et l'art donnent pour y parvenir.

Si je ne me trompe , il se rattache aux principes que je viens d'exposer des idées assez claires , assez justes , assez probables pour que je puisse les regarder comme très-propres à faire faire des progrès réels dans l'art de guérir.

Pour nous arrêter dans l'adoption d'une doctrine vraiment lumineuse , on nous citeroit vainement l'exemple d'HIPPOCRATE , dont le nom a percé la nuit des temps en entraînant la vénération des siècles qui se sont écoulés.

Mais les praticiens qui en appellent si gratuitement au grand HIPPOCRATE , et qui se plaisent à dire que ce philosophe n'a donné que des résultats d'observations , oublient , ainsi

que l'a très-éloquemment rapporté le savant FOURCROY (a) , que l'art d'observer , dans l'ancienne Grèce , étoit , comme il sera dans tous les lieux et dans tous les temps , fondé sur un grand nombre de connoissances préliminaires ; qu'HIPPOCRATE avoit réuni toutes les lumières des autres sciences cultivées de son temps ; qu'il étoit un des plus grands physiciens de l'antiquité ; qu'il avoit tout appris ; qu'il n'avoit négligé ni l'histoire naturelle des animaux , ni l'étude de l'air , des météores , des grands phénomènes de la nature ; qu'il en avoit fait l'application à la machine de l'homme ; qu'il avoit même recherché jusqu'à l'influence prétendue des astres ; en un mot qu'il étoit ce qu'un grand médecin doit être et sera toujours , au courant de toutes les connoissances humaines de son siècle , véritable philosophe , profond dans toutes les sciences immédiatement applicables à la connoissance de l'homme ; et que , si peu de médecins ont approché du trône qu'on lui a élevé avec tant de justice , c'est qu'ils ont eu des vues trop courtes et trop rétrécies sur la manière de ce grand homme ; c'est qu'ils ont cru , à tort , qu'il suf-

(a) Encyclop. méthod. ; art. *calorique*. DIXY

fisoit de décrire sèchement les événemens des maladies et des remèdes ; c'est , en un mot , parce que , méprisant en quelque sorte les lumières de toutes les branches de la physique , ils n'ont pu établir , comme l'avoit fait le philosophe de Cos , des bases solides pour élever l'édifice de l'expérience médicale.

Sous-classe première.

DES OXIGÉNÈSES.

Les genres qui composent cette *sous-classe* , destinée aux maladies qu'on peut généralement attribuer à une diminution notable de quantité d'oxygène , sont :

XIII. L'*Anæmie*.

XIV. La *Cyanose*.

XV. La *Blennose*.

XVI. L'*Adynamie*.

XVII. La *Gastrose*.

XVIII. L'*Helminthèse*.

XIX. Le *Stuporisme*.

XX. La *Démence*.

XXI. Le *Goître*.

XXII. La *Dyscinie*.

XXIII. La *Mélancolie*.

Gen. XIII. ANÆMIE.

Eth. d'a , privatif ; et *aima* , sang.

Syn. Anæmie , défaut de sang.

Bibl. PICHLER , *Anæmia theoretice et practice illustrata* ; *Tubing.* 1756.

Car. A la blancheur matte de la peau , au refroidissement , à la foiblesse générale ; se joint un pouls mou , foible et vide.

Rap. Anæmie apparente ; J. F. ISENFLAMM , *de anæmiâ spuria* ; *Erlang.* 1766.

Gen. XIV. CYANOSE.

Eth. de *Cyanos* , bleu ; et *nosos* , maladie.

Syn. Melasictère (de *melas* , noir ; et *icteros* , jaunisse) ; SAUVAGES , cl. X , cachexies ; ord. VI , ictérities ; gen. XXXIII. — SAGAR , cl. I I I , cachexies ; ord. VI , ictérities ; gen. XXXIV.

Maladie bleue ; LENTIN , *rec. périod. de littérature médic. étrang.* , tom. I , pag. 311. — ODIER , *biblioth. germ.* , scienc. et arts , tom. VI , pag. 164.

Car. L'habitude du corps ou seulement le

visage et les extrémités ont une teinte livide et bleuâtre ou noirâtre, avec un degré plus ou moins fort d'asthénie.

Var. A. Mélasictère nuancé; SAUV., loc. cit., esp. 1.

Le visage étoit verd jusqu'au cou, le côté droit du corps étoit noir et le gauche jaune.

B. Mélasictère périodique; SAUV., loc. cit., esp. 3.

La lividité revenoit tous les deux jours.

Gen. XV. BLENNOSE.

Eth. de blenna, mucosité; et nosos, maladie.

Syn. Maladie muqueuse, affection pituiteuse.

Bibl. C. F. KALTSCHMID, de cacochymia pituitosa; Jenæ 1760.

HERLE, diss. de mucos et morbis à mucos oriundis; Lugduni-Batav. 1792.

CH. DARWIN, experiments establishing a criterion between mucaginous and purulent matter, etc.; Edinb. 1780.

Car. Il y a mollesse du poulx, chaleur moins

dre qu'à l'ordinaire ; la matière muqueuse est abondante, et il y a diminution des forces.

Esp. I. Blennose pyrétique.

Syn. Fièvre pituiteuse ou phlegmatique de divers auteurs, notamment de SARCONE, *historia ragionata de mali osservati in Napoli*, etc. part. II ; — de SELLE, *pyretolog.*, Berlin, edit. 3, 1789, pag. 262 ; — de STOLL, *de cognosc. et curand. febr. aphor.* 376 et suiv.

Fièvre catarrhale ou pituiteuse ; GRIMAUD, *cours de fièvres*, tom. III, pag. 69.

Fièvre putride lymphatico-mésentérique, ou fièvre pituiteuse ; BAUMES, *année médicale*, part. I, pag. 213.

Fièvres adeno-méningées ; PINEL, cl. I, fièvres ; ord. III.

Fièvre laïque (cachée) des auteurs barbares.

Bibl. RÆDERER et WAGLER, *de morbo mucoso* ; Gotting. 1762--1765--1783.

TH. W. SCHROEDER, *historia febris bilioso-puitoso putridæ, quæ mense decembri 1783*, etc. *epidemicè grassata est* ; Gotting. 1785.

WIEBERS, *discrimen inter febrim pituitosam*

et biliosam; Gotting. 1789; et coll. de Gottingue, tom. I.

Car. Le pouls est fréquent avec lenteur; la chaleur est légère et sans acrimonie; l'urine est pâle, et dépose souvent une matière muqueuse; il y a sur la langue un sédiment blanc plus ou moins épais; les forces sont abattues et la fièvre, qui est soutenue, marche lentement.

S-esp. I. Continue.

Il y a peu de fièvre quoiqu'elle se soutienne; mais les nuits sont laborieuses et il y a au moins quelque tendance au dérangement des facultés intellectuelles.

Rap. A. Fièvre adéno-méningée continue; PINEL, *loc. cit.*, gen. V.

Amphimerine latique; SAUV., cl. II, ord. II, gen. IV, esp. I.

B. Quotidienne continue des anciens; BURSERI, *instit. med. pract.* tom. I, pag. 397.

Var. A. Fièvre mésentérique pituiteuse; GRIMAUD, *loc. cit.*, pag. 91.

B. Fièvre pituiteuse putride générale; GRIMAUD, *loc. cit.*, pag. 195.

S-esp. II. Intermittente.**Var. A. Quotidienne.**

Invasion de l'accès chaque jour, la nuit ou de grand matin, avec débilité et pâleur de la face ; PINEL, *loc. cit.*, gen. VI.

B. Quarte.

Deux jours d'intervalle ; apyrétique, invasion de l'accès vers le soir, accroissement lent de la chaleur qui succède au froid ; PINEL, *loc. cit.*, gen. VII.

S-esp. III. Rémittente.

Plusieurs caractères de la blennose pyréti-que avec des accès de fièvre intermittente.

Rap. Fièvre rémittente adéno-méningée ;

PINEL, *loc. cit.*, gen. VIII.

Formes.

Sor. 1. Fièvre épiale de GALIEN ; BURSERI, *loc. cit.*, tom. I, pag. 404.

2. Fièvre syncopale humorale d'AVICENNE ; BURSERI, *loc. cit.*, pag. 405.

3. Péripleurmonie catarrhale ; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XXII, esp. 6. Quoiqu'avec une

nuance inflammatoire, elle n'en appartient pas moins aux formes de la blennose.

Esp. II. Blennose apyrétique.

Car. Il y a mollesse et lenteur du pouls, foiblesse des mouvemens, inappétence, crudité des excrétions et autres symptômes qui varient d'après le siège de la congestion muqueuse.

Formes.

Sor. 1. Asphyxie amnio-pituiteuse; la trachée-artère étant remplie de pituite et de la liqueur de l'amnios épaissie. BERHOLDT, obs. sur une cause méconnue jusqu'à présent de l'asphyxie des nouveaux nés; *rec. périod. de littérat. médic. étrang.*, tom. I, pag. 225; et *biblioth. germ.*, tom. I, pag. 327.

2. Dyspermatisme muqueux (l'urètre étant obstrué par un mucus tenace, occasionne l'impuissance d'éjaculation); SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXXI, esp. 4.

3. Anorexie pituiteuse; SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XI, esp. 2.

4. Vomissement pituiteux; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. 26.—PH. A. BOEHMER,

diss.

diss. nonnulla de vomitu pituitoso sistens ; HAL. ad Salam 1778.

5. Hypochondrie pituiteuse ; SAUV. , cl. VIII , ord. I , gen. V , esp. 4.

A. Hypochondrie asthmatique ; SAUV. , cl. VIII , ord. I , gen. V , esp. 7.

6. Épilepsie muco-trachéale ; ARMET , *journ. de médéc.* , juin 1792 ; tom. XCI , pag. 117.

7. Asthme pituiteux.

Asthme pneumonique de WILLIS ; humoral de BAGLIVI ; pituiteux d'HOFFMAN.

C. F. KALTSCHMID , *de asthmate pituitoso* ; Jena 1757.

Il vient par périodes , ayant au commencement de l'accès une toux étouffée , et vers la fin , avec une toux aisée , une abondante expectoration de matière pituiteuse. Cette maladie dégénère en phthisie ; et on l'a vue compliquée avec des symptômes très-angoissans.

A. Asthme humide , SAUV. , cl. V , ord. II , gen. VIII , esp. I.

B. Asthme stomachique ; SAUV. , *ib.* esp. 8.

C. Dyspnée pituiteuse ; SAUV. , cl. V , ord. II , gen. VII , esp. I.

8. Phthisie pituiteuse.

Phthisie pulmonaire pituiteuse ; BAUMES , Tom. II.

traité de la phthisie pulmonaire , tom. II ;
pag. 297 , chap. III , §. 530.

A. MURRAY , de *phthisi pituitosa* ; Gotting. 1776 ; opusc. med. , tom. I , pag. 275 ;
et coll. de BALDINGER , tom. V , pag. 316.

Il y a dyspnée avec une gêne plus marquée de l'expiration , toux grasse , expectoration visqueuse. La fièvre se met insensiblement de la partie , elle entraîne la maigreur , est accompagnée de crachats suspects , et pendant toute la maladie l'anorexie est plus ou moins constante.

A. Phthisie asthmaticque , SAUV. , cl. X , ord. I , gen. I , esp. 5.

B. Anacatharse puriforme ; SAUV. , cl. IX , ord. IV , gen. XXIV , esp. 4. — R. A. VOGEL , de *catharro pharyngis* ; Gotting. 1765.

C. Léthargie pulmonique ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXVIII , esp. 2.

9. Cardialgie pituiteuse ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XX , esp. 2 , var. 2.

10. Colique pituiteuse ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXII , esp. 2.

11. Iléose pituiteux ; SAUV. , cl. IX , ord. II , gen. XIV , esp. 5.

12. Amaurose pituiteuse ; SAUV. , cl. VI , ord. I , gen. IV , esp. 2.

13. Ischurie pituiteuse. *A.* Néphro-phlegmatique ou ischurie rénale pituiteuse ou muqueuse ; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIX, esp. 9.

B. Ischurie urétéro-phlegmatique, ou ischurie urétérique pituiteuse ; SAUV., *ib.* esp. 15.

C. Ischurie cysto-phlegmatique, ou ischurie vésicale muqueuse ; SAUV. *ib.* esp. 25.

D. Ischurie utéro-phlegmatique, ou ischurie urétrale muqueuse ; SAUV., *ib.* esp. 33.

14. Diarrhée pituiteuse ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 4.

Pituitaire ; VOGEL, cl. II, flux ; ord. II, apocénoses ; gen. CXI.

A. Cæliaque muqueuse ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVII, esp. 3.

15. Cataracte muqueuse ; LEVEILLÉ, *rec. périod. de la société de médéc. de Paris*, tom.

XII, pag. 1397.

16. Météorisme gastrique ; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XVIII, esp. 1.

Esp. III. Blennose fluante.

Syn. Blennorrhée, de *blenna*, mucosité ; et *rheo*, je coule.

Car. Excrétion muqueuse plus ou moins

abondante et soutenue par un émonctoire naturel, avec un certain degré de relâchement et de foiblesse.

S-esp. I. Rinorrhée.

Eth. de rhinos, nez ; et rheo, je coule.

[*Syn. Nez morveux.*

Car. L'écoulement vient de la membrane de SCHNEIDER, et se fait jour par le nez, quelquefois par les arrières-narines.

Rap. A. Coryze phlegmatorrâgique ; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXII ; esp. 2.

S-esp. II. Cystirrhée.

Eth. de cystis, vessie ; et rheo, je coule.

Syn. Maladie rare de la vessie ; HOFFMAN, tom. IV, *consil. medic.*, centur. 1^{re}, cas. XCIII.

Fluxion catarrale de la vessie ; LIEUTAUD, *précis de méd.*, édition in-8., tom. I, pag. 596.

Glu ; LINNÉ, cl. IX, évacuatoires ; ord. IV, des parties génitales ; gen. CC.

Catarre de la vessie urinaire ; PINEL, cl.

11 ; phlegmasies , ord. I , des membranes muqueuses ; gen. XIX.

Hypostase muqueuse , suite de la blennorrhagie ; LANG , *gazette salulaire* , ann. 1792 , pag. 237 et 235.

Hémorroïdes muqueuses de la vessie ; SELIGMANN , *de hæmorrhoidibus mucosis in universum* , pag. 18.

Bibl. PARNHAM , *de cystirrhæd* , coll. d'Edimbourg , tom. III , pag. 251.

Car. L'écoulement a lieu par l'urètre chez les personnes des deux sexes , et vient de la vessie avec les urines.

Rap. A. Dysurie muqueuse ; CULLEN , cl. IV , ord. IV , gen. CXXIV , esp. 6.

B. Pyurie muqueuse ; SAUV , cl. IX , ord. III , gen. XXVIII , esp. 6.

C. Pyurie visqueuse ; SAUV. *ib.* esp. 5.

D. Pyurie arthritique ; SAUV. *ib.* esp. 9.

S-esp. III. Phallorrhée.

Eth. de *phallos* , membre viril ; et *rheo* , je coule.

Car. L'écoulement se fait par l'urètre qui

en est le siège propre , sans indices de blennorrhagie syphillitique , ni de gonorrhée.

S-esp. IV. Métrorrhée.

Eth. de *metra* , matrice ; et *rheo* , je coule.

Syn. Fleurs blanches , dénomination vulgaire.

Leucorrhée ; SAUVAGES , cl. IX , flux ; ord. III , de sérosité ; gen. XXIX. — LINNÉ , cl. IX , évacuatoires ; ord. IV , des parties génitales ; gen. CCII. — VOGEL , cl. II , flux ; ord. II , apocénoses ; gen. CXIX. — SAGAR , cl. V , flux ; ord. IV , séreux ; gen. XXIX. — PINEL , cl. II , phlegmasies ; ord. I , des membranes muqueuses ; gen. XXI.

Ménorrhagie blanche ; CULLEN , cl. I , pyrexies ; ord. IV , hémorragies ; gen. XXXIX ; esp. 5.

Bibl. H. ALLEN , de *fluoris albi caractere et notis quibus cum gonorrhœa convenit , vel differt et utriusque curatione* ; 1751.

J. JUNCKER , de *fluore albo titulo quidem et ortu benigno , curatione autem sæpius maligno* ; Halæ 1752.

G. L. ALEFELD , de *fluore albo , ex neglectu fœminarum belgicarum præcipue pro pullante* ; Giessæ 1766.

RAULIN, traité des fleurs blanches ; Paris 1766.

G. VAN DER HESP, de *leucorrhæa* ; 1771.

J. SHORE, de *fluore albo* ; Edinb. 1777.

STOLL, de *fluore albo* ; coll. d'EYEREL, tom. II, pag. 35.

G. KEATING, de *leucorrhæa* ; Edinb. 1780 ; et coll. de WEBSTER, 1781, tom. II, pag. 235.

W. TRNKA, *historia leucorrhææ* ; Vind. 1781.

P. J. M. ZIMMERMANN, de *fluore albo* ; Gotting. 1788.

Car. L'écoulement est fourni par la matrice et se fait par le vagin.

Rap. A. Ménorrhagie incolore ; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. VI, esp. 7.

Hémorroïdes utérines de SENNERT.

B. Leucorrhée américaine ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

C. Leucorrhée indienne ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

Formes.

Sor. I. Hystérie leucorrhœique ; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XX, esp. 4.

S-esp. V. Elytrorrhée.

Eth. d'elytron, vagin ; et rheo, je coule.

Car. L'écoulement qui sort par la vulve ne vient que du vagin.

S-esp. VI. Proctorrhée.

Eth. de *procthos*, fondement, anus; et *rheo*, je coule.

Syn. Hémorroïdes blanches; ALBERTI, de *hæmorrh.*, pag. 248.

Hémorroïdes décolorées, blanches et muqueuses; JUNCKER, *tab.* XIII, §. 2.

Hémorroïdes muqueuses; CULLEN, cl. I, ord. IV, gen. XXXVIII, esp. I, var. B.

Bibl. S. SELIGMANN, de *hæmorrhoidibus albis in universum*; Gotting. 1782. Sect. II, de *hæmorrhoidibus mucosis ani*, pag. 5.

JENECKE, de *hæmorrhoidibus mucosis in specie*; diss. de *hæmorrhoidibus*; Gotting. 1791, §. XXXII, XXXIV.

Car. L'écoulement sort par l'anus et vient des parties qui l'avoisinent; sans indices de diarrhée, de dyssenterie ou de flux cœliaque.

Rap. A. Proctalgie intertrigineuse; MACBRIDE, cl. I, ord. IV, gen XII, esp. 5.

B. Urine pituiteuse (*slymgraveel*); VAN

DER HAAR, *verhandelingen uitgegeeven door de hollandsche der veetenschappen te haarlem*, x deels, etc.; Haarlem 1768; stuck, pag. 17.

Gen. XVI. *ADYNAMIE.*

Eth. d'a, privatif; et *dynamis*, force.

Syn. Maladies de foiblesse, de relâchement; *laxum* des méthodistes; atonie des pathologistes; affections asthéniques de BROWN; débilités ou maladies paralytodées de SAUVAGES, cl. VI; adynamies de VOGEL, cl. VI; débilités de SAGAR, cl. IX.

Bibl. G. E. HAMBERGER, *de atoniæ causis in genere*; Jenæ 1751.

Id. *de atoniâ*; Jenæ 1754.

C. A. G. HELLWIG, *de debilitate corporis humani*; Helmst. 1780.

Car. Langueur ou foiblesse dans l'exercice des fonctions, pouvant aller jusques à leur suspension.

§. I. *Adynamie générale.*

Esp. I. *Asthénie.*

Eth. d'a, privatif; et *sthenos*, force.

S-esp. I. Corporelle.

Syn. Asthénie ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. IV , leipopsychies ; gen. XXI. — LINNÉ , cl. VI , maladies quiétales ; ord. I , défectives ; gen. XCII. — VOGEL , cl. VI , adynames ; gen. (asthénie) CCXXIII ; gen. (torpeur) CCXXIV ; gen. (adynamie) CCXXV. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. IV leipopsychies ; gen. XXI.

Car. Foiblesse des mouvemens volontaires ; la lésion des facultés intellectuelles n'étant que consécutive.

Rap. A. Asthénie native ; SAUV. , loc. cit. , esp. 17.

B. Asthénie américaine ; SAUV. , loc. cit. , esp. 16. Effet de l'action du climat.

Var. A. Asthénie par exercice outré du corps ; G. CH. LUDWIG , *de immoderatis exercitationibus , causa debilitatis in morbis* ; Lips. 1763.

Formes.

Sor. 1. Hémorragie (du nez) passive ; SAUV. ; cl. IX , ord. I , gen. I , esp. 1.

Voyez sur les hémorragies passives, CULLÉN, cl. IV, locales; ord. IV, apocénoses; gen. CXVII, profusion. — LUDWIG, *de nimis hæmorrhagiis, causa debilitatis in morbis*; Lipsiæ 1763.

2. Hémoptysie sphacélique; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. III, esp. VII.

Hémoptysie helvigiennne; SAUV., *ibid* esp. 17.

3. Enterragie 1.^o hépatique.

Hépatirrhée; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. II, de ventre sanguinolens; gen. VIII. — SAGAR, cl. V, flux; ord. II, de ventre sanguinolens; gen. VIII.

Cholérique; LINNÉ, cl. IX, évacuatoires; ord. III, de l'abdomen; gen. CXCI.

A. Hépatirrhée sanglante; SAUV.; *loc. cit.*, esp. 6.

B. Hépatirrhée scorbutique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

C. Dyssenterie scorbutique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. X, esp. 17.

D. Diarrhée hépatirrhéique; CULLÉN, cl. II, ord. III, gen. LXI, esp. 6.

E. Hépatirrhée intestinale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

F. Hépatirrhée mésentérique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

2.^o Méléanique.

Maladie noire.

Melæna; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. II; de ventre sanguinolens; gen. XI. — SAGAR, cl. V, flux; ord. II, de ventre sanguinolens; gen. XI.

Voy. F. HOFFMANN, *de morbo nigro HIPPOCRATIS*; Halæ 1701; et BALDINGER *selecta doct. viror. opuscula*, pag. I.

SIGWART, *de hæmorrhagiâ intestino-hepaticâ*; Tubing. 1758;

S. A. D. TISSOT, *de morbo nigro, schirris viscerum etc.* Laus. 1760 en français par VICOT,

T. M. GASSER, *de morbo nigro HIPPOCRATIS*; Argentor. 1761; et BALDINGER, *loc. cit.*, pag. 24.

I. P. RONNE, *de sanguinis tam fluidi quam in scybalorûm formam coacti, per alyum excretionem*; Erford 1767.

SCHONINGH, *de morbo nigro HIPPOCRATIS*; Groning. 1768; et BALDINGER *ibid*, pag. 42.

H. HALL, *de melænâ*; Edinb. 1782, et *dissert. medic. Edinburg.*, art. 3.

A. Mélène sanguine. Le sang étant pur ou dominant fortement dans les déjections.

A. Mélène hémorragique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

B. Hématémèse noire ; SAUV. , cl. IX , ord. I , gen. IV , esp. 12.

C. Mélæne première d'HIPPOCRATE ; SAUV. , loc. cit. , esp. 5.

D. Mélæne splénique ; SAUV. , loc. cit. , esp. 1.

E. Maladie noire sanguine, essentielle et primitive ; BRIEUDE , *rec. périod. de la société de médecine. de Paris* , tom. I , pag. 441 , obs. 1.

F. Maladie noire sanguine, symptomatique et critique ; BRIEUDE , *ib.* , pag. 442 , obs. 2.

G. Maladie noire sanguine, accidentelle ; BRIEUDE , *ib.* , pag. 443 , obs. 3.

B. Mélæne atrabilieux. Le sang étant mélangé de matières bilieuses plus ou moins altérées.

A. Mélæne atrabilieux ; SAUV. , loc. cit. , esp. 3.

B. Maladie noire atrabilieuse succédanée ; BRIEUDE , loc. cit. , pag. 447 , obs. 5.

C. Maladie noire critique ; BRIEUDE , loc. cit. , pag. 448 , obs. 6.

D. Maladie noire atrabilieuse sénile ; BRIEUDE , loc. cit. , pag. 449 , obs. 7.

5. Ménorrhagie immodérée ; SAUV. ; cl. IX, ord. I, gen. VI, esp. 3.

A. Hystérie ménorrhagique ; SAUV. ; cl. IV, ord. IV, gen. XX, esp. 3.

B. M. HUGVENIN, *de atonia uteri post partum, ejusque sequelâ hæmorrhagiâ* ; Argent. 1770.

6. Hématurie après la transfusion ; SAUV. ; cl. IX, ord. I, gen. V, esp. 13.

7. Hectique des flux ; SAUV. ; cl. II, ord. I, gen. V, esp. II.

8. Rhumatisme dorsal ; SAUV. cl. VII, ord. I, gen. III, esp. II ; par l'abus des plaisirs vénériens.

A. Lumbagie satyriasisque ; SAUV. ; cl. VII, ord. V, gen. XXX, esp. 15 ; par l'abus des femmes.

9. Leucorrhée nabothique ; SAUV. ; cl. IX, ord. III, gen. XXIX, esp. 9.

10. Anorexie exhaustique ; SAUV. cl. VI, ord. II, gen. XI, esp. 8.

A. Anorexie néophytique ; SAUV. ; *ib.* esp. II.

G. G. LUDWIG, *de primarum viarum debilitate* ; Leips. 1748.

11. Flatulence accidentelle ; SAUV. ; cl. IX, ord. IV, gen. XXXIV, esp. 4.

12. Dyspepsie par foiblesse ; S. GOULD, *de ventriculi imbecillitate* ; Edinb. 1755.

13. Vertige inanitique ; HERZ, *versuch über den schwindel etc.* Berlin 1791, esp. 13.

14. Typhé exhaustique ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. IV, esp. 8.

A. Tremblement, typhode ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 19. Symptôme de la fièvre carceraire.

15. Agrypnie sénile ; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 9.

16. Névrose apyrétique asthénique.

A. Spasme par inanition ; A. H. GERNHARD, *de spasmō ab inanitione* ; Lips. 1755.

B. Affections nerveuses et hypochondriaques, 1.^o de WHYTT, *observations on the nature, causes and cure, of those disorders, which have been commonly called nervous, hypochondriac or hysteric, etc.* ; Lond. 1765 ; trad. franç., Paris 1767 ; 2.^o de VITHERS, *observations on chronic weakness, etc.* York 1777.

17. Strabisme buffonien ; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. I, esp. 3.

18. Eclampsie inanitique ; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 8.

A. Eclampsie fiévreuse ; SAUV., *ib.* esp. 15.

Attaquant les enfans de naissance avec grande foiblesse.

19. Convulsion inanitive ; SAUV. , cl. IV ,
ord. III , gen. XIII , esp. 1.

A. Convulsion tonanistique ; SAUV. , *ibid.*
esp. 12.

B. Convulsion hémitone ; SAUV. , *ibid.*
esp. 16.

20. Pulmonie par irritabilité ; WHITE , rech.
sur la nature et les moyens curatifs de la phthi-
sie pulmonaire ou consommation des poudrons ,
trad. de l'angl. par TARDY , Paris 1795--an
III , pag. 119.

A. Consomption pulmonaire de MAY ; *essay*
on pulmonari consumptions , etc. London
1792.

21. Cardialgie bradypeptique ; SAUV. , cl.
VII , ord. IV , gen. XX , esp. 9.

A. Gastrodynie américaine ; SAUV. , cl. VII ,
ord. IV , gen. XXI , esp. 6.

22. Amaurose exhaustique ; SAUV. , cl. VI ,
ord. I , gen. IV , esp. 16.

23. Atrophie nerveuse ; SAUV. , cl. X , ord.
I , gen. XIII , esp. 1.

A. Atrophie latérale ; SAUV. , *ib.* esp. 15.

B. Atrophie sénile ; SAUV. , *ib.* esp. 15.

24. Ischurie polyurique ; SAUV. , cl. X , ord.
III , gen. XIX , esp. 22. Causée pour avoir
retenu trop long-temps son urine.

25. Constipation

25. Constipation par foiblesse; CULLEN, cl. IV, ord. v, gen. CXXIII, esp. 1.

26. Diarrhée acrisique; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XVI, esp. 7.

GLASER, *de incontinentiâ alvi*; Jena 1789.

A. Lienterie secondaire; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XVIII, esp. 5.

27. Ephidrose sanguine; CH. E. ESCHENBACH, *de sudore Christi sanguineo paucâ à principiis medicis*; Rostoch 1766.

28. Enurèse infantile; SAUV., cl. IX, ord. 111, gen. XXVI, esp. 1.

29. Diabète févreux; SAUV., cl. IX, ord. 111, gen. XXV, esp. 7.

30. Phrénésie inanitique; SAUV., cl. 111, ord. 11, gen. XI, esp. 16.

31. Dyssenterie équinoxiale; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. X, esp. 14.

A. Dyssenterie scorbutique; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. X, esp. 17.

32. Pétéchie apyrétique; E. G. GRAF, *de petechiis sine febre*; Gotting. 1775.

33. Ulcères chroniques; LOEFFLER, obs. de médec. et de chirurgie, *en allem.*, Lips. et Altona 1791; *bibl. germ.*, tom. 1, pag. 450.

S-esp. II. Mentale.

Car. Les facultés intellectuelles sont sans énergie ou affoiblies ; et l'asthénie des forces corporelles n'est que consécutive ou secondaire.

Var. A. Asthénie par exercice outré des facultés mentales ; G. CH. LUDWIG, *de nimia animi defatigatione, causâ debilitatis in morbis* ; Lips. 1762.

Formes.

Sor. 1. Tristesse.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. 1, vices de l'imagination ; gen. II.

Car. Abattement moral et état douloureux de l'imagination, éprouvés à l'occasion d'un bien perdu ou que l'on craint de perdre ; et principalement exprimés par la langueur, l'œil abattu et le teint plus ou moins pâle et changé.

Var. A. Affliction.

Voy. VITET, loc. cit., esp. II.

Car. Tristesse avec un degré très-marqué

d'accablement et de sensibilité, quelquefois exprimée par des pleurs.

B. Accablement.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. iv.

Chagrin prolongé; TISSOT, traité des nerfs, etc., tom. II, part. I, pag. 372.

Car. Tristesse soutenue avec un morne silence.

Rap. A. Oubli pathématique; SAUV. cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. 5.

B. Anesthésie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. X, esp. 4.

C. Aphonie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XV, esp. I.

2. Morosité.

Syn. Abattement d'esprit; VITET, cl. V; maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XV.

Morosité; VITET, *ib.* esp. I. — LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. III, privatives; gen. 106.

Car. Inaction de l'imagination, allant quelquefois jusqu'à la privation de cette faculté.

Var. A. Apathie.

Voy. VITET , ib. esp. 11.

Car. Affaïssement de l'imagination , avec cessation de toutes passions.

3. Foiblesse.

Syn. Foiblesse d'esprit ; *VITET* , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. 11 , vices du jugement ; gen. VI.

Car. Facilité à laisser prendre aux autres un empire plus ou moins absolu sur soi-même.

Var. A. Foiblesse d'esprit par crainte ; VITET , ib. esp. 1.

B. Foiblesse d'esprit par amour ; VITET , ib. esp. 11.

C. Foiblesse d'esprit par indolence ; VITET , ib. esp. 111.

4. Radoterie.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. 11 , vices du jugement ; gen. XI.

Car. Foiblesse de jugement qui porte à s'ap-

pesantir sans cesse sur les mêmes objets , et à en rappeler par ses discours les circonstances les plus minutieuses.

5. Minutie.

Syn. Le minutieux ; VITET , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. 11 , vices du jugement ; gen. x.

Car. Disposition du caractère à ne point discerner ce qu'il y a d'essentiel dans les objets et à ne s'attacher qu'aux plus petites circonstances.

6. Irrésolution.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. 11 , vices du jugement ; gen. XIX.

Bibl. DESTOUCHES , comédie de l'irrésolu.

Car. Aptitude habituelle du jugement à suspendre son action , par défaut d'idées distinctes , ou par la crainte de quelque inconvénient souvent supposé.

7. Crainte.

Syn. Crainte ; VITET , maladies de l'esprit ; ord. 1 , vices de l'imagination ; gen. XVII.

29 Appréhension; VITET, *ib.* esp. IX. — TISSOT; traité des nerfs, tom. II, part. I, pag. 389.

Car. Appréhension d'un mal futur, prévu ou présumé, avec trouble et désordre de l'imagination.

Rap. A. Syncope phlébotomique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 4.

30 *Var. A.* Peur.

Syn. Le peureux; VITET, *ib.* esp. VI.

Car. Disposition constante du caractère à s'effrayer, sans cause évidente, principalement pendant la nuit et dans l'obscurité; fréquente chez les enfans, chez les femmes et chez les hommes sans courage.

31 *B.* Lâcheté.

32 *Voy.* VITET, *ib.* esp. VII.

Car. Mouvement inquiet de l'imagination, habituel ou passager, qui porte à fuir à l'approche du danger qu'il faudroit vaincre.

33 *C.* Poltronnerie.

34 *Voy.* VITET, *ib.* esp. VIII.

Car. Mouvement inquiet de l'imagination ; habituel ou passager , qui empêche d'aller au-devant du péril qu'il faut supporter.

D. Pusillanimité.

Voy. VITET, *ib.* esp. x.

Car. Disposition habituelle de l'imagination qui porte à manquer de résolution , de courage et de fermeté , même dans les circonstances les moins difficiles.

E. Timidité.

Syn. Timidité ; VITET, *ib.* esp. xi.

Le craintif ; VITET, *ib.* esp. xii.

Bibl. MARIVAUX, comédie du legs.

Car. Crainte déplacée de paroître et de parler devant quelqu'un ; ordinairement avec contenance embarrassée , voix foible ou tremblante , et confusion dans les idées.

8. Défiance.

Syn. Méfiance ; VITET, cl. v , maladies de l'esprit ; ord. ii , vices du jugement ; gen.

Défiance ; VITET , *ib.* esp. 1.

Car. Disposition habituelle à douter des vertus d'autrui et à craindre d'être trompé.

9. Crédulité.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. 11 , vices du jugement ; gen. iv.

Car. Aptitude constante à adopter sans examen toutes les idées qu'on nous suggère , et à croire les choses les moins vraisemblables.

10. Paresse.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. 11 , vices du jugement ; gen. v.

Car. Disposition soutenue à rester dans le repos , et à s'abandonner , avec une sorte de plaisir , à l'inaction.

Var. A. Fénéantise.

Voy. VITET , *ib.* esp. 1.

Car. Éloignement invincible pour le travail du corps et de l'esprit.

B. Nonchalance.

Syn. Nonchalance ; VITET , *ib.* esp. II.

Indolence ; VITET , *ib.* esp. III.

Car. Aptitude constante et involontaire à n'agir qu'avec lenteur et mollesse , même avec indifférence.

II. Volupté.

Syn. Le voluptueux ; VITET , cl. V , maladies de l'esprit ; ord. I , vices de l'imagination ; gen. X.

Car. Habitude dominante de rechercher les plaisirs des sens , et d'accroître par là ses jouissances.

Var. A. Mollesse.

Syn. Mollesse ; VITET , *ib.* esp. I.

Efféminé ; VITET , *ib.* esp. II.

Car. Disposition permanente à savourer tranquillement les plaisirs des sens , avec repugnance à faire le moindre effort pour se les procurer.

B. Sybaritisme.

Car. Trouble involontaire avec foiblesse de l'esprit et des sens à la vue de ceux qui se livrent à un travail corporel même ordinaire.

Esp. II. Lipothymie.

Eth. de *leipo*, je manque ; et *thymos* ; esprit.

Syn. Lipothymie ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. IV , leipopsychies ; gen. XXII. — LINNÉ , cl. VI , maladies quiétales ; ord. I , defectives ; gen. XCH. — VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLXXIII. — CULLEN , cl. II , névroses ; ord. II , adynamies ; gen. XLIV. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. IV ; leipopsychies ; gen. XXII.

Bibl. C. T. BRAUSER , *an lipothymia venæ sectioni semper sine aliquâ probabili causâ superveniens ab ea abstinere jubeat* ; Gotting. 1756.

Car. Abattement subit et momentané des forces , n'allant pas jusques à supprimer tout à fait le pouls et les forces.

Rap. Lipothymie stomachique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. II.

Esp. III. Syncope.

Eth. de *syncopto* , je tombe.

Syn. Syncope ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ;

ord. IV , leipopsychies ; gen. XXIII. — LINNÉ ,
cl. VI , quiétales ; ord. I , défectives ; gen.
XCIV. — VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen.
CCLXXIV. — CULLEN , cl. II , névroses ; ord.
II , adynamies ; gen. XLIV. — SAGAR , cl. IX ,
débilités ; ord. IV , leipopsychies ; gen. XXIII.

Bibl. A. WESTPHAL , *de animi deliquiis ;*
Gryphisw. 1764.

HARE , *de syncope ;* *Edinb.* 1782 ; et coll.
d'Edimbourg , tom. IV , pag. 279.

Car. Abattement extrême des forces ; le
mouvement du cœur étant insensible ou sus-
pendu.

Rap. A. Syncope stomachique ; SAUV. , *loc.*
cit. , esp. 13.

B. Syncope inanitique ; SAUV. , *ibid* esp. I.

C. Éphidrose syncoptique ; SAUV. , cl. IX ,
ord. III , gen. XX , esp. 4.

Esp. IV. *Asphyxie.*

Eth. d'a , privatif ; et *sphygmos* , poul.

Syn. Asphyxie ; SAUVAGES , cl. VI , débili-
tés ; ord. IV , leipopsychies ; gen. XXIV. —
LINNÉ , cl. VI , quiétales ; ord. I , défectives ;
gen. XCV. — VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen.

CCLXXV. — CULLEN, cl. II, névroses ; ord. II, adynamies ; gen. XLIV. — SAGAR, IX, débilités ; ord. IV, leipopsychies ; gen. XXIV.

Bibl. J. J. BRUHIER, dissertation sur l'incertitude des signes de la mort ; Paris 1742 et 1745, dern. édit. en 1749.

CH. E. ESCHENBACH, *de apparenter mortuis* ; Rostoch 1766.

A. DE HAEN, *de auxiliis præstandis his, qui aut in aquâ, aut aliis de causis suffocati, sive morti propinqui videntur, sive veram mortem simulant* ; *rat. med. pars* 13, tom. VIII, édit. de Par. 1771, pag. 349. — *Id.* tom. VIII, *pars* II, pag. I. — *Id.* tom. IX, pag. 187.

GARDANE, avis au peuple sur les asphyxies, etc. ; Paris 1774 ; et Catéchisme sur les morts apparentes dites *asphyxies* ; Paris 1781, en allem. ; Berlin 1787.

HUFELAND, *dissertat. medic. sistens usum vis electricæ in asphyxiâ*, et. Gotting. 1783.

ENGELMAN, *cur rarum sit suffocatos, submersos et laqueo suspensos vitæ reddi*, etc. ; Lipsiæ 1787.

THIERRY, la vie de l'homme respectée et défendue dans ses derniers momens, etc. ; Paris 1787.

WANTERS , *respondum ad quæsitum quærum medica , tum politica præsidia adversus periculosos inhumationum præfestinarum abusus* , etc. ? Bruxell. 1787.

PORTAL , observ. sur les effets des vapeurs méphitiques dans l'homme , sur les noyés , sur les enfans qui paroissent morts en naissant , etc. , 6.^e édit. in-8° ; Paris 1787.

STEINFELD , *de signis mortuis diagnosticis dubiis cautè admittendis et reprobandis* ; Jena 1788.

DE PRÉVINAIRE , traité sur les asphyxies ; Bruxelles 1788.

KITE , *an essay on the recovery of the apparently dead* , etc. ; Lond. 1788.

E. GOODWIN , *the connection of life with respiration* , etc. ; London 1788 ; en français par HALLÉ.

HERZ , etc. , *uber die fruhe beerdigung der juden* , etc. ; Berlin 1788.

EHRHART , *de asphyxiâ neophytorum* ; Memmingen 1789.

HOFFMAN , *uber die den scheintodt* , etc. ; Coburg. 1790.

J. CURRY , *observations on apparent death* , etc. , Edinb. 1799.

Car. Asthénie portée jusques à l'état de mort apparente.

S-esp. I. Pulmonaire.

Syn. Asphyxie pulmonaire ; HALLÉ, *compte rendu à la classe des sciences mathématiques et physiques de l'institut national.....*, par la commission nommée pour examiner et vérifier les phénomènes du galvanisme.

Car. L'asphyxie est superficielle ; toutes les parties du corps sont irritables ; les fonctions seules de l'organe de la respiration sont abolies.

Rap. A. Asphyxie néophytique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 17.

S-esp. II. Corporelle.

Syn. Asphyxie corporelle ; HALLÉ, *ib.*

Car. L'asphyxie est profonde ; l'irritabilité de tout le corps est détruite.

Var. A. Asphixie des noyés.

Bibl. ROEDERER, *observ. de submersis aquâ* ; Gotting. 1760 ; et *opusc. med.* , tom. I , pars II , pag. 337.

ISNARD , le cri de l'humanité en faveur des personnes noyées , etc. Paris 1762.

J. P. EBHERARD, *de submersorum vitâ restituendâ* ; Halæ 1767.

CHAMPEAUX et FAISOLE , expériences et observations sur la cause de la mort des noyés , etc. ; Paris 1768.

PIA , détail des succès obtenus sur les noyés , etc. ; Paris 1772 à 1789.

J. DONNEL , *de submersis* ; Edinb. 1784 ; et *diss. medic.* , Edinb. , art. 23.

GOODWIN , *de morbo , morteque submersorum investigandis* , etc. ; Edinb. 1786.

VOGEL , *diatribe medico-politica , de causis quare tot submersi in vitam non revocentur* ; Hambourg 1790.

P. FINE , de la submersion , ou recherches sur l'asphyxie des noyés , etc. ; Paris an VIII.

B. Asphyxie des suffoqués.

Bibl. ROEDERER , *de suffocatis* ; Gotting. 1754 ; et *opusc. medic.* , tom. I , pars II , pag. 283. — *De infantibus in partu suffocatis* ; Gotting. 1760 , *ib.* pag. 345.

J. H. STOLTE , *de morte suspensorum , aliisque huc spectantibus* ; Groning. 1766.

CHAUSSIER , réflexions sur les moyens propres à déterminer la respiration dans les enfans qui naissent , sans donner aucun signe

de vie , etc. ; *hist. et mém. de la société roy. de méd.* , ann. 1780--81 ; Paris 1785 , pag.

§. 2. *Adynamie particulière*

Esp. V. Dysopie.

Eth. de *dys.* , difficilement ; et *ops* , œil.

Syn. Amblyopie (d'*amblys* , émoussé ; et *ops* , œil) ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. I , dysesthésies ; gen. III. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. I , dysesthésies ; gen. I.

Dysopie ; CULLEN , cl. IV , locales ; ord. I , dysesthésies ; gen. XCIV.

Bibl. FR. B. DE SAUVAGES , de *amblyopia* ; Monsp. 1760.

Car. Vue foible , les parties qui servent à la vision conservant leur transparence.

S-esp. I. Myopique.

Syn. Myopie (de *myo* , je ferme ; et *ops* , œil) ; LINNÉ , cl. X , difformes ; ord. VII , déformations ; gen. CCCIX. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. I , dysesthésies ; gen. XCIV , esp. III.

Myopiase , VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DXV.

Vue courte , vue de jeunes gens.

Bibl. G. CH. DETHARDING , *de myopiâ et presbyopiâ* ; Rostoch 1756.

Car. Les objets ne peuvent être vus qu'à une courte distance.

Rap. A. Amblyopie myopique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

S-esp. II. Nyctalopique.

Syn. Nyctalopie (de *nyx* , nuit ; et *ops* ; œil) ; cécité nocturne ; héméralopie des Grècs.

Bibl. E. A. DE BERGEN , *de nyctalopiâ seu cæcitate nocturnâ* ; *Francofurt. ad Viad.* 1754 ; et coll. de HALLER , tom. 1 , pag. 359.

CHAMZERU , recherches sur la nyctalopie ou l'aveuglement de nuit , etc. ; *mém. de la société roy. de médec.* , ann. 1786 , tom. VIII , pag. 130.

VALENTIN , *dissert. medico-chirurg. de strumâ , bronchocele dictâ , et de hemeralopiâ* ; Nancy 1787.

Car. Les objets ne peuvent être vus que pendant le jour.

Rap. A. Amblyopie crépusculaire ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

B. Amblyopie absolue ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 7.

C. Goutte sereine nocturne épidémique, ou nyctalopie ; DUPONT, *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*, tom. II, pag. 80.

S-esp. III. Colorique.

Car. Il y a impossibilité de distinguer les couleurs.

Obs. de JOHN HADDART, *transact. philosoph.*, vol. LXVII.

Esp. VI. Dysosmie.

Eth. de *dys*, difficilement ; et *osme*, odeur.

Syn. Anosmie ; voy. le genre *paralysie*, l'anosmie des nosologistes confondant l'affoiblissement et l'abolition du sens de l'odorat.

Car. Affoiblissement de la faculté à laquelle est due la perception des odeurs.

Esp. VII. Dysgeustie.

Eth. de *dys*, difficilement ; et de *geysis*, goûter.

Syn. Ageustie ; voyez le genre *paralytie*, l'ageustie des nosologistes comprenant la débilité et la perte du goût.

Car. Affoiblissement de la faculté à laquelle est due la perception des saveurs.

Esp. VIII. *Dysecœe.*

Eth. de *dys*, difficilement ; et *acouo*, j'entends.

Syn. Dysecœe ; SAUVAGES, cl. VI, débilités ; ord. I, dysesthésies ; gen. VII. — VOGEL, cl. VI, adynamies ; gen. CCXLVI. — SAGAR, cl. IX, débilités ; ord. I, dysesthésies ; gen. XCVI.

Car. Affoiblissement de la faculté à laquelle est due la perception des sons.

Var. A. Dysecœe myringique (causée par l'atonie de la membrane du tympan) ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

B. Dysecœe monaute (provenant du défaut de l'oreille externe) ; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.

Esp. IX. *Dysphonie.*

Eth. de *dys*, difficilement ; et *phonos*, voix.

Car. Foiblesse, difficulté ou discordance dans la voix simple ou articulée.

S-esp. I. Psellique.

Syn. Psellisme ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. III , dyscinesies ; gen. XVI. — LINNÉ , cl. VII , motoires ; ord. II , agitatoires ; gen. CXXXVIII. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. III , dyscinésies ; gen. CXIII. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. III ; gen. XVI.

Psellotis ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLIX.

Car. Difficulté d'articuler les mots ou certaines parties de ces mots.

Var. A. Psellisme ischnophonique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. I. — Psellisme hésitant ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. I. — Ischnophonie ; VOGEL , cl. VI , gen. CCLX. — Battarisme ; VOGEL , *ib.* , gen. CCLXI. — Bégaïement.

Difficulté de prononcer facilement, sur-tout le premier mot d'un discours, et sans répéter souvent la première syllabe.

B. Psellisme rottacismique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2. — Psellisme grasseyant ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. 2. — *Traulotis* ou blésité ; VOGEL , cl. VI , gen. CCLVIII. — Grasseyement.

Articulation particulière des mots, dans la

quelle le son de la lettre R est toujours aspiré et est quasi redoublé (a).

C. Psellisme lambdacismique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3. — Psellisme lallant ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. 3.

De *lambda* , consonne de l'alphabet grec , qui étoit exprimée en hébreu par *lamed* , et qui a donné lieu à notre lettre L.

Vice de l'articulation qui fait que le son de

(a) La lettre R est au nombre des *dentales* , c'est-à-dire des lettres dont la production suppose que la pointe de la langue s'appuie entre la racine des dents supérieures , comme pour y retenir la voix ; de manière que l'explosion s'y opère et que la voix paroît en sortir. Ces lettres , chez les hébreux , sont *zain* , *samech* , *thsade* , *resch* , *schin* ; et parmi nous , S , Z , R. Pour prononcer la lettre R , on commence par ouvrir la bouche , on pousse ensuite fortement la voix qui , étant arrêtée par les dents qui ferment le passage , est obligée de rouler dans le palais , à quoi contribue la langue qui se replie un peu dans son extrémité. Il faut pousser la voix fortement ; ce qui rend la prononciation de cette lettre assez rude et difficile. Ceux qui ne la peuvent pas prononcer , mettent L en sa place : au reste ceux qui grasseyent par affectation , changent tous les G en D , tous les K en T , tous les J en Z.

la lettre L est plus mouillé ou se prononce à la place de la lettre R (a).

D. Psellisme traulotique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4. — Psellisme émollient ; CULLEN, *loc. cit.*, esp. 4. — Blésité.

Manière d'articuler, dans laquelle les lettres dures sont changées en molles, et la lettre S est souvent employée (b).

(a) La lettre L se trouve parmi les *linguales* : telles sont en hébreu, *daleth*, *theth*, *lamed*, *nun*, *tau* ; et dans l'alphabet français, D, TH, L, N, T. En commençant de prononcer L, on ouvre la bouche, ainsi cette lettre n'est pas muette entièrement. La langue travaille peu, elle porte seulement la voix contre le palais contre lequel elle s'appuie par son extrémité. La mâchoire d'en bas contribue à la prononciation de cette lettre, portant la voix en haut. La trachée-artère retient aussi la voix ; de sorte que cette lettre se prononce fort vite, parce que le larynx se ferme tout à coup, et qu'on ne fait point d'effort pour pousser la voix.

(b) La lettre S, *sigma* des grecs, et *samech* des hébreux, attachée à la classe des *linguales*, a la plus grande affinité avec les lettres Z, CH, H et autres articulations *linguales* ou *labiales*, ce qui explique les permutations qui se font de ces différentes lettres. Cette lettre S se prononce lorsque les dents approchant les unes des autres, coupent la voix qui coule sur la lan-

E. Psellisme balbutique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5. — Psellisme balbutiant; CULLEN, *loc. cit.*, esp. 5.

Sorte d'articulation qui fait que les lettres labiales (*a*) se font mieux entendre, ou que souvent on les prononce à la place des autres.

gue, laquelle s'appuie dans son extrémité contre les dents de dessus, et demeure droite; c'est pourquoi la voix n'étant point arrêtée, au contraire étant contrainte de passer avec vitesse entre les dents, on entend un sifflement semblable à celui d'un vent qui passe avec violence par une fente. Il faut pousser la voix fortement pour faire sonner cette lettre, ce qui la constitue primitivement une articulation *linguale*, sifflante et forte, dont la foible est ZE.

(*a*) Les articulations *labiales* sont celles qui sont produites par les divers mouvemens des lèvres; et les consonnes *labiales* sont celles qui représentent ces articulations. Les lettres *labiales* hébraïques sont *beth*, *vau*, *mem*, *pe*; dans le latin et dans le français, B, P, M, V, F. Les deux dernières, V et F, exigent que la lèvre inférieure s'approche des dents supérieures, et s'y appuie comme pour retenir la voix: quand elle s'en éloigne ensuite, la voix en reçoit un degré d'explosion plus ou moins fort, selon que la lèvre inférieure appuie plus ou moins fort contre les dents supérieures; et c'est ce qui fait la différence des deux articulations V et F, dont l'une est foible et l'autre forte.

F. Psellisme mogilalique ; SAUV., *loc. cit.* ; esp. 6. — Psellisme acheilos ; CULLEN, *loc. cit.* , esp. 6.

Articulation des mots dans lesquels les lettres labiales ne sont qu'à peine ou point du tout prononcées.

G. Psellisme jottacismique ; SAUV., *loc. cit.* , esp. 8.

Manière d'articuler qui ôte la faculté de prononcer nettement les lettres gutturales (a) ou celles du palais.

Les trois autres B, P et M exigent que les deux lèvres se rapprochent l'une de l'autre : s'il ne se fait point d'autre mouvement lorsqu'elles se séparent, la voix part avec une explosion plus ou moins forte, selon le degré de force que les lèvres réunies ont opposé à son émission ; et c'est en cela que consiste la différence des deux articulations B et P, dont l'une est foible et l'autre forte : mais si, pendant la réunion des lèvres, on fait passer par le nez une partie de l'air qui est la matière de la voix, l'explosion devient alors M ; et c'est pour cela que cette cinquième labiale est justement regardée comme nasale. L'enchifrenement contribue donc à changer la lettre M en B.

(a) Les consonnes du gozier ou lettres gutturales sont, dans la langue hébraïque, *aleph*, *he*, *ghet* ou *ghet*, *hgain* ou *gnaim* ou *aïim* ; car les grammairiens ne s'accordent pas entre eux touchant la prononciation de

S-esp. II. Paraphonique.

Syn. Paraphonie (de *para* , vicieusement ; et *phonos* , voix) ; SAUVAGES , cl. VI , débilés ; ord. III , dyscinésies ; gen. XVII. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. III , dyscinésies ; gen. CXII.

Cacophonie ; SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. III , dyscinésies ; gen. XVII.

Car. Vice qui rend la voix désagréable , rauque , ingrate et obscure.

Rap. A. Enrouement (*élocution avec sifflement*) ; LINNÉ , cl. VIII , suppressoires ; ord. I , suffocatoires ; gen. CXLVI. — VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLII.

ces lettres , que les anciens grecs ne regardoient que comme des aspirations ; c'est pourquoi , en exprimant les noms hébreux en grec , ils ne marquoient point ces lettres. Toutefois on appelle gutturales , les lettres dont la prononciation suppose que la pointe de la langue s'appuie contre les dents inférieures , afin que la racine de cette partie qui est gutturale ou voisine du gozier , s'élève pour intercepter la voix dans cette région d'où en effet on l'entend partir avec explosion propre à ce mécanisme. Nous n'avons point de gutturales que notre H , qui est la marque de l'expiration.

B. Asaphie (*obscurité de la voix*) ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCL.

C. Glapissement (*voix aiguë avec bruit aigre*) ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLI.

D. Leptophonie (*extrême gracilité de la voix*) ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLIV.

E. Oxyphonie (*voix aiguë , telle qu'on la produit lorsqu'on pousse des gémissemens et des plaintes*) ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLV.

Var. A. Paraphonie pubertique ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. I.

La voix devient grave et désagréable , d'aiguë et d'agréable qu'elle étoit auparavant , dans ceux qui se trouvent à l'âge de puberté.

B. Paraphonie nasale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2. — Paraphonie résonnante ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. III. — Rénophobie ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLVI.

La voix ne passant pas par le nez , devient rauque et accompagnée d'un sifflement nasal.

Esp. X. Dyspermatisme.

Eth. de *dys* , difficilement ; et *spermatismos* , ensemencement.

Syn. Dyspermatisme ; SAUVAGES , cl. IX , flux ; ord. III , de sérosité ; gen. XXXI. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. V , épischèses ; gen. CXXV.

Stérilité ; LINNÉ , cl. VIII , suppressoires ; ord. II , constrictoires ; gen. CLXXI.

Agénésie ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLXXXIII.

en Bradyspermatisme.

Bibl. M. PERRIER , de *bradyspermatismo* ; *Monspel.* 1761.

Car. Affoiblissement de l'émission de la liqueur séminale ou sperme.

Rap. A. Dyspermatisme apractode (*produit par la mollesse du membre viril*) ; SAUV. , loc. cit. ; esp. 7.

B. Dyspermatisme séreux ; SAUV. , *ibid* , esp. 8.

C. Anaphrodisie gonorrhéique ; SAUV. , cl. VI , ord. II , gen. VIII , esp. 2.

Esp. XI. *Dysæsthésie.*

Eth. de *dys* , difficilement ; et *aisthesis* , sentiment.

Car. Diminution de la faculté tactile.

Rap. A. Anesthésie néophytique; SAUV.;
cl. VI, ord. 1, gen. X, esp. 3.

Gen. XVII. GASTROSE.

Eth. de *gaster*, qui chez les grecs signifie tantôt tout l'abdomen, tantôt l'estomac seul, et qu'on emploie ici pour exprimer un genre de maladie qui tient à la lésion des fonctions des organes, d'où dépend la digestion.

Syn. Maladies ou affections gastriques, mésentériques ou intestinales.

Bibl. J. H. CASSEBOHM, *de pathematum ventriculi morbis*; Halæ 1750.

D. VAN ROYEN, *de intestinis crassis, multorum malorum causâ et sede*; Lugd.-Batav. 1752.

C. CH. SCHMIEDEL, *de dignitate duodeni in disjudicandis et curandis morbis*; Erlang. 1757.

GMELIN, *de primis viis ut plurimorum morborum fonte*; Tubing. 1761.

J. M. DE MENGHIN, *diagnoses morborum ventriculi et intestinorum*; Viennæ 1764.

C. S. BRANDAU, *de intemperantiâ et morbis ex ipsâ oriundis*; Marburg. 1785.

WEDEKIND , *de morborum primarum viarum verâ notitiâ et curatione* , etc. ; Nuremb. 1792.

GRAMBERG , *de verâ notione et curâ morborum primarum viarum* ; Erlang. 1793.

Car. La bouche est mauvaise , l'haleine est désagréable , la langue est sale , les dents sont graisseuses ; l'appetit est foible ou nul , il y a même quelquefois du dégoût ; les déjections sont mal liées ou fétides , et il y a généralement asthénie.

Esp. I. Gastrose pyrétiq.

Syn. Fièvre gastrique ; BAILLOU , *epidem. et ephem.* , lib. II , tom. I , édit. de TRONCHM , pag. 87. — SELLE , *pyretol.* , 3.^e édit. ; Berlin 1789 , pag. 212.

Fièvre mésentérique ; BAGLIVI , *oper. med.* lib. I , cap. IX , tom. I , édit. de PINEL , pag. 69 ; *specim.* , etc. , *ibid* , pag. 525 , tom. II , pag. 405.

Fièvre putride ; FISES , *traité des fièvres* ; Paris 1755 , pag. 55.

Fièvre aiguë , stomachique et intestinale ; HEISTER , *compend. med. pract.* ; Amstelod. 1763 , pag. 83 , cap. v.

Fièvre stercorale ; QUESNAY , traité des fièvres ; Paris 1767 , tom. 11 , pag. 367. — Fièvre cathartique ; QUESNAY , *ib.* , pag. 472.

Fièvre synoque putride ; VITET , cl. 1 , fièvres ; ord. 1 , fièvres continues simples ; gen.

III.

Fièvre gastrique aiguë ; BURSERI , *institut. medic.* , etc. , Lips. 1787.

Fièvre putride gastrique ; BAUMES , *année médicale* , 4.^e partie , pag. 39.

Fièvre remittente des enfans ; G. BUTTER , *a treatise on infantile remittent fevers* , etc. ; Lond. 178... — Fièvre éminemment gastrique suivant BURSERI.

Bibl. BURCHARD , *de febris mesentericis* ; 1727.

RIEDEL , *de febris intestinalibus* ; Erfort. 1748 ; et coll. de BALDINGER , tom. 1 , pag. 42.

J. M. ROCCA , *de febris ab chyli cruditate productis* ; Feltriæ 1751.

J. G. SCHENCKBECHER , *de febre stomachicâ intestinali* ; Argent. 1760.

J. C. ÆTTINGER , *de febris acutis intestinalibus incolis oppidi megasæmmerdæ endemicis* ; Erfort 1767.

C. F. BORN, *de febre gastricâ putridâ*; Gotting. 1784.

A. TH. GEMEINER, *de verâ febrium putridarum notione*; Erlang 1786.

S. P. AUTHENAC, *essai sur l'idéologie, la technologie, la nosographie et la medicographie des fièvres gastriques simples*; Paris, an X—1801.

Car. Le pouls est fréquent avec plus ou moins de mollesse, souvent avec des inégalités ou des intermittences; la chaleur est augmentée et il y a une turgescence soit stomacale, soit intestinale.

Rap. A. Gale critique; SAUV., cl. X, ord. V, gen. XXX, esp. 2.

B. Délire fébrile; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 9. Voy. TH. LEID, *de delirio febrili*; Edinb. 1768.

C. Diarrhée fébrile; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 3.

S-esp. I. Légère.

Syn. Fièvre continue putride; BOERHAAVE, aph. 730.

Car. Tous les accidens qui se rencontrent

dans la maladie sont peu remarquables ou diminuent bientôt d'intensité.

Rap. A. Hectique infantile ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. V, esp. I.

B. Éphémère nauséative ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. I, esp. 2.

C. Synoque dyssentérique ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. III, esp. 4.

D. Synoque anniversaire ; SAUV., *ib.*, esp. 9.

S-esp. II. Grave.

Syn. Fièvre putride des premières voies, devenue maligne ; CHAMBON, *traité des fièvres*, etc., tom. III, pag. 95.

Car. On trouve tous les accidens de la gastrose pyrétique, joints à des épiphénomènes qui se présentent dans un ordre plus ou moins confus.

Formes.

Sor. 1. Amphimerine péripneumonique ; SAUV. cl. II, ord. II, gen. I, esp. 15.

2. Pleurésie putride ; SAUV., cl. III, ord. II, gen. III, esp. 9.

Synoque pleurétique ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. III, esp. 5.

Esp. II.

Esp. II. Gastrose apyrétique.

Car. Il n'y a point de fièvre ; mais l'appareil gastrique n'en est pas moins bien prononcé.

S-esp. I. Anorexie.

Eth. d'a , privatif ; et *orexis* , appetit.

Syn. Anorexie ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. II , dysorexies ; gen. XI. — LINNÉ , cl. VI , quétales ; ord. III , privatives ; gen. CXVI. — VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLXXIX. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. II , dysorexies ; sect. II , appetits manquants ; gen. CVII. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. II , dysorexies ; gen. XI.

Bibl. G. M'ILVANE , de *anorexia* ; *Edinb.* 1771.

Car. Diminution ou perte de l'appetit pour les alimens solides.

Var. A. Anorexie saburrale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 9.

B. Anorexie admirable ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 10.

Tom. II.

C. Anorexie de SWART (par un défaut de bile) ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 13.

Rap. A. Tympanite de SWART ; SAUV. , cl. x , ord. 111 , gen. XVII , esp. 6.

S-esp. II. Adypsie.

Eth. d'a , privatif ; et *dipsia* , soif.

Syn. Adypsie ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. 11 , anepithymies ; gen. XII. — LINNÉ , cl. VI , quiétales ; ord. 111 , privatives ; gen. CXVII. — VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCLXXXI. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. 11 , dysorexies ; sect. 11 , appetits manquants ; gen. CVIII. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. 11 , anepithymies ; gen. XII.

Car. Défaut de soif.

Rap. A. Adypsie primitive ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

S-esp. III. Nausée.

Eth. de *nausæa* , mot latin qui veut dire nausée.

Syn. Nausée ; SAUVAGES , cl. IX , flux ; ord. 11 , de ventre ; gen. XII. — SAGAR , cl. V , flux ; ord. 111 , de ventre ; gen. XII.

Anatrophe; VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLXXX.

Car. Anxiété précordiale avec envie de vomir.

Rap. A. Nausée cacochylique; SAUV., *loc. cit.*, esp. II.

S. esp. IV. Vomissement.

Eth. de *vomitus*, mot latin qui veut dire vomissement.

Syn. Vomissement; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. II, de ventre; gen. XIII. — SAGAR, cl. V, flux; ord. III, de ventre; gen. XIII.

Bibl. STOLL, de *vomitu*; *dissert. medic.*, et coll. d'EYEREL, tom. III, pag. 374.

A. AINSLIE, de *vomitu idiopathico*; Edinb. 1753.

J. HAWRANEK, de *vomitu*; Viennæ 1770.

C. L. BOUVENOT, recherches sur le vomissement; Paris, an X--1802.

Car. Nausées suivies de la rejection par la bouche des matières contenues dans le foyer de la digestion.

Rap. A. Vomissement saburral; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

B. Vomissement crapuleux ; SAUV., *ibid* ;
esp. 1.

C. Vomissement ruminant ; SAUV., *ib.*, esp.
6. (C'est une variété du vomissement crapu-
leux.)

D. Vomissement laiteux ; SAUV., *ibid*, esp.
3. (Il arrive après s'être gorgé de lait ; ce
vomissement est familier aux enfans en nour-
rice.)

S-esp. V. Flatulence.

Eth. de *flatulentia*, mot latin qui exprime
flatulence.

Syn. Flatulence ; SAUVAGES, cl. IX, flux ;
ord. IV, d'air ; gen. XXXIV. — SAGAR, cl. V,
flux ; ord. V, d'air ; gen. XXXIV.

Car. L'estomac ou les intestins sont distendus
par de l'air que les malades rendent par haut
ou par bas.

Var. A. Flatulence nidoreuse (amenant ou
laissant des rapports d'œufs couvés) ; SAUV.,
loc. cit., esp. 2.

B. Flatulence acide (déterminant des rap-
ports aigres ou un agacement de dents).

S-esp. VI. Dyspepsie.

Eth. de *dys*, difficilement; et *pepsis*, coction.

Syn. Dyspepsie; CULLEN; cl. II; névroses; ord. II, adynamies; gen. XLV.

Bibl. G. FORREST, de *ventriculi concoctione læsâ*; Edinb. 1755.

J. TEMPLE, de *dyspepsiâ*; Edinb. 1778; et coll. de WEBSTER, tom. II, pag. I.

DAUBENTON, *mém. sur les indigestions*; Paris 1785.

Car. La difficulté ou la dépravation de la digestion est caractérisée par des gonflemens, des rots, des rapports et des anxiétés ou des souffrances plus ou moins vives. Les nausées, le vomissement ou la diarrhée et quelquefois la constipation en sont les suites.

Var. A. Apepsie; VOGEL; cl. VI, adynamies; gen. CCLXXVI. Incoction des alimens dans l'estomac.

B. Dyspepsie; VOGEL, *ib.*, gen. CCLXXVII. Digestion tardive et difficile.

C. Diaphtore; VOGEL, *ib.*, gen. CCLXXVIII. Corruption des alimens dans l'estomac.

Formes de la gastrose apyrétique.

- Sor. 1 Lumbagie saburrale ; SAUV. , cl. VII , ord. V , gen. XXX , esp. 8.
2. Syncope arthritique ; SAUV. , cl. VI , ord. IV , gen. XXIII , esp. 16.
3. Dysecœe saburrale ; PAULISKY , *medizinisch praktische beobachtungen* , etc. *Frankfurt am Mayn* 1784.
4. Dysphonie saburrale ; PAULISKY , *ib.*
5. Tremblement saburral ; SAUV. , cl. IV , ord. III , gen. XIV , esp. 12.
6. Tintouin saburral ; SAUV. , cl. VIII , ord. I , gen. IV , esp. 7.
7. Vertige stomacal ; SAUV. , cl. VIII , ord. I , gen. I , esp. 2. — HERZ , *versuch uber den schwindel* ; *Berlin* 1791 , esp. 4.
8. Cochemar stomacal ; SAUV. , cl. V , ord. I , gen. I , esp. 2.
9. Agrypnie par indigestion ; SAUV. , cl. VIII , ord. IV , gen. XXII , esp. 7.
10. Tétanos gastrique ; ROUCHER , *journal de médec.* , tom. XCIH , pag. 128.
11. Apoplexie suspirieuse ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXXI , esp. 10.

Apoplexie præcordiale ; SCHROEDER , *de apoplexiæ ex præcordiorum vitiis origine ; Gotting. 1767 ; et opusc. med.* , tom. 1 , pag. 338.

12. Eclampsie saburrale ; SAUV. , cl. IV , ord. IV , gen. XVIII , esp. 5.

13. Épilepsie stomacale ; SAUV. , cl. IV , ord. IV , gen. XIX , esp. 3.

14. Toux stomacale , var. A , humide ; SAUV. cl. V , ord. I , gen. V , esp. 6. — Var. B , sèche ; SAUV. , *ib.* , esp. 7.

15. Phthisie gastrique ; EICHHORN , *de morbis gastricis phthisin mentientibus ; Gotting. 1788.*

Phthisie fébrique ; SAUV. , cl. X , ord. I , gen. II , esp. 13.

Phthisie abdominale ; A. E. BUCHNER , *de morbis viscerum abdominalium phthisin mentientibus ; Hal. ad Salam. 1769.*

16. Boulimie addéphagique ; SAUV. , cl. VIII , ord. II , gen. VIII , esp. 5.

A. Boulimie convulsive ; SAUV. , *ib.* esp. 6.

17. Odontalgie stomacale , SAUV. , cl. VII , ord. II , gen. XVI , esp. 9.

18. Cardialgie saburrale ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XX , esp. 1.

A. Cardialgie lactique ; SAUV., *ib.*, esp. 11.
 19. Gastrodynie saburrale ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 1.

A. Gastrodynie par des corps étrangers imprudemment avalés ; SAUV., *ib.*, esp. 11.

20. Cholérée crapuleuse ; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XV, esp. 11.

21. Colique stercorale ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 3.

A. Colique accidentelle ou d'indigestion ; SAUV., *ib.*, esp. 18.

B. Colique méconiale ; SAUV., *ib.*, esp. 19.

22. Constipation obstructive (le canal intestinal étant obstrué ou bouché par des matières épaissies ou endurcies) ; CULLEN, cl. IV, ord. V, gen. CXXIII, esp. 3.

23. Diarrhée stercoreuse ; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XVI, esp. 1.

A. Diarrhée lactique ; SAUV., *ib.*, esp. 19.

24. Sueur saburrale ; SAUV., cl. IX, ord. 111, gen. XX, esp. 18.

25. Salivation nauséuse ; SAUV., cl. IX, ord. 111, gen. XXIII, esp. 1.

26. Tympanite ascitique ; SAUV., cl. X, ord. 11, gen. VI, esp. 4.

27. Ophthalmie gastrique ; I. F. DELIUS ,
de ophthalmiâ à vitio ventriculi ; Erlang 1786 ;
 et *adversar. fascic. V* , diss. XXII.

28. Catarrhe abdominal ; WILlich , *de fre-*
quenti catarrhorum ex primis viis origine ; Got-

ting. 1776.

29. Exhantémie abdominale ; J. VELTI ,
exanthematum fons adominalis ; Gotting. 1784 ;
 et coll. de FRANCK , tom. IV , pag. 30.

30. Jaunisse néophytique (occasionnée par
 la bile retenue , par le méconium épaissi) ;
 SAUV. , cl. X , ord. VI , gen. XXXII , esp. 12.

Gen. XVIII. HELMINTHÈSE.

Eth. d'*helminthes* ver ; dénomination pro-
 posée pour exprimer toute maladie occa-
 sionnée par des vers.

Syn. Maladies ou accidens qui proviennent
 des vers qui habitent ou qui peuvent se ren-
 contrer dans l'homme.

Vers ; JUNCKER , *tab. CIX.*

Vers des intestins ; PINEL , classe non dé-
 terminée , gen. LXXXII.

Bibl. N. ANDRY , de la génération des vers
 dans le corps de l'homme ; Paris 1700.

J. H. SCHULZE, *diss. de lumbricis effractoribus*; Halæ 1740.

BIANCHI, *de naturali in humanum corpus vitiosâ morbosâque generatione historia*; Taurini 1741.

J. G. FISCHER, *de vermibus in corpore humano et anthelmintico priori anno invento*; Stadæ 1751.

J. MALBOIS, *de intestinis ac vermibus in iis nidulantibus*; 1751.

G. VAN DOEVEREN, *de vermibus intestinalibus hominum*; Lugd-Batav. 1753; et en français, sous le titre : *observ. physico-médic. sur les vers qui se forment dans les intestins*, etc.; Lyon et Paris 1764.

G. KRAMER, *theoremata phys. med. de lumbricis corporis humani*; Viennæ Austriæ 1753.

C. F. KALTSCHMID, *de vermibus et præcipuè de specie illâ vermium intestinalium quam tæniam vocamus*; Jena 1755.

J. TH. KLEIN, *tentamen herpetologiæ*, etc. accessit J. A. UNZERI, *observ. de tæniis*; Leidæ et Gotting. 1755.

J. G. BRENDÉL, *ascaridodea HIPPOCRATIS*; Gotting. 1757.

J. JÜNCKER, *de respectu ad vermes in morbis chronicis et acutis habendo*; Halæ 1757.

PALLAS , *de infestis viventibus intra viventia* ; *Lugd-Batav.* 1760 ; et coll. de SANDIFORT , tom. I , pag. 247.

M. J. BITTERMANN , *de vermibus* ; *Vindob.* 1763.

A. E. BUCHNER , *de colluvie verminosâ quatenus cacochymicæ causâ* ; *Halæ* 1765.

J. F. PALMER , *de vermibus intestinorum* ; *Edinb.* 1766 ; et coll. d'Edimbourg , tom. III , pag. 34.

MULLER , *vermium terrestrium et fluviatilium , seu animalium infusoriorum , helminthicorum , etc.* ; *Hauniæ et Lipsiæ* 1773 et 1774.

— *Zoologiæ danicæ prodomus , etc.* ; *Hau-niæ* 1776.

P. HAPP , *vermium intestinorum hominis historia* ; *Lipsiæ* 1780.

A. BROUGHTON , *de vermibus intestinorum* ; *Edinb.* 1781 ; et coll. de WEBSTER , tom. II , pag. 199.

P. CH. F. WERNER , *vermium intestinalium , præsertim tæniæ humanæ brevis expositio* ; *Lips.* 1782. — *Continuatio prima* ; *Lips.* 1782. — *Secunda* ; *Lips.* 1786. — *Tertia* ; *Lips.* 1788.

TH. WALLIS , *de vermibus intestinorum* ; *Edinb.* 1784.

J. BARBUT , *the genera vermium exemplified by various specimens of animals contained in*

the orders of the intestina et mollusca linæi..... ; London 1785.

RETZIA , *lectiones publicæ de vermibus intestinalibus* , etc. ; Holmiæ 1786.

MODEER , *bibliotheca helminthologica* ; Erlang. 1786.

DE HAEN , *tractatus de vermibus* ; in prælect. in herm. BOERHAAVE institut. patholog. edente de WASSERBERG in-4.^o , 1786 , tom. I , pag. 481.

BLOCH , *traité de la génération des vers* ; Strasbourg 1788.

BUNIVA , *de generatione et propagatione vermium* , etc. , *theses inaugurales* ; Taurini 1788.

VIREY , *mém. sur la classe des vers et principalement sur ceux qu'il importe le plus de connoître en médecine* ; *journ. de physiq.* , etc. tom. IV , pag. 409.

Car. Diagnostic incertain qu'expriment cependant , au milieu d'un assemblage de symptômes souvent bizarres , quelquefois extraordinaires :

L'haleine forte , sur-tout le matin ; les gencives en mauvais état ; un prurit au nez et à l'anus ; un appetit irrégulier , toujours d'un ex-

trême à l'autre ; un gros ventre ; des maux d'estomac ; quelquefois des vomissemens ; mais plus souvent une constipation ou une diarrhée visqueuse ; des coliques irrégulières ; de la soif ; de la stupeur ; une physionomie particulière, mal-saine et bouffie , avec un cercle sombre et creux autour des yeux ; des soubresauts pendant le sommeil ; et des grincemens de dents.

Esp. I. Helminthèse par l'ascaride (a) lombrical.

Syn. Maladies occasionnées par l'ascaride

(a). L'ascaride , genre de vers de la famille des cylindracés , a la tête en trèfle avec trois petits tubercules , le corps cylindrique et devenant plus mince aux deux extrémités qui sont obtuses. Ce ver est glabre , ferme , même élastique.

Il réunit deux espèces.

I. L'ascaride lombrical , *ascaris lombricoides* , long de deux décimètres , et se distinguant du ver de terre par le défaut de soies et l'absence du renflement annulaire ; peu de rides transversales ; sa queue obtuse et son anus en forme de fente transverse. Ce ver , ordinairement ovipare , vit en troupes dans les intestins grêles de l'homme.

II. L'ascaride vermiculaire , long d'environ deux à trois centimètres , ayant aussi trois renflemens à sa tête , côtés légèrement crénelés et queue très-pointue. Ce

lombrical , connu plus particulièrement sous le nom de *strongles* , de *vers lombrics* ou *lombricaux* , de *vers des enfans*.

Bibl. La plupart des ouvrages inscrits dans la bibliographie du genre.

CONIULUS , *degli ascaridi* ; Roma 1701.

VAN PHELSUM , *historia physiologica ascaridum* ; Leovardiae 1762.

J. A. MURRAY , *de ascaride lumbricoide linn.* Gotting. 1779 ; et *opusc.* , tom. II , pag. 1.

— *De lumbricorum setis* ; *opusc.* , tom. II , pag. 401.

C. PEREBOM ; *descriptio et iconica delineatio novi generis vermium stomachidæ dicti in corpore humano hospitantium* ; Amstelod. 1780.

ABRAHAM , *cautelæ anthelminthicorum in paroxismis verminosis* , etc. ; Gotting. 1783.

Car. Les symptômes du genre , parmi lesquels on distingue la dilatation de la pupile , les démangeaisons du nez , l'odeur aigre-douce de l'haleine , et autres phénomènes dyspeptiques.

ver vivipare , se reproduisant souvent , habite en très-grand nombre dans l'intestin rectum , dans le vagin et quelquefois dans la vessie urinaire.

S-esp. I. Pyrétique.

Syn. Fièvre vermineuse.

Bibl. A. STRASZGULT, *dissert. sistens historiam vermium et febris verminosæ*; Viennæ 1774; et coll. de WASSERBERG, t. IV, p. 303.
 DE HAEN, *de febre verminosâ*; *rat. medend.* édit. de Paris, 1774, tom. VIII, pag. 105.
 JUNGE, *historia febris verminosæ*; *societ. medic. Hauniensis collectanea*, tom. II, pag. 322, art. 35.

VAN DEN BOSCH, *historia constitutionis epidemicæ verminosæ*, etc.; Norimb. 1779.

DUFOUR, observations diverses sur la fièvre putride vermineuse, etc.; *journ. de médéc.*, tom. LXVI, pag. 404.

Car. Le pouls est fréquent; il y a des anxiétés précordiales, avec le sentiment d'une compression expansive, une disposition aux affections soporeuses; et les déjections, assez faciles, sont plus ou moins chargées d'ascarides lombricoïdes.

Var. A. Légère.

Car. Les accidens qui la caractérisent n'ont pas une très-grande intensité.

B. Grave.

Bibl. MOREALI, *systema theoretico-practicum februm malignarum et contagiosarum*; 1739.

BIANCHINI, *lettere medico-pratiche intorno all'indole delle feбри maligne e de loro principali remedi colla storia de vermi del corpo humano e dell'uso de mercurio*; Venezia 1750.

CHASSANIS, *dissert. sur la maladie épidémique de Lodève, en 1751*; Avignon 1753.

J. B. BOHADSCH, *de syncho putrida epidemica vermibus stipata*; Pragæ 1758.

LEPECQ DE LA CLOTURE, *épidémie du gros theil, fièvre putride vermineuse et maligne de 1770*; *collect. d'observ. sur les maladies et constitut. épidém.*, tom. I., pag. 91.

Car. Les symptômes qui l'accompagnent ont une marche confuse et une grande intensité.

Formes.

Sor. 1. Hectique vermineuse; SAUV., cl. II, ord. I, gen. V, esp. 9.

2. Carus vermineux; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXX, esp. 7.

3. Typhomanie vermineuse; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXVII, esp. 4.

3. Variole

3. Variole vermineuse ; BEIREIS, *de febris et variolis verminosis* ; Helmstadt 1780.

4. Amphimérine tussiculeuse ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. VI, esp. II.

5. Pleurésie vermineuse ; SAUV., cl. III, ord. II, gen. XIII, esp. 8.

A. Pleurésie stomacale ; BIANCHI, *histor. hepat.*, tom. I, pag. 234, §. VI. — VAN DEN BOSCH, *loc. cit.*, pag. 258.

6. Tierce vermineuse ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. X, esp. 18. — COLOMBIER, *méd. milit.*, tom. I, pag. 454 ; *idem* tom. II, pag. 31--132.

S-esp. II. Apyrétique.

Car. Le pouls est à peu près naturel ; mais le corps paroît s'émacier quoique souvent l'appétit se soutienne et même soit plus fort ; il y a un certain degré de météorisme, borné quelquefois à l'épigastre, et il s'y joint le plus ordinairement des urines laiteuses, des déjections de matières qui paroissent argentées ; quelques douleurs poignantes ou lacérantes vers le nombril, et par fois un sautillement dans le ventre.

Tom. II.

Formes.§. 1. *Les vers étant contenus dans les intestins.*

Sor. 1. Hémorragies vermineuses ; VAN DEN BOSCH , *loc. cit.* , pag. 168 , 170 , 172.

2. Bouffissure vermineuse ; BERTRAND , *journ. de médéc.* , tom. LIV , pag. 373.

3. Hydropisie vermineuse ; LUDOLF , *dissert. de hydropse à vermibus causato.*

4. Chlorose vermineuse ; SAUV. cl. X , ord. VI , gen. XXXV , esp. 6.

5. Vomissement vermineux ; SAUV. , cl. IX , ord. II , gen. XIII , esp. 5.

6. Dyspepsie vermineuse ; VAN DEN BOSCH , *loc. cit.* , pag. 328.

7. Chorée vermineuse ; SAUV. , cl. IV , ord. IV , gen. XXI , esp. 5.

8. Démonomanie vermineuse ; SAUV. , cl. VIII , ord. III , gen. XIX , esp. 4.

9. Vertige vermineux ; ROZIERE DE LA CHASSAGNE , *journ. de médéc.* , tom. XXVI , pag. 430. — HERZ , esp. 5.

10. Cochemar vermineux ; SAUV. , cl. V , ord. I , gen. I , esp. 4.

11. Étranglement vermineux ; VAN DEN BOSCH *loc. cit.* , pag. 110.

12. Histérie vermineuse ; SAUV. , cl. IV , ord. IV , gen. XX , esp. 1. — DUFAY , *journ. de médéc.* , tom. XXIX , pag. 120.

13. Tetanos vermineux ; SAUV. , cl. IV , ord. II , gen. VII , esp. 8.

A. Emprostothone vermineux , ROSEN , *malad. des enf.* , pag. 398.

B. Epistothone vermineux ; WHALBOM , *act. de l'académie de Suède* , (en suédois) , vol. XXVI , pag. 203.

14. Trisme vermineux ; SAUV. , cl. IV , ord. I , gen. II , esp. 5.

15. Catalepsie vermineuse ; VAN DEN BOSCH , *loc. cit.* , esp. 151.

16. Apoplexie vermineuse ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXXI , esp. 15. — VAN DEN BOSCH , *loc. cit.* , pag. 39.

17. Eclampsie vermineuse ; SAUV. , cl. IV , ord. IV , gen. XVIII , esp. 2.

18. Épilepsie vermineuse ; DUFAY , *journ. de médéc.* , tom. LXXX , pag. 343.

19. Convulsion vermineuse ; ROSEN , *malad. des enf.* , pag. 394.

20. Toux vermineuse ; SAUV. , cl. V , ord. I , gen. V , esp. 21 , var.

21. Asthme ascaridique ; *acta med. soc. rég. hauniens.* , tom. I , pag. 290.

22. Phthisie vermineuse ; VAN DEN BOCH ;
loc. cit. , pag. 248.

23. Boulimie vermineuse ; SAUV. , cl. VIII ,
ord. II , gen. VIII , esp. 3.

24. Céphalalgie vermineuse ; VAN DEN
BOSCH , *loc. cit.* , pag. 322.

25. Pleurodyne vermineuse ; SAUV. , cl. V ,
ord. II , gen. XI , esp. 2.

26. Cardialgie vermineuse ; SAUV. , cl. VII ,
ord. IV , gen. XX , esp. 10 , var.

27. Cholérée vermineuse ; SAUV. , cl. IX ,
ord. II , gen. XV , esp. 9.

28. Iléose vermineux ; SAUV. , cl. IX , ord.
II , gen. XIV , esp. 12. — VAN DEN BOSCH ,
loc. cit. , pag. 110 , 138 , 159.

29. Colique vermineuse ; SAUV. , cl. VII ,
ord. IV , gen. XXII , esp. 4. — LUDWIG , *de*
lumbricis intestinâ perforantibus ; Lips. 1762.

30. Paralysie vermineuse ; VAN DEN BOSCH ,
loc. cit. , pag. 163 , 166. — DUPAU , *journ.*
de médec. , tom. LXXX , pag. 344.

A. Paralysie vermineuse des muscles du côté
gauche de la face ; CONSRUCH , *nova acta*
nat. curios. , tom. V , art. XXIX , pag. 89.

31. Surdit  ascaridique ; TISSOT , *trait  des*
nerfs , etc. , tom. II , part. II , pag. 81 , 85.

32. Aphonie vermineuse ; HANNES , *nova*

act. nat. cur., tom. VI, art. LV, pag. 261.

— ZIEGLER, *dissert. de aphonía à vermibus.*

33. Aménorrhée vermineuse; MILLIN, *journ. de médec.*, tom. LVI, pag. 458. — ROSEN, *malad. des enf.*, pag. 394.

34. Diarrhée vermineuse; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 14. — VAN DEN BOSCH, *loc. cit.*, pag. 338.

35. Lientérie vermineuse; VAN DEN BOSCH, *loc. cit.*, pag. 96.

36. Tympanite vermineuse; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XVII, esp. 7. — VAN DEN BOSCH, *loc. cit.*, pag. 148.

37. Erysipèle vermineux; VAN DEN BOSCH, *loc. cit.*, pag. 199.

38. Rhumatisme vermineux; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. III, esp. 8.

39. Exanthémie vermineuse; VAN DEN BOSCH, *loc. cit.*, pag. 96, 132, 189.

40. Ictère vermineux; VAN DEN BOSCH, *loc. cit.*, pag. 121.

41. Claudication vermineuse; ROSEN, *malad. des enf.*, pag. 398.

§. 2. *Les vers se trouvant hors des intestins.*

42. Cystalgie vermineuse; PANZANI, *malattia verminosa della vesica*; Venise 1787. — GERON,

journal. de médec., tom. LXXX, pag. 210.

43. Phlegmon vermineux. *ibid.*, 2330.

A. Tumeur lombricale du coude; BERDOT, *acta helvetica*, vol. VII, pag. 177, art. 17.

44. Étranglement vermineux dans les hernies; FAGES, *rec. périod. de la soc. roy. de méd. de Paris*, tom. V, pag. 222.

Esp. II. Helminthèse par l'ascaride vermiculaire.

Syn. Affections causées par l'ascaride vermiculaire (voy. pag. 93, note (a)), vulgairement connu sous le nom d'ascaride.

Car. Inquiétude plus ou moins grande avec une sensation de fourmillement très-incommode, qui a lieu principalement aux approches de la nuit, dans les parties qui sont le siège de ces petits vers, qu'on trouve communément sur les déjections, ou répandus à l'extérieur.

S-esp. I. Intestinale.

Le siège des ascarides étant dans le cœcum ou dans les environs du rectum.

Formes.

Sort. 1. Tenesme ascaridique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIX, esp. 4.

S-esp. II. Cystique.

Les ascarides se trouvant dans la vessie urinaire.

Rap. A. Pissement vermineux ; HANNES , *nova acta natur. curios.* , tom. V , pag. 107 , obs. XXXIII.

Formes.

Sor. 1. Catalepsie ascaridique ; KUHN , *diss. de ascaridibus per urinam emissis , adjunctâ commentatione de vermium intestinalium generatione* ; Jena 1798.

Esp. III. Helminthèse par le dragonneau

(a).

Car. Maladie occasionnée par la présence

(a) Le dragonneau , *gordius* , *filaria* , comprenant la *filaria intestinalis* et la *filaria medinensis* ou veine de médine , genre de vers appartenant aux cylindracés , ressemble beaucoup à une corde à violon , pointu par les deux bouts , d'un blanc pâle , et montrant , à la partie antérieure , une bouche arrondie , ouverte en forme de concavité. Son corps est très-lisse et égal.

La *filaria medinensis* habite les climats ardents des deux Indes ; sa grandeur ordinaire est moins d'un mètre et il se loge dans le tissu cellulaire.

du dragoneau , plus connu sous le nom de *veine de médine* et de *gordius*.

S-esp. I. Intestinale.

Car. Le prurit du nez , le vomissement et la déjection d'une matière muqueuse , sur-tout au reveil ; un afflux soudain de salive dans la bouche ; des douleurs aux environs du foie et de la rate sont les signes qui passent pour annoncer le plus sûrement le *gordius* ou dragoneau intestinal.

Formes.

Sor. 1. Convulsions par le *gordius* ; ROSEN ; *malad. des enfans* , pag. 389. — ROLANDSON MARTIN , *kongl vetenshaps akademiens handlingar for aar 1771* , vol. XXXII , trim. 3 , art. 10.

2. Colique laponique ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXII , esp. 9.

S-esp. II. Cellulaire.

Bibl. G. F. C. FUCHS , *comment. histor.*

Le dragoneau intestinal , *filaria intestinalis* , ver court et très-grêle , vit dans le intestins ; on le rencontre dans les climats froids et septentrionaux.

medic. de dracunculo persarum sive vena medinensi arabum, etc. ; Jena 1785.

PERÉ, mémoire sur le dragoneau ; *journ. de medec.*, tom. XLII, pag ; 121.

Car. Après des douleurs obtuses dans les chairs, il s'élève une tumeur phlegmoneuse de laquelle sort la pointe de la veine de médine dont on se saisit, roulant ensuite le ver sur un baton jusqu'à ce que son extraction soit parfaite.

Esp. IV. Helminthèse par le trichure (a).

Bibl. ROEDERER et WAGLER, *de morbo*

(a) Le trichure, *trichocephalus hominis*, genre de vers de la famille des cylindracés, long de six à sept centimètres, a le corps sur-tout chez les mâles, souvent contourné en spirale. Son extrémité postérieure est grossie en forme de massue ; mais l'antérieure, où est sa tête, est filiforme avec un petit nœud à la fin. Ce ver est très-finement strié dans sa partie antérieure, crénelé sur la longueur de son dos, et lisse en dessous. Il se tient ordinairement dans l'intestin cœcum, vit en troupes, et sa femelle, qui est plus mince et qui n'a pas cette trompe capillaire comme le mâle, est ovipare.

Le trichure ne se trouve guère que chez les personnes d'une constitution molle, et sur-tout chez les diarrhoïques.

mucoso , cum præfatione de trichuridibus , novo vermium genere , édit. de WRISBERG ; Gotting. 1783.

PALLAS, *novi comment. acad. scient. imper. petropolit.*, tom. XIX, pro anno 1774, art. 18, pag. 449.

Car. Indéterminé.

Esp. V. Helminthèse par la douve (a).

Car. Indéterminé.

Esp. VI. Helminthèse par le tænia (b).

Bibl. GANDOLPHE, description du ver tænia ,

(a) La douve humaine , *fasciola humana* , de la famille des vers plats , constitue un genre de ver aplati , ordinairement ovale et muni presque toujours de deux ouvertures. Assez rare dans l'homme , il habite les intestins et même les conduits biliaires.

(b) Les tænias , autre genre de vers nombreux , de la famille des vers plats , ont des articulations dans toute leur longueur , le corps alongé , ordinairement déprimé , une tête à l'extrémité la plus étroite , armée de quatre suçoirs et quelquefois de crochets qui sont rétractiles.

A. Tænias à crochets.

1.º Cucurbitain , *tænia solium*.

Ce ver a des anneaux plus longs que l'espèce sui-

etc.; *acad. des sciences*, ann. 1709, pag. 29
de l'hist.

vaute n.º 2. Au milieu de chacun d'eux se trouvent des ovaires disposés en rosette, et sur leurs bords une ouverture solitaire. Les articulations se séparent facilement, et chaque anneau paroît articulé par une sorte d'arthrodie.

2.º *Tænia court, tænia vulgaris.*

Ce ver a des anneaux qui souvent ont autant de largeur que de longueur, et sont ridés transversalement; sur le milieu de chacun d'eux il y a un ovaire floriforme plus apparent que chez le précédent n.º 1 et plus bas un mamelon percé à son extrémité.

Les *tænia*s à crochets vivent dans les intestins des hommes souvent en très-grand nombre, et sont difficiles à expulser.

B. *Tænia*s nus ou sans crochets.

3.º *Tænia large, tænia lata.*

Ce ver a des anneaux épais, extrêmement courts et larges, finement ridés transversalement et à une seule ouverture sur le milieu où sont leurs ovaires en forme de rosette.

4.º *Tænia dentelé, tænia dentata.*

Ce ver, dont la partie antérieure est la plus large, dont la tête est pointue et ressemble en dessous à un cœur dont on auroit tronqué la base, a une ouverture marginale prééminente au milieu de chaque bord de ses anneaux, dont les plus grands ont des canelures transversales et moins de largeur que la précédente, et des ovaires si petits qu'on ne peut les apercevoir à l'œil nu.

S. ERNST , *de tæniâ secundâ PLATERI* ;
Basileæ 1743 ; et coll. de HALLER , tom. III ,
 pag. 439.

LINNÉ , *tænia* ; *Upsaliæ* 1748 ; et *amænit.*
acad. , tom. II , pag. 59.

BONNET , diss. sur le tænia ou ver solitaire ;
savans étrangers , tom. I , 1750 , pag. 478 ;
 et coll. compl. des *œuvres* , tom. III , pag.
 96 , tom. X , pag. 282.

A. COCCHI , *dei vermi cucurbitini dell uomo* ;
in Pisa 1753.

J. G. ROEDERER , *de tæniâ* , Gotting. 1760.

ROSEN , des vers et sur-tout du tænia ; coll.
académ. , tom. XI , pag. 304.

C. F. KALTSCHMID , *de tæniâ* ; *Jenæ* 1766.

S. S. BEDDEY , *de verme tænia dicto* ; *Vienn.*
 1767.

ANDRÉE , *de tæniâ* ; Gotting. 1769.

CUSSON , remarques pratiques sur le tænia ;
assembl. publ. de la soc. roy. des scienc. de
Montp. pour l'ann. 1781 ; Montpell. 1782 ,
 pag. 97 ; et séparément , Montpellier 1783.

BUTINI , mém. sur le tænia à anneaux courts ;
hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Par. ,
 ann. 1782--83 , pag. 285 de l'hist.

A. GLEICHEN , obs. anatomiques et micros-
 copiques sur le tænia large et les vers cucur-

bitains , etc. ; *actes des amis de la société de Berlin* , etc. (en allem.) , vol. IV , art. X , pag. 203.

Car. On se sent gonflé ; on est mal le matin à jeun ; assez souvent on distingue soit une espèce de succion dans le bas-ventre , soit une sorte d'agitation onduleuse qui finit par la sensation d'une boule qui se fixe. Les déjections sont quelquefois chargées de quelques portions annulaires ou de quelques fragmens du tænia.

Formes.

Sor. 1. Nausée tæniaire ; SAUV. , cl. IX , ord. II , gen. XII , esp. 1.

2. Epilepsie tæniaire ; LECOMTE , *journ. de médec.* , tom. LXXXIV , pag. 40.

3. Boulimie vermineuse ; SAUV. , cl. VIII , ord. II , gen. VIII , esp. 3.

4. Cardialgie vermineuse ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XX , esp. 10 , var.

Esp. VII. Helminthèse par l'hydatide (a).

Bibl. J. GRASHUIS , *de colicâ pictonum ten-*

(a) Il y a deux espèces d'hydatide.

A. L'hydatide viscérale , *hydatis visceralis*.

Ce ver a la forme d'un sphéroïde allongé , obtus

tamen ; accedit de naturâ , sede et origine hydatidum disquisitio ; Amstelod. 1752.

PALLAS , *miscellanea zoologica ; etc. ; Hag. Comit. , 1766 , pag. 157.*

DE HAEN , *de hydatidibus ; rat. medend. ; Paris , tom. III , pag. 308.*

CAMPER , *hydatides , hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris , ann. 1784--85 , pag. 92. des mém.*

LESKE , *von den drehen der schafe und blasenband wurme in gehirne derselben , etc. 1780.*

antérieurement et pointu à sa partie postérieure ; sa tête paroît renfermée dans sa vessie , ou du moins elle n'en est pas distinctement séparée.

Ces vers , rarement solitaires , souvent très-nombreux , se rencontrent communément dans les sinus de la masse cérébrale ; dans certaines tumeurs , dans les duplicatures du péritoine , dans le foie , les moles , le placenta , le tissu cellulaire des hydropiques , etc.

B. L'hydatide celluleuse , *hydatis cellulosa.*

Ce ver , long d'environ trois centimètres , de forme ovale , avec une vessie à des parois très-dures , se prolonge postérieurement en deux espèces de queue. Sa tête se voit aussi difficilement que dans la précédente , et paroît renfermée aussi ; les crochets dont elle est armée sont de même moins pointus.

Ce ver , assez rare , habite le tissu cellulaire qui se trouve entre les muscles de l'homme.

FISCHER, *teniæ hydatigenæ in plexu choroïdæo*, etc.; *Leips.* 1789.

Car. Indéterminé.

Formes.

Sor. 1. Pneumorrhagie hydatidique. *Obs.* Une femme d'Uzès vint me consulter pour une maladie de poitrine de laquelle on la traitoit; il y avoit une crachement de sang qui deroit depuis plus de vingt jours, avec dyspnée et picotement dans l'intérieur du thorax. Mais un phénomène particulier, c'est que le sang, rendu par les crachats, étoit souvent très-délayé, et que la malade expectoroit de temps en temps ce qu'elle appeloit des lambeaux de peaux blanches appartenant à ses poumons. Ces lambeaux n'étoient que des hydatides ouvertes ou des fragmens d'hydatides. Un usage un peu soutenu de muriate de mercure, procura une expulsion abondante d'hydatides, arrêta la pneumorrhagie et guérit radicalement la malade.

2. Hydrothorax (a) hydatidique; SAUV., cl. v, ord. II, gen. XIII, esp. 5.

(a) Dans le *journal de médecine*, publié sous le nom

3. Hydromètre hydatidique ; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XV, esp. 4.

4. Métrorrhée hydatidique ; ZELLER, *neves magazin, fur aerzte ; Zelmter Band*, pag. 345.

5. Proctorrhée hydatidique ; ZELLER, *ibid.*

6. Démence hydatidique ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVIII, esp. 5.

7. Goître hydatidique ; DE HAEN, *loc. cit.*, pag. 322, §. IV.

8. Epilepsie hydatidique ; LYSONS, *practical essays upon intermitting, dropsies, diseases of the liver the epilepsy*, etc. ; Lond. 1772.

9. Toux hydatidique ; COLLET, *medical transactions*, etc., vol. II, pag. 486, art. 22.

10. Dyspnée hydatidique ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. VII, esp. 4.

11. Cholérée hydatidique ; BALME, *journ. de médéc.*, tom. LXXXIV, pag. 334.

12. Ischurie hydatidique ou hydatides ren-

de MM. CORVISARD, BOYER et LEROUX, tom. II, pag. 195, on trouve l'histoire d'une maladie singulière de la poitrine, assez bien constatée pour qu'on eût pu lui assigner le caractère qu'elle offre véritablement. On ne peut la lire avec un peu d'attention, sans voir qu'elle n'est autre chose qu'une vomique-lymphatique occasionnée par un amas d'hydatides.

dues avec les urines ; LETTSOM , *memoirs of the medical society of london* , vol. 11 ; Lond. 1789 , art. 111. — RUSSEL , *medical observations and inquiries* , etc. , vol. 111 , art. 16 , pag. 146.

Obs. Un citoyen , confié à mes soins , souffroit beaucoup de la vessie , et tout portoit à croire qu'il avoit un calcul dans l'intérieur de cet organe. On se décidoit à l'opération , lorsqu'un soupçon de maladie syphillitique et un engorgement reconnu de la prostate firent administrer , à titre de médicament préparatoire , le muriate de mercure. Au bout de quelques jours , il parut dans les urines , qui déposèrent de plus en plus , une matière muqueuse , puriforme ; des lambeaux d'hydatides : cette évacuation fut très-prolongée , et la guérison solide.

13. Diarrhée hydatidique ; BERTHELOT , obs. sur des tænias hydatigènes ; *journ. de médec.* , tom. LXXXIV , pag. 48.

14. Physconie hydatidique.

A. Mésentérique ; SAUV. , cl. X , ord. 11 , gen. IX , esp. 5. — CULLEN , cl. 111 , ord. 11 , sect. IV , gen. LXXXII , esp. 6 , var. A.

B. Hépatique ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. 1 , var. C. — DE HAEN , *de hydatidibus* ; *loc. cit.* pag. 318 , §. II.

C. Polysplachnique; CULLEN, *loc. cit.*, esp. 9, var. D.

D. Externe; CULLEN, *loc. cit.*, esp. 13.

E. Fausse grossesse; WILMER, obs. sur une masse considérable d'hydatides rendues par l'utérus; *journ. de médéc.*, tom. LXXVI, pag. 456.

15. Oschéocèle hydatidique; SAUV., cl. 1, ord. v, gen. XLI, esp. 13.

16. Hernie hydatidique; (les hydatides en imposant pour une hernie); DE HAEN, *loc. cit.*, pag. 328, §. VI.

17. Tumeur testiculiforme (hydatide prise pour un troisième testicule); SCREIBER, *nov. comment. acad. scient. imper petropol.*, tom. III, pag. 403.

18. Cancer mammo-hydatidique (tumeur du sein, occasionnée par des hydatides et simulant le cancer); DE HAEN, *loc. cit.*, pag. 321, §. III.

Esp. VIII. Helminthèse par le bicolore rude (a).

Bibl. CH. SULTZER, dissert. sur un ver du

(a) Corps de couleur brune, ovale, transversalement aplati, renfermé dans une membrane transparente, d'un

canal intestinal, nouvellement découvert et décrit sous le nom de *bicorne rude* ; Strasb. 1801.

Car. Indéterminé.

Esp. IX. Helminthèse par la furie infernale (a).

Car. Porté dans l'air, il entre dans le corps humain avec une vive douleur, et des symptômes analogues à ceux d'une maladie pestilentielle ; causant la mort en vingt-quatre heures. On voit ce ver sur-tout depuis le solstice d'été jusqu'à celui d'hiver.

blanc sale, lâche et légèrement plissée, surmonté de deux cornes cylindriques, rudes, nées d'une racine commune, qui s'élève en grossissant dans la partie supérieure du corps, dans la direction duquel elles sont placées, droites, ondulées ou courbées en différens sens ; de l'épaisseur d'un crin à leur origine, plus mince de moitié à l'extrémité opposée qui est droite et quelquefois courbée en manière de crochet, d'une longueur égale à celle du corps qui n'excède pas avec elles six millimètres.

(a) Ver linéaire, filiforme, long de deux centimètres environ, cilié de chaque côté d'une rangée de soies pointues et recourbées. Sa couleur est jaunâtre ou rougeâtre, souvent noire à son extrémité antérieure.

Causeroit-il des charbons , des anthrax chez les gens de la campagne , dans les pays bas et humides ?

Esp. X. Helminthèse par la mite psorique (a).

Syn. Psore , *psora* ; LINNÉ , cl. XI , vices ; ord. IV , gales ; gen. CCLXVI. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. VIII , dyalises ; gen. CXLIX.

Gale , *scabies* ; SAUVAGES , cl. X , cachexies ; ord. V , impetiginés ou maladies cutanées ; gen. XXX. — VOGEL , cl. X , vices ; ord. IV , pustules ; gen. CCCCXLIV. — SAGAR , cl. III , cachexies ; ord. V , impetiginés ; gen. XXXI.

Gale vermineuse ; LINCK , *nova acta natur. curios.* , etc. , vol. IV.

Bibl. M. E. ETMULLER , *de scabie* ; Lips. 1731 ; et coll. de HALLER , tom. VI , pag. 56.

LINNÉ , *exanthemata viva* ; Upsal. 1757 ; et *amœnit. acad.* , tom. V , pag. 95. (Voy. par opposition E. G. BALDINGER ; *exanthemata non a vermibus oriri* ; coll. de GRUNER , tom. II , pag. 89.)

(a) Elle est plus petite que le siron , est blanche et à pieds rousseâtres et velus.

G. A. LANGGUTH, *de scabie vivâ ; Witeb.*
1767.

C. C. KRAUSE, *de scabie corporis humani ;*
Lips. 1779.

Remède du sieur QUIRET pour guérir la
maladie de la gale ; et rapport de la société
roy. de médec. ; Paris 1787.

WICHMANN, *aitiologie der krätze*, etc. ;
Hannover 1791.

VON LOBES, *bertrachtungen uber die krätze*,
etc. ; Prague 1791.

LARIBEAU, mém. sur une nouvelle théorie
de la gale, etc. in-8.^o

J. J. POUX, sur la gale, sur les dangers
qui suivent son long séjour à la peau, et sa
repercussion ; Montpellier, an IX.

Car. Éruption prurigineuse qui se fait dans
l'interstice des doigts ; vers le pli du poignet,
vers celui du coude et de l'aisselle, sur le dos,
la poitrine, le bas ventre, vers l'aîne, à l'in-
térieur des cuisses ; au pli du jarret et autour
du talon.

Les pustules qui la caractérisent ont une
base ferme au tact, point douloureuse lors-
qu'elle n'est pas irritée, et la pointe se ter-
mine par une vésicule cristalline et très-petite.

La démangeaison dont cette maladie est accompagnée, augmente par la chaleur du lit. La gale est contagieuse.

Var. A. Gale épidémique; LINCK, gazet. salut., ann. 1773, n.^o LI.

S-esp. I. Gale miliaire.

La vésicule, en se crevant, soit d'elle-même, soit quand on l'a grattée, reste seule et noircit; les boutons, assez petits, se groupent souvent, mais se confondent rarement; ils causent une démangeaison plus vive et plus insupportable.

Rap. A. Gale canine (gale sèche, gratelle, petite gale); SAUV., loc. cit., esp. 3.

B. Gale indienne; SAUV., loc. cit., esp. 6.

C. Gale dartreuse; SAUV., loc. cit., esp. 4.

S-esp. II. Gale boutonée.

Le bout de la vésicule, en se crevant, reste vif et fournit un suintement assez considérable qui quelquefois forme une croûte large sous laquelle s'accumule de nouvelle eau, et enfin assez souvent de la suppuration. Les boutons sont larges, souvent rouges, fort animés et quelquefois confluens, c'est-à-dire, que plusieurs se confondent en une seule tumeur,

dont les sommets réunis font des exulcérations plus larges et des croûtes étendues.

Rap. A. Gale humide (gale commune ou boutonnée) ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1. — VON LOBES, *loc. cit.*, esp. 1.

Gale benigne d'HOFFMAN.

Formes.

1. Hématemèse vénérique (suite d'une application de feuilles de tabac sur des pustules de gale) ; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. IV, esp. 14.

2. Anasarque exanthématique ; SAUV., cl. X, ord. II, gen. VII, esp. 3.

3. Hydrothorax psorique ; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. XIII, esp. 9.

4. Ascite exanthématique ; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIV, esp. 8.

5. Syncope exanthématique (par une gale repercutée) ; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 19.

6. Tierce psorique ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. X, esp. 11.

7. Démence psorique ; LANDAIS, *journal de médec.*, tom. XLI, pag. 21.

8. Vertige psorique ; HERZ, *loco citato*, esp. 6.

9. Manie métastatique ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 4.

10. Carus exanthématique ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXX, esp. 18.

11. Épilepsie psorique ; WANTERS, *journ. de méd.*, tom. LVI, pag. 126.

12. Toux exanthématique ; SAUV., cl. V, ord. I, gen. V, esp. 20.

13. Asthme exanthématique ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. VIII, esp. 11.

14. Phthisie psorique ; QUARIN, *tentam. de cicutâ*, cas. XI, pag. 15.

15. Gastrodynie métastatique ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 19.

16. Hémiplegie exanthématique ; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XIX, esp. 6.

17. Amaurose exanthématique ; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. II.

A. Amaurose et paralysie psoriques ; BALDINGER, *gazet. salut.*, ann. 1790, n.º XLVII.

18. Tumeur au cou psorique ; BARATE, *journ. de médec.*, tom. XVIII, pag. 169.

19. Fungus psorique ; BRAMBILLA, *actes de l'acad. médico-chirurg. de Vienne*, tom. I, pag. 44.

20. Ophtalmie métastatique ; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. 24.

21. Synoque psorique ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. III, esp. 15.

22. Ulcères psoriques ; BÆCKING, dissert. sur l'opiniâtreté de certains ulcères vénériens compliqués de levain psorique ; *actes de l'acad. méd.-chir. de Vienne*, tom. I ; Montpellier 1792, pag. 313.

(a) *Esp. XI. Helminthèse par le pou (a).*

Syn. Phthiriase ; SAUVAGES, cl. X, cachexies ; ord. VII, anormales ; gen. XXXVI. — SAGAR, cl. III, cachexies ; ord. VII, anormales ; gen. XXXVII.

Car. Il se forme, en différentes parties du corps, des ulcérations d'où sortent des poux, avec des démangeaisons cuisantes suivies de maigreur.

Var. A. Phthiriase interne ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

B. Phthiriase de la vessie ; TRILLER, de *phthiriasi vesicæ* ; Vitteb. 1750 ; et *oper. med.*, tom. I, p. 413.

(a) Insecte parasite à six pieds égaux ; ayant l'abdomen ovale et crénelé sur les côtés ; ses antennes filiformes et courtes.

C. Phthiriasse pédiculaire ; SAUV. , *loc. cit.* ,
esp. 1.

D. Phthiriasse inguinal ; SAUV. , *loc. cit.* ,
esp. 3. — J. H. KNIPHOF , *de pediculis ingui-*
nalibus , insectis et vermibus homini molestis ;
Erfurt 1759.

Esp. XII. Helminthèse par le crinon (a).

Bibl. PATUNA ; *comment. de crinonibus ;*
Goriz 1785 ; et giornale per servire alla storia
ragionata della medicina di questo secolo ; tom.
III , pag. 190.

WOLF , *diss. med. de comedonibus ; Lips.*
1789.

Car. Démangeaisons et cuissons plus ou moins
marquées , suivies d'un dépérissement progressif.

Rap. A. Hecticie - crinonique ; WOLF ,
loc. cit.

Esp. XIII. Helminthèse par le pou du
bois (b).

(a) Ce ver a la plus grande analogie avec le dra-
gonneau , s'il n'est une espèce du même genre.

(b) Tique brune , couleur brune , dos lisse et luisant ;
antennes allongées , un peu en masses.

Car. Ampoules très-grosses, douloureuses et prurientes qui laissent après elles des ulcères rebelles. N. VALLOT; observ. sur les effets de la piqure d'un insecte, connu vulgairement dans le département de la Côte-d'Or sous le nom de pou du bois; *rec. périod. de la soc. de médéc. de Paris*, tom. XI, pag. 264.

Esp. XIV. Helminthèse par la sang-

sue (a).

Car. La sangsue se bornant à faire une plaie pour se gorger de sang, il résulte une hémorragie qui pour lors est toujours passive.

Rap. A. Hémorragie hirudineuse; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. 1, esp. 7.

B. Hémoptysie vermineuse (occasionnée par des sangsues avalées et fixées dans le gosier); SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. 11, esp. 13.

(a) Ver au corps allongé, plus ou moins aplati horizontalement, divisé par beaucoup de rides annulaires, sans soies ni tentacules, mais pourvu, à chaque extrémité, d'un disque charnu qui exerce une force de succion considérable, et ayant à son extrémité antérieure une bouche à trois petites dents; à son extrémité opposée, un anus. La sangsue médicinale est étroite, noirâtre, à six raies jaunes variées de noir en dessus, et est tachetée de jaunâtre en dessous.

B. Hématémèse vermineux (causé par une sangsue arrêtée et fixée dans l'œsophage ou dans l'estomac); SAUV., cl. IX, ord. I, gen. IV, esp. 4.

Esp. XV. Helminthèse par des larves ou par des vers indéterminés.

S-esp. I. Vers dans le cerveau.

A. Tremblement vertigineux ou céphalalgie causée par un ver dans le cerveau; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 7.

S-esp. II. Vers dans les sinus frontaux.

Bibl. J. A. WOHLFART, obs. de vermibus per nares excretis; Halæ-Magdeb. 1768; et nova acta phys. med. acad. cæsar. leop. carol. natur. curios., tom. IV, pag. 277, art. 57.

A. Manie hémicranique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 3.

B. Nystagme (resserrement spasmodique de la paupière) vermineux; TISSOT, traité des nerfs, etc., tom. II, part. II, pag. 46.

C. Migraine insectique; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. V, esp. 5.

D. Anosmie vermineuse; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. XIII, esp. 8.

E. Synoque céphalalgique ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. II, esp. 8.

S-esp. III. Vers dans les oreilles.

A. Otalgie vermineuse ; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XV, esp. 2 et esp. 4. — FILLEAU, *journ. de médéc.*, tom. LXXVI, pag. 439.

S-esp. IV. Vers dans les dents.

Bibl. C. CH. SCHAEFFER, *die eingebildeten wurmer in zähnen*, etc. ; Regensburg. 1757. M. SCHAEFFER ne croit point à l'existence de ces vers dentaires.

S-esp. V. Vers dans les poumons.

A. Toux vermineuse ; SAUV., cl. V ; ord. I, gen. V, esp. 21, var.

S-esp. VI. Vers dans l'estomac ou dans les intestins.

A. Maladie nerveuse ou violemment spasmodique dans une jeune femme de *Saint-Geniez-de-Malgloire*, terminée au bout de trois mois de souffrances les plus variées par un ver, dont l'apparence extérieure est quasi celle du *bombix dominula* du dictionnaire encyclop. ; planches d'hist. natur., XII.^e part.,

insectes , planche 83 , fig. 4 , n.º 2. Obs. communiquée à l'institut de santé et de salubrité du Gard , par le citoyen FONTAINES , médecin , membre de l'institut de santé , en lui envoyant l'insecte dans l'alcool.

B. Cardialgie vermineuse (occasionnée par des vers particuliers rendus par l'anus) ; ODHELIUS , *journ. de médéc.* , tom. LXXXVI , pag. 197. — BOENNEKEN , *frankische sammlungen* , etc. ; *Vierter band* ; Nurnberg 1759 , pag. 61 , n.º IV.

S-esp. VII. Vers dans les organes urinaires.

A. Hématurie vermineuse ; SAUV. , cl. IX , ord. I , gen. V , esp. 15.

B. Lombagie sympathique ; SAUV. , cl. VII , ord. V , gen. XXX , esp. 13.

C. Dysurie insectique ; SAUV. , cl. IX , ord. III , gen. XXVII , esp. 15.

D. Ischurie. *A.* -- Néphrelmintique ; SAUV. , cl. X , ord. III , gen. XIX , esp. 6. — *B.* -- Urétrelmintique ; SAUV. , *ib.* , esp. 27.

S-esp. VIII. Vers dans la peau.

A. Vers de la lèpre ; J. A. MURRAY , *de vermibus in leprâ obviis* , etc. ; Gotting. 1769.

B. Vers sortis des pustules de petite vérole ;

RAZOUX, *tables nosologiques*, etc., pag. 262.
(c'étoit des larves de la mouche).

Gen. XIX. STUPORISME.

Eth. de *stupor*, mot latin signifiant *stupeur*,
engourdissement.

Dénomination employée pour désigner un
genre de maladie occasionné par un poison
ou par des miasmes vénéfiques stupéfians.

Car. Stupeur avec tendance plus ou moins
rapide vers la résolution des forces, l'asphyxie
ou l'apoplexie. Dans certains cas, fièvre spé-
ciale; dans d'autres, menace de défaillances et
mort plus ou moins rapide.

Esp. I. *Stuporisme* (apnéique) par la
soustraction de l'air vital.

Car. La respiration devient pénible, em-
barrassée, foible, nulle.

S-esp. I. Par le gaz hydrogène.

Bibl. HALLÉ, recherches sur la nature et
les effets du méphitisme des fosses d'aisance;
Paris 1785.

BEDDOES et WAT, *considérations on the*

medicinal use and on the productions of factitious airs ; etc. ; Bristol 1795.

CAVALLO, *an essay on the medicinal properties of factitious airs , etc. ; London 1798.*

Car. Au bout d'une minute ou d'une minute et demie , le pouls devient foible et fréquent , en même temps que le visage , les lèvres et les extrémités prennent une couleur bleuâtre et livide ; ensuite la respiration devient graduellement difficile , laborieuse et convulsive ; le sentiment et le mouvement se perdent ; l'asphyxie est générale et mortelle : le sang , ainsi que toutes les parties , ont une teinte brunâtre.

Rap. A. Asphyxie latrinaire ; SAUV. , cl. VI , ord. IV , gen. XXIV , esp. II.

B. Amaurose latrinaire ; SAUV. , cl. VI , ord. I , gen. IV , esp. 9.

S-esp. II. Par le gaz hidrogène sulfuré.

Car. L'asphyxie est presque instantanée. Le sang , toutes les parties et sur-tout le foie ont une couleur noirâtre très-foncée.

Vapeurs mortelles du Vésuve ; D. BARTALONI , *atti dell'academia delle scienze di Siena* , etc. ; in *Siena* 1771 , tom. IV , art. 8 , pag. 201

S-esp. III.

S-esp. III. Par le gaz azoté.

Car. Les accidens sont ceux de la première sous-espèce ; l'asphyxie est moins prompte.

S-esp. IV. Par le gaz acide carbonique.

Bibl. SPIELMAN , *historia aeris factitii* ; Argent. 1776--77 ; et coll. de WITWER , tom. IV , pag. 36 et 110.

BASSIANI CARMINATI , *de animalium ex mephitibus et noxiis halitibus interitu* , etc. ; Laude-Pompeia 1777.

EMMET , *de aere fixo , sive acido aereo* ; Edinb. 1784 ; et coll. d'Edimbourg , tom. IV , pag. 464.

PORTAL , obs. sur les effets des vapeurs méphitiques dans l'homme , etc. ; sixième édition , Paris 1787.

BUCQUET , mémoire sur la manière dont les animaux sont affectés par différens fluides aéri-formes méphitiques , etc. ; Paris 1788 ; et *hist. et mém. de la soc. roy. de médéc. de Paris* , ann. 1776 , pag. 177.

Car. Les animaux plongés dans ce gaz y périssent en peu de secondes avec des efforts convulsifs qui sont sur-tout très-marqués dans

la respiration ; leurs muscles sont dans le plus grand affaissement ; leur sang est peu coagulé, il a une couleur obscure, brunâtre, de même que toutes les parties de leur corps ; souvent aussi les poumons sont si contractés, qu'ils se précipitent au fond de l'eau.

Rap. A. Asphyxie méphitique ; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXXIV, esp. 9.

A. Asphyxie carbonique ; SAUV., *ib.*, esp. 16.

B. Asphyxie par le mout ; SAUV., *ibid.*, esp. 3.

B. Catalepsie méphitique ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXV, esp. 3.

C. Apoplexie méphitique ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXXI, esp. 14.

S-esp. V. Par le gaz carboneux.

Bibl. CHAUSSIER, précis d'expériences et d'observations sur les effets de quelques gaz, et particulièrement du gaz carboneux, sur les animaux ; *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*, tom. XII, pag. 354.

Car. Les animaux périssent moins promptement que dans la sous-espèce précédente ; leurs muscles restent encore un peu susceptibles

de contraction par différens irritans ; leur sang , ainsi que toutes les parties du corps ont une teinte écarlate , vermeille , très-différente de cette couleur brunâtre que l'on voit dans ceux qui ont été asphyxiés par l'acide carbonique.

S-esp. VI. Par la fumée.

Car. La respiration est promptement entrecoupée ; on suffoque avec larmoyement et anxiété.

Rap. A. Asphyxie par la fumée ; SAUV. , cl. vi , ord. iv , gen. xxiv , esp. 2.

B. Catalepsie par la fumée ; SAUV. , cl. vi , ord. v , gen. xxv , esp. 3.

S-esp. VII. Par un arôme , savoir.

A. Du *comocladia dentatâ* ; LINN. , triand. monog.

B. Du safran oriental , *crocus sativus* ; LINN. *idem.*

C. De diverses espèces de chèvre-feuille , *lonicera* ; LINN. , pent. monog.

D. Du laurier-rose , *nerium oleander* ; LINN. , *idem.*

E. De la *datura stramonium* ; LINN. , *id.*

F. De la dentelaire , *plumbago europæa* ; LINN. , *idem.*

Rap. A. Carus par la dentelaire; SAUV., cl. VI, ord. v, gen. xxx, esp. 101.
G. Du lis, *lilium candidum*; LINN., hexand. monog.

H. Du *pollanthes tuberosa*; LINN., idem.

I. De l'*adenanthera pavonica*; LINN., idem.

K. De la rose de provins, *rosa centifolia*; LINN., icosand. polyg.

L. Du mancenilier, *hippomane mancenilla*; LINN., monœc. monad. Voy. encycl. méthod., dictionn. botanique, art. mancenilier.

M. De l'upa (a) des malais, des javanais; ipu des macassarais, Voy. PUICHN, mater. medic. venen. regni vegetab., art. 277, pag. 177.

2. esp. VII. Par un stome, 25012.

(a) VALMONT DE BOMARE avoit annoncé, sur la foi des voyageurs, que les exhalaisons de cet arbre qui ne croissoit que dans une île déserte, étoit aussi funeste aux productions de la nature qu'aux animaux et à l'espèce humaine. Le docteur DARWIN, botanic garden, tom. II, édité en hollandais par N. P. FOERSCH, voy. biblioth. britann., scienc. et arts, tom. XIII, pag. 88, a renchéri sur tous les détails publiés sur les propriétés virulentes du bohon upas (*description of the poison tree, etc.*). Mais tout ce qui concerne l'histoire de cet arbre est fabuleux. C'est ce qu'attestent des détails consignés dans la gazette salubre, ann. 1793, pag. 356, et dans le bulletin des sciences, ann. IV.

Car. Il se déclare d'abord un affoiblissement suivi d'un soulèvement d'estomac et d'une lassitude générale. Viennent ensuite la perte de la parole, la sueur froide, le vertige, l'asphyxie mortelle.

Esp. II. Stuporisme (synéqué) par l'action du miasme marécageux ou cloacal.

Bibl. LANCISI, *de noxiis paludum effluviis, libri duo*; Romæ 1717.

PLATNER, *de morbis ex immunditiis*; Lips. 1731; et *opuscul. medic.*, tom. 1, pag. 70.

— *De pestiferis aquarum putrescentium expirationibus*; Lips. 1747; et *opuscul. medic.*, tom. 1, pag. 238.

J. L. SCHILLING, *de causis eur febres in locis paludosis sint frequentiores et perniciosiores?* Altorf 1753.

S. PELLET, *de palustrium locorum insalubritate à miasmate oriundâ*; Edinb. 1779.

Rapport concernant les marres qui sont au bas de la ville de Château-Thierry; Paris 1782.

ORLANDI, *de exsiccandarum paludum pontinarum utilitate, deque infirmitatibus quæ ab aquis stagnantibus oriundis*; Romæ 1783.

FERNANDES, *sobre las enfermedades que podian producir las copiosas iluvias e inundaciones de aquel anno, etc.*; Madrid 1787.

VAN MARUM et PAEST VAN TROOSTWYK, dissert. couronnée par la société batave de Rotterdam, sur la nature des différentes vapeurs qui s'élèvent des terrains marécageux, des fanges, des latrines, des cloaques, etc.; *verhandelingen van het batadfsch genootschap*, etc., vol. VIII; *Rotterd.* 1787, art. 1.

BAUMES, mémoire couronné par la société royale de médecine de Paris, sur les maladies qui résultent des émanations des eaux stagnantes, etc.; *Nismes* 1789.

BIKKER, mémoire couronné par la société batave de Rotterdam, sur le dessèchement des marais et les maladies qui en proviennent; *verhandelingen*, etc., vol. IX; *Rotterd.* 1790, art. 1.

Car. Après un état de débilité plus ou moins sensible, il se déclare une série d'accès que caractérisent pour l'ordinaire le froid, le chaud et la sueur, qui reviennent d'une manière régulière ou erratique, et que séparent une intermission ou une rémission. Dans quelques

cas, la subintrance des accès donne à cette maladie fébrile une apparence continue.

Rap. A. Fièvres intermittentes.

Syn. Fièvres intermittentes ; SAUVAGES , cl. II , fièvres ; ord. III. — LINNÉ , cl. II , critiques ; ord. II. — VOGEL , cl. I , fièvres ; ord. I. — CULLEN , cl. I , pyrexies ; ord. I , fièvres ; sect. I. — SAGAR , cl. XII , fièvres ; ord. III. — MACBRIDE , cl. I , universelles ; ord. I , fièvres ; gen. II. — VITET , cl. I , fièvres ; ord. IV.

Bibl. J. F. CARTHEUSER , *de febribus intermittibus epidemicis* ; *Francof. ad Viadrum* 1749 ; et coll. de HALLER , tom. v , pag. 83. — *De febrium intermittentium vulgarium et epidemicarum differentiâ* ; *Francof. ad Viad.* 1751.

C. T. REINHARD , *carmen de febribus intermittentibus spuriiis seu epidemicis ann. 1747 à 1752* ; *Dresdæ* 1752 ; *Glogoviæ* 1759.

M. ALBERTI , *de febre intermittente senibus lethifera* ; *Magdeb.* 1754.

J. G. GMELIN , *de innocuo atque egregio corticis peruviani in febribus intermittentibus usu* ; *Tubing.* 1754.

J. PH. NONNE, *de febribus intermittentibus*; Erford 1754.

C. F. KALTSCHMID, *de febribus intermittentibus et ex earum genere continuis*; Venedis 1757.

De recondita febrium intermittantium tum remittentium naturâ et de earum curatione, etc. (auct. BOUVARD); Amstelodami 1759.

J. FLEURY, *de febris intermittentis naturâ in genere*; Edinb. 1760.

N. F. COLINY, *tractatus de febribus intermittentibus cognoscendis et curandis*; etc.; Argent. 1760.

A. NIETZKY, *de febrium intermittantium symptomatibus quibusdam acutis*; Halæ 1763.

A. FOTHERGILL, *de febre intermittente*; Edinb. 1763.

G. ROWLAND, *de febre intermittente*; Edinb. 1763.

DE REYNAL, *essai sur la méthode de guérir les fièvres putrides, malignes, intermittentes*, etc.; Paris 1763.

M. M. MARTINI, *de nimio et improvido corticis peruviani in febribus intermittentibus usu*; Bucephallæ 1763.

J. SMYTH, *de febribus intermittentibus*; Edinb. 1764.

CH. FR. KOCH, *dissert. sistens considerationem pathologico-practicam febrium intermittentium*; Halæ 1764.

E. A. NICOLAI, *de methodo febres intermittentes curandi*; Jenæ 1766.

A. E. BUCHNER, *de methodo medendi febribus intermittentibus*; Halæ 1768.

J. LIND, *an essay on diseases incidental to europeans, etc. an appendix concerning intermittent fevers, etc.*; Lond. 1768.

A. E. BUCHNER, *de primis viis morborum periodicorum sede frequentissima*; Halæ 1768.

J. G. GIBSON, *a treatise on continual, intermitting, eruptive, and inflammatory fevers, etc.*; London 1769.

L. S. KOREFF, *de causis febrium intermittentium autumnalium*; Halæ ad Salam. 1769.

G. PENNI, *de motu febrium periodico*; Edinb. 1769.

J. BRANDRETH, *de febribus intermittentibus*; Edinb. 1770; et coll. de WEBSTER, tom. I, pag. 352.

F. CH. JUNCKER, *de causâ proximâ febrium intermittentium, naturæ horroris, doloris, caloris ex rationibus physico-chimicis deductæ superstructa*; Halæ 1770.

LINNÉ, *febrium intermittentium curatio va-*

ria ; Upsal. 1771 ; et coll. de LINNÉ , tom. IX , pag. 143.

D. LYONS , *practical essays upon intermitting fevers* , etc. ; Lond. 1772.

PH. A. BOEHMER , *de curatione febrium intermittantium ex æstuantia infida et nociua* ; Halæ 1774.

W. TRNKA , *historia febrium intermittantium* ; etc. ; Vindobonæ 1775.

TH. BOWDLER , *de febrium intermittantium naturâ et indole* ; Edinb. 1775.

G. F. TEISSIER , *ergo à febre vulgari intermittente cito compescenda, abstinencia* ; Paris 1775.

LINNÉ , *de febrium intermittantium causâ* ; Upsaliæ 1777 ; et coll. de LINNÉ , tom. X , pag. I.

L. C. SEGER , *de febribus intermittantibus sub finem æstatis loco dyssentericiæ grassantibus* ; Helmstad. 1777.

G. BROWN , *de usu corticis peruviani in febribus intermittantibus* ; Edinb. 1779.

DUCHANOT , *mém. sur l'usage des narcotiques dans les fièvres intermittentes* , etc. ; Paris 1780.

S. M. CASSEL , *de febribus intermittantibus* ; Giessæ 1781.

De febribus intermittentibus, typho et synocho, coll. de WEBSTER, 1781, tom. 1, pag. 506.

W. SAUNDERS, *observ. on the superior efficacy of the red peruvian bark in the cure of agues and other fevers, etc.*, third. edit. Lond. 1782--83.

J. J. SCHAERTLICH, *de usu opii in febribus intermittentibus*; Gotting. 1783; et coll. de FRANCK, tom. 1, pag. 203.

ED. RIGBY, *an essay of the use on the red peruvian bark in the cure of intermittens, etc.*; Lond. 1783.

F. BUCHANHAN, *de febribus intermittentibus medendis*; Edinb. 1783; et *dissertat. medic. Edinburg.*, art. 021.

J. CH. FIDLER, *tractatus de febribus intermittentibus*; Pragæ et Viennæ 1784.

CH. CH. MELART, *de tempore exhibendi emetica in febribus intermittentibus, etc.*; Gott. 1784.

J. COLLIER, *de febribus intermittentibus complectens*; Edinb. 1784; et *dissert. medic. Edinb.*, art. 018.

C. STRACK, *observat. medicin. de febribus intermittentibus et quâ ratione eisdem medendum sit*; Offenbach 1785.

J. H. NAUHEIMER, *de febris intermitten-
tibus*; Mogunt. 1785.

VOULLONE, mém. couronné par l'académie
de Dijon, sur le caractère des fièvres inter-
mittentes, etc.; Avignon 1786.

TH. FOWLER, *medical reports of the effects
of arsenic in the cure of agnes remitting fevers
and periodic headachs*, etc.; Lond. 1786.

DURAND, mémoire sur les fièvres intermit-
tentes; Paris 1788.

F. G. VON HOVEN, *versuch uber das wæch-
selfieber und seine heilung besonders durch
chinarinde*, etc.; Wintherthur 1789.

CH. E. A. NEUNES, *dissert. sistens quædam
momenta de cortice peruviano ejusque usu in
febris intermittenibus*; Jena 1789.

BOUFFEY, essai sur les fièvres intermittentes,
etc.; Paris 1797, an VI.

Car. Les accès sont terminés par une in-
termission véritable; et lorsque ces accès ont
une extension telle, que l'intermission n'est
pas sensible; le caractère se trouve principā-
lement dans le changement de l'état du malade
de bien en mal et de mal en bien, comparé
avec la brièveté du temps dans lequel ce change-

ment s'est opéré. Ce caractère est également propre à la fièvre rémittente.

Rap. B. Fièvres rémittentes.

Syn. Fièvres rémittentes; SAUVAGES, cl. II, fièvres; ord. II. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. II.

Fièvres exacerbantes; LINNÉ, cl. II, critiques; ord. III. — VITET, cl. I, fièvres; ord. II.

Fièvres continues; VOGEL, cl. I, fièvres; ord. II, continues; sect. I, simples.

Syneches des grecs; B. CASTELLI, *lexicum medicum*; Genevæ 1746, pag. 702 et 213.

Fièvres continues périodiques; SENNERT, *de febris libri quatuor*; Wittebergæ 1619-1653, lib. III, cap. 13.

Fièvres continentes; R. MORTON, *exercitationes de morbis universalibus acutis*; Londini 1692, exerc. II.

Fièvres continues rémittentes, proportionnées; F. TORTI, *therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas inopinato ac repente lethales*; Mutinæ 1709-30; Venetiis 1743; Lips. 1756.

Fièvres continues rémittentes; BOERHAAVE,

aphorismi de cognoscendis et curandis morbis;
Lugd-Batav. 1709-42; Lovanii 1751; aph.
727.

Fièvres composées d'une période aiguë ;
JUNCKER, *tab.* LXXXII.

Fièvres intermittentes dégénérées, et fièvre
tierce automnale ; LEROY, *mém. sur les fièvres*
aiguës ; 1771, pag. 7 et 8.

Fièvres rémittentes ; JOHN MILLAR ; observ.
sur les maladies qui règnent le plus fréquem-
ment en Angleterre, etc. ; Londres 1780-83
(en anglais). Voy. *rec. périod. de la soc. de*
méd. de Paris ; tom. 1, pag. 69.

Bibl. F. HOME, *de febre remittente* ; Edinb.
1750 ; et coll. d'Edimbourg, tom. 1, pag.
435.

H. CH. HOERLE, *de febribus continuis pa-*
roxizantibus seu intermittentibus extensis ; Ar-
gentor. 1771.

C. STRACK, *observationes medicinales de*
diversâ febris continuæ remittentis causâ ; Fran-
cof. et Mogunt. 1789.

BAUMES, *mém. couronné*, sur l'usage du
quinquina dans les fièvres rémittentes ; Nismes
1790.

J. L. ALIBERT, *diss. sur les fièvres péri-*

éieuses ou ataxatiques intermittentes; Paris, an VIII et an IX-1801. ; cl. I, fièvres ; ord. I, intermittentes ; sect. I, intermittentes ; gen. I, intermittentes ; J. B. CH. DESAINS, diss. sur la fièvre meringo-gastrique (bilieuse) rémittente ; Paris, an IX-1801. ; cl. I, fièvres ; ord. I, intermittentes ; sect. I, intermittentes ; gen. I, intermittentes ;

Car. A la chute des accès, les symptômes principaux disparaissent ou s'amendent ; mais il reste toujours quelques phénomènes morbifiques jusqu'à l'entière guérison.

S-esp. I. Fièvre quotidienne.

Syn. Quotidienne; GULLEN, cl. I, pyrexies ; ord. I, fièvres ; sect. I, intermittentes ; gen. I, intermittentes ;

Bibl. CH. FR. BLAUBERG, *diss. med. sistens quædam ad febrem quotidianam spectantia* ; Jena 1791.

Car. Accès analogues qui reviennent chaque vingt-quatre heures et, pour l'ordinaire, le matin ou pendant la nuit.

Var. A. Intermittente.

Les accès reparoissant après un intervalle lucide.

Syn. Quotidienne ; SAUVAGES, cl. II, fièvres ;

ord. III, intermittentes; gen. IX. — LINNÉ, cl. II, critiques; ord. III, intermittentes; gen. XV. — VOGEL, cl. I, fièvres; ord. II, intermittentes; gen. I. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. III, intermittentes; gen. IX. — VITET, cl. I, fièvres; ord. IV, intermittentes; gen. I. — PINEL, cl. I, fièvres; ord. III, adeno-méningées; gen. VI.

Bibl. S. MUNCK, de febre quotidianâ intermittente; Argentor. 1754.

Rap. A. Quotidienne simple; SAUV., loc. cit., esp. I. — Quotidienne légitime; SENNERT, HOFFMAN, tom. II, pag. 34.

B. Quotidienne partielle (n'affectant qu'une des extrémités supérieures); SAUV., loc. cit., esp. 10.

C. Quotidienne sciatique; SAUV., loc. cit., esp. 5.

Sciatique intermittente; SAUV., cl. VII, ord. V, gen. XXXI, esp. I-10.

D. Quotidienne épileptique; SAUV., loc. cit., esp. 4.

E. Quotidienne céphalalgique; SAUV., loc. cit., esp. 6.

Céphalalgie intermittente; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XI, esp. 7.

Céphalée

Céphalée fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XII, esp. 4.

F. Quotidienne néphralgique; SAUV., loc. cit., esp. 7.

Néphralgie fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXV, esp. 13.

G. Quotidienne strangurieuse; SAUV., loc. cit., esp. 11.

H. Hystéralgie fiévreuse; SAUV., loc. cit., esp. 9.

I. Ophtalmie fiévreuse; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. 23.

Quotidienne ophtalmique; CULLEN, loc. cit., esp. 1; var. B.

Var. B. Rémittente.

Point d'apyrexie dans l'intervalle des accès.

Syn. Amphimerine; SAUVAGES, cl. II, fièvres; ord. II, rémittentes; gen. VI. — LINNÉ, cl. II, critiques; ord. III, exacerbantes; gen. XX. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. II, rémittentes; gen. VI. — VITET, cl. I, fièvres; ord. II, exacerbantes; gen. I.

Quotidienne continue; VOGEL, cl. I, fièvres; ord. II, continues; gen. XV.

Fièvre (a) phlegmatique périodique; AVI-

(a) Cette fièvre et la suivante, généralement peut-

CENNE, *quarti canonis fen prima de febribus*; Patavii 1659, cap. 46.

Fièvre lymphatique première; ETTMULLER, *oper*; Genev. 1736, tom. 11; *colleg. consult.*, cas. XXXI, pag. 1459.

Rap. A. Amphimerine singultueuse; SAUV., *loc. cit.*, esp. 13.

Lyngode; VOGEL, *loc. cit.*, esp. XXVI.

S-esp. II. Fièvre tierce.

Syn. Tierce; CULLEN, cl. 1, pyrexies; ord. 1, fièvres; sect. 1, intermittentes; gen. 1.

Bibl. STAHL, *de tertianâ febrî genium universum manifestante*; Halæ 1706; et coll. de HALLER, tom. V, pag. 1.

Car. Accès semblables qui reviennent périodiquement aux environs de midi; ou en avançant, pour l'ordinaire, de deux heures les uns sur les autres: après quarante-huit heures de l'invasion de l'accès précédent.

Var. A. Intermittente.

être les fièvres quotidiennes, sont plutôt des formes de blennosé pyrétiqûe, que de vraies sous-espèces de fièvres intermittentes ou rémittentes.

Syn. Tierce ; SAUV. ; cl. II , fièvres ; ord. III , intermittentes ; gen. X. — LINNÉ , cl. II , critiques ; ord. II , intermittentes ; gen. XVI. — VOGEL , cl. I , fièvres ; ord. I , intermittentes ; gen. II. — SAGAR , cl. XII , fièvres ; ord. III , intermittentes ; gen. X. — VUET , cl. I , fièvres ; ord. IV , intermittentes ; gen. II.

Bibl. H. G. KASTENHOLTZ , *consectaria theor.-pract. ex historis quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta* ; Altorf 1745 ; et coll. de HALLER , tom. V , pag. 61.

J. G. DUISING , *de methodo medendi febribus intermittentibus tertianis* ; Marburg. 1753.

G. GRIEVE , *de febribus tertianis intermittentibus* ; Edinb. 1770.

I. F. DELIUS , *de malignitate circa febres tertianas* ; Erlang. 1786 ; et *adversar. argum. physic. medic. fascicul. V , diss. XXIII.*

Car. Apyrexie parfaite qui termine les accès et en sépare les intervalles.

Rap. A. Tierce limitée ; les accès se terminant en douze heures.

Tierce légitime ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

Tierce accidentelle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 12.

B. Tierce étendue ; les accès durant plus de douze heures.

Tierce bâtarde ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

Tierce incomplète ; VITET, *loc. cit.*, esp. XI.

C. Tierce doublée ; avec deux accès dans le même jour ; et ces accès se correspondant alternativement lorsqu'ils sont inégaux.

Var. B. Rémittente.

Syn. Tritæophye ; SAUVAGES, cl. II, fièvres ; ord. II, rémittentes ; gen. VII. — SAGAR, cl. XII, fièvres ; ord. II, rémittentes ; gen. VII. Tritée ; LINNÉ, cl. II, critiques ; ord. III, exacerbantes ; gen. XXI.

Tierce continue ; VITET, cl. I, fièvres ; ord. II, exacerbantes ; gen. II.

Fièvre rémittente ; 1.^o adéno-meningée (a) ; PINEL, cl. I, fièvres ; ord. III, adéno-meningées ; gen. VIII. — 2.^o Adynamique ; PINEL *ib.* ord. IV, adynamiques ; gen. X. — 3.^o Fièvre rémittente ou intermittente ataxique ; PINEL *ib.* ord. V, ataxiques ; gen. XIV.

Fièvres périodiques pernicieuses ; TORTI, *loc. cit.*

(a) Voyez ci-dessus, pag. 31, S-esp. III.

Bibl. PUJATI, de morbo narroniano ; Feltriæ 1747.

J. GRAINGER, *historia febris anomalæ batavæ annorum 1746 à 1748 ; Edinburgensis 1753.*

A. E. BUCHNER, *de febris intermittentis complicatione cum malignâ casu quodam illustratâ ; Halæ 1757.*

P. A. SCHMIDT, *de febrium mali moris continuarum et intermittantium circa autumnum anno 1757, epidemicè sævientium, origine, indole, causis, præservatione ac curatione ; Jenæ 1759.*

J. G. ROEDERER, *de febre ex intermittente continuâ ; Gotting. 1760.*

LAUTTER, *historia medica biennalis morborum ruralium qui..... Læxemburgi.... dominati sunt, etc. Vindobonæ 1761.*

Rapport sur l'épidémie de Villeneuve-lez-Avignon ; *hist. de la soc. roy. de médec. de Paris*, ann. 1776, pag. 213.

P. VAN ELSACKER, *specimen med. pract. febrem remittentem continuam bilioso-putridam anno 1772 Antuerpiæ, etc. ; Antuerpiæ 1779.*

GARDEIL, mémoire sur une épidémie qui a régné à Toulouse pendant l'automne de l'année 1772 ; *histoire et mém. de la société royale*

de médéc. de Paris ; Paris 1779 , pag. 14 des
mém.

N. RIGLER , *constitutio epidemica annorum*
1775-76-78-79 ; *Vratislaviæ* 1780.

Car. L'intervalle des paroxismes n'est marqué
que par une rémission.

Rap. A. Lipyrie (avec froid des parties
extérieures et chaleur interne) ; VOGEL , cl.
I , ord II , gen. XXIV.

Tritæophye lipyrique ; SAUV. , cl. II , ord. II ,
gen. VII , esp. 8.

B. Tierce algide , avec sentiment de froid ,
croissant pendant l'accès , pour l'ordinaire gla-
cial , quelquefois accompagné de soif et de
chaleur douce au tact.

Tierce algide ; TORTI , *loc. cit.* , pag. 138.
— ALIBERT , *diss. sur les fièv. pern. ou atax.*
intermit. , 2.^e édit. , pag. 18.

Frisson fébrile ; SAUV. , cl. IV , ord. IV ,
gen. XVII , esp. 7.

Fièvre pétéchiiale algidique ; ACREL , *kongl.*
vetenskaps akademiens handlingar for aor 1767 ,
vol. XXVIII ; *Stockolm* 1767 , art. 9 , pag.
320.

C. Tierce sub-sanglante ou atrabilaire ; avec

flux de ventre semblable à de la lavure de chair); TORTI, *de febr. period. pern.*, pag. 136. — ALIBERT, *loc. cit.*, pag. 7.

Hépatirrhée intermittente ; SAUV., cl. IX, ord. II, sect. I, gen. VIII, esp. 7.

D. Tierce syncopale (l'accès étant caractérisé par des défaillances); TORTI, *loc. cit.*, pag. 138. — ALIBERT, *loc. cit.*, pag. 16.

Tierce syncopale ; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.
Syncope fébrile ; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 17.

E. Peste intermittente ; PARIS, *mém. sur la peste*, esp. 5.

F. Tierce hystérique ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. X, esp. 8.

Hystérie fiévreuse ; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XX, esp. 8.

G. Fièvre intermittente ataxique délirante ; ALIBERT, *diss. sur les fièv. pern. ou atax. interm.*, pag. 31, §. XI.

Tierce maniaque ou avec manie convulsive ; GEOFFROY, *constit. du printemps de l'année 1792 ; journ. de méd.*, tom. LXXXVII, pag. 188.

H. Tétanos fiévreux ; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. 10.

I. Tierce carotique.

Voy. G. F. SIGWART, *de febre tertianâ intermittente soporosa ut plurimum funesta, feliciter tamen curanda*; Tubing. 1757.

A. E. BUCHNER, *de febre tertianâ, intermittente epidemicâ, soporosa, apoplexiam mentiente*; Halæ 1763.

Tierce léthargique; TORTI, *loc. cit.*, pag. 138. — Carotique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 10. — Soporeuse; ALIBERT, *loc. cit.*, pag. 21, §. X.

Tritæophye carotique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

Parapoplexie; CH. PISON, *select. observat. et consil.*, etc., pag. 78.

Apoplexie fébrile; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXXI, esp. 9.

K. Tierce épileptique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 16.

Fièvre intermittente ataxique, épileptique; ALIBERT, *loc. cit.*, pag. 45, §. XV.

Fièvre intermittente ataxique, convulsive; ALIBERT, *ibid*, pag. 46, §. XVI.

L. Tierce avec coqueluche; BJÆRALUND, *gazett. salut.*, ann. 1788, n.º XLVII.

M. Tierce asthmatique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

Tierce catarrale ; MORAND , *de quibusdam tertianis perniciosis comment.* ; cap. 3.

Fièvre intermittente ataxique , dyspnéique ; ALIBERT , *loc. cit.* , pag. 47 , §. XVIII.

Asthme fiévreux ; SAUV. , cl. V , ord. II , gen. VIII , esp. 20.

N. Fièvre intermittente ataxique céphalalgique ; ALIBERT , *loc. cit.* , pag. 46 , §. XVII.

O. Tierce cardialgique.

Tierce cardiaque ; TORTI , *loc. cit.* , pag. 137. — ALIBERT , *loc. cit.* , pag. 9 , §. VI.

Cardialgie fiévreuse ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XX , esp. 4.

Gastrodynie fiévreuse ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXI , esp. 17.

P. Assode (avec des anxiétés soutenues) ; VOGEL , cl. I , ord. II , gen. XXVII.

Tritæophye assode ; SAUV. , cl. II , ord. II , gen. VII , esp. 5. — L. HEISTER , *diss. sistens theoriam atque therapiam molesti februm essentialium symptomatis cujus signum est anxietas* ; Helmst. 1755. — J. F. FASEL , *de anxietate , speciatim febrili* ; Jenæ 1763.

Q. Tierce cholérique (avec vomissement bilieux et déjection bilieuse pendant l'accès) ; TORTI , *loc. cit.* , pag. 135. — ALIBERT , *loc. cit.* , pag. 5 , §. IV.

Cholérée intermittente ; SAUV. , cl. IX , ord. II , sect. II , gen. XV , esp. 5.

Tierce émétique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7.

R. Tierce avec colique ; MORTON , *de pro-teiform. febr. intermit. genio* , *histor.* 16 , 17 , 18.

Colique fiévreuse ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXII , esp. 21.

Rachialgie fiévreuse ; SAUV. , cl. VII , ord. V , gen. XXIX , esp. 2.

S. Fièvre intermittente ataxique hydrophobique ; ALIBERT , *loc. cit.* , pag. 49 , §. XIX.

T. Tierce hémiplegique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 20.

U. Tierce avec aveuglement ; MORAND , *de quibusdam tertianis perniciosis comment. cap.* 3.

Amaurose intermittente ; SAUV. , cl. VI , ord. I , gen. IV , esp. 13.

V. Fièvre ataxique intermittente néphrétique ; ALIBERT , *loc. cit.* , pag. 43 , §. XIV.

X. Tierce diaphorétique (avec sueur aussitôt après le froid , sans calme sensible pendant l'accès) ; TORTI , *loc. cit.* , pag. 137. — ALIBERT , *loc. cit.* , pag. 12 , §. VII.

Tritæophye élode (typhode de quelques auteurs) ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

Elode ; VOGEL , cl. 1 , ord. 11 , gen. XXI.
 Ephidrose fiévreuse ; SAUV. , cl. IX , ord.
 111 , gen. XX , esp. 7.

Y. Tierce inflammatoire.

Fièvre rémittente inflammatoire ardente ;
 MACBRIDE , cl. 1 , ord. 1 , gen. 111 , esp. 1 ,
 var. C.

Fièvre de Lausanne ; TISSOT , de *febre Lau-*
sanensi , pag. 116 , 135.

Fièvre rémittente bilieuse inflammatoire ;
 SELLE , *pyretol.* , ord. 11 , gen. 1.

Fièvre rémittente des camps (*remitting fever*
of the camp) *pringle observat. on the diseases*
of the army , 1765 , pag. 105 , 157.

Z. Tierce rémittente inflammatoire péripleu-
 monique ; MACBRIDE , cl. 1 , ord. 1 , gen. 111 ,
 esp. 1 , var. B.

Fièvre intermittente ataxique péripleumoni-
 que ; ALIBET , *loc. cit.* , pag. 37 , §. XII.

AA. *Causus* ou *kausos* ; avec chaleur ar-
 dente.

Bibl. Réflexions sur la nature de la cons-
 titution estivale de 1781 , dans une partie de
 la France , par la *soc. roy. de médec.* , lues
 le 18 septembre 1781.

B. RUSCH , sur la fièvre bilieuse rémittente

qui a régné à Philadelphie pendant l'été de 1780. *Medical inquiries*, etc. ; *Philadelph.* 1791.

Tritæophye causus ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

Tritæophye américaine ; SAUV., *ib.*, esp. 12.

BB. Tierce pleurétique ; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. X, esp. 4.

Pleurésie périodique ; SAUV., cl. 111, ord. 11, gen. XIII, esp. 14.

Tierce pleurétique ; MORTON, *loc. cit.*, *hist.* 21.

Pleurodynie fébrile ; SAUV., cl. V, ord. 11, gen. XI, esp. 15.

Fièvres intermittentes de Vienne en 1790 ; FERRO, *ephemerides medicæ* ; *Viennæ* 1792.

CC. Tierce dyssentérique ; GALEATI, *comment. acad. Bononiens.*, tom. V, part. II, pag. 221 et 222.

Tierce demi-dyssenterique ; BURSERI, *inst. med. pract.* ; *Neapol.* 1790, vol. 1, pag. 256.

Voy. J. ROLLO, *observations on the acute dysentery*, etc. ; *Edinb.* 1786.

DD. Tierce pétéchiiale ; SAUV., cl. 11, ord. 111, gen. X, esp. 3.

Tierce pétéchizante ; MORAND, *loc. cit.*, cap. 3.

EE. Tierce miliaire , SAUV. , cl. II , ord. III , gen. X , esp. 21.

FF. Tierce ortiaire ; SAUV. , cl. II , ord. III , gen. X , esp. 22.

GG. Tierce puerpérale ; OSIANDER , *beobachtungen und erfahrungen* , etc. ; Tubing. 1787.

HH. Tierce scorbutique ; MORAND , *loc. cit.* , cap. 3. — BURSERI , *loc. cit.* , pag. 271.

II. Tierce arthritique ; MORTON , *loc. cit.* , hist. 12 et 22. — BURSERI , *loc. cit.* , tom. I , pag. 267. — STRACK , *loc. cit.* , pag. 143.

KK. Fièvre rémittente accompagnée d'accidens graves et de l'éruption d'une humeur terreuse par tout le corps ; JEMOIS , *journ. de médec.* , tom. LXXIX , pag. 337.

S-esp. III. Double-tierce.

Car. Dans une période de vingt-quatre heures , il y a deux accès pour l'ordinaire inégaux , mais se correspondant à jours alternatifs.

Var. A. Intermittente.

Intermission manifeste dans l'intervalle des accès.

Rap. A. Double-tierce ; SAUVAGES , cl. II ,

fièvres ; ord. III , intermittentes ; gen. X , esp. 13. — LINNÉ , cl. II , critiques ; ord. II , intermittentes ; gen. XVIII. — SAGAR , cl. XII , ord. III , intermittentes ; gen. X , esp. 19.

B. Tierce doublée (les deux accès qui caractérisent la double tierce ayant lieu dans le même jour ; et le second jour étant apyrexique) ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 13. — SAG. , *loc. cit.* , esp. 20.

Double-tierce intermittente syncopale ; LE-CHEVEREL , *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris* , tom. XI , pag. 391.

Var. B. Rémittente.

Syn. Hémitritée des grecs , de CELSE.

Bibl. G. FANOIS , *de morbo epidemico hactenus inaudito , præteritâ æstate anni 1669 , Lugduni-Batavorum vicinisque locis grassante ; Leydæ 1671.*

I. A. FISCHER , *de hepatitide pegaviæ in circulo Lipsiensi epidemice grassante ; Erford 1718 ; et coll. de HALLER , tom. V , pag. 143.*

I. DE KOKER , *de morbo epidemico anni 1719 ; et coll. de HALLER , tom. V.*

H. W. ARNOLD , *de febre stomachali epi-*

*demicâ ; Marburg. 1727 ; et coll. de HALLER ,
tom. V , pag. 129.*

G. DETHARDING , *de febribus eyderostadien-
sibus epidemicis vulgo stoppelfieber ; Hafniæ
1735.*

F. I. MOLITOR , *de febre continuâ malignâ
et intermittente tertianâ utraq. ad Rhenum
ann. 1734 et 1735 , epidemica et castrensi ;
Heidelberg. 1736 ; et coll. de HALLER , tom.
V , pag. 263.*

I. G. WAGNER , *de febre quâdam acutâ in
tractu Germaniæ mari baltico ac præsertim
Lubecæ observatâ ; Lubec. 1737 ; et coll. de
HALLER , tom. II , pag. 167.*

P. GOBB , *diss. amplectens historiam et curam
epidemicæ febris quæ..... tergestes incolas
vexavit ; Viennæ 1754 ; et coll. de HALLER ,
tom. VII , pag. 829.*

LINNÉ , *febris Upsaliensis ; Upsal. 1757 ;
et coll. de LINNÉ , tom. V , pag. 18.*

S. AURIVILL , *de febribus intermittentibus
malignis ; Upsal. 1765 ; et coll. de BALDIN-
GER , tom. I , pag. 1.*

J. RAYMOND , *diss. exhibens descriptionem
febrium intermittantium autumnalium quot
annis Mittelburgi..... grassantium ; Duisburgi
1767 ; et coll. de BALDINGER , tom. I , pag. 28.*

J. LIND , *de febre remittente putridâ paludum quæ grassabantur in Bengaliâ*, A. D. 1762 ; *Edinb.* 1768 ; et coll. d'Edimbourg , tom. III , pag. 116.

J. GILCHRIST , *de febre anomala inter dunfrisienses epidemica* 1767 ; *Edinb.* 1774.

R. JACKSON , *a treatise on the fevers of Jamaica*, etc. ; *London* 1781.

J. M. STORCK , *hæmitritæ a CELSI et GALENI* ; *Vindobonæ* 1782 ; et coll. de WASSERBERG , tom. I , pag. 234.

AASKOW , *descriptio et methodus medendi febris tertianæ duplicis periculosissimæ anno 1779 Hafniæ grassantis* ; *acta reg. soc. med. Hauniens.* ; *Hauniæ* 1783 , pag. 150.

J. ROLLO , *observations on the diseases which appearet in the army on St-Lucia en 1778 et 1779* ; *London* 1781.

Réflexions sur la nature et le traitement des épidémies qui ont régné en différentes provinces de la France pendant le printemps de 1785 ; *Paris* 1785.

F. BALFOUR , *a treatise on putrid intestinal remittent fevers*, etc. ; *Lond.* 1790.

Car. Les accès , seulement séparés par une rémission plus ou moins courte , obscure , sont en

en général accompagnés de symptômes graves.

Rap. A. Amphimérine hémitritée ; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VI, esp. 8.

Amphimérine fausse hémitritée (fièvre continue avec une tierce doublée) ; SAUV., *ib.*, esp. 9.

B. Hémitritée de GALIEN, ayant deux accès de tierce doublée dans un jour, et un accès de quotidienne continue le jour suivant.

Semi-tierce de SPIGEL, *de semi-tertiana libri quatuor* ; FRANCOF. 1624.

Tierce triple ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. X, esp. 15.

C. Tierce subintrante ; les accès double-tierces rentrant les uns dans les autres.

Quotidienne insidieuse ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. IX, esp. 2.

Tierce subcontinue ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. X, esp. 19.

Amphimérine demi-quinte ; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VI, esp. 24.

Tritæophye insidieuse ; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VII, esp. 9.

D. Phricode (avec froid horrifique) ; VOGEL, cl. I, ord. II, sect. I, gen. XXV.

.22 Amphimérine phricode ; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VI, esp. 7.

E. Épiale, avec des sensations simultanées de froid et de chaud.

Amphimérine épiale ; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VI, esp. 3.

F. Syncopale (avec défaillances pendant l'accès ; VOGEL, cl. I, ord. II, gen. XXIX,

Amphimérine syncopale ; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VI, esp. 4.

Amphimérine humorale ; SAUV., *ib.*, esp. 6.

Amphimérine cardiaque ; SAUV., *ib.*, esp. 5.

G. Quotidienne soporeuse ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. XIX, esp. 8.

H. Fièvre maligne avec redoublemens soporeux ou fièvre maligne des vieillards ; LEROY, *mém. sur les fièvr. aig.*, pag. 16.

I. Quotidienne épileptique ; SAUV., cl. II, ord. III, gen. IX, esp. 4.

Eclampsie fiévreuse ; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 15.

Fièvre hémiplegique ; LEROY, *mém. sur les fièvr. aig.*, pag. 26.

K. Tierce putride avec abattement, septicité

des excrétiions , saleté de la langue et des dents ,
etc.

Amphimerine paludique ; SAUV., cl. II, ord.
II, gen. VI, esp. 19.

Amphimerine bilieuse ; SAUV., *ib.*, esp. 21.

Fièvre rémittente putride bilieuse ; MAC-
BRIDE, cl. I, ord. I, gen. III, esp. 2, var.
A. — Fièvre rémittente putride paludique ; MAC-
BRIDE, var. C.

Fièvre rémittente et intermittente ; PRIN-
GLE, *observations on the diseases of the army*,
etc. the fifth edition ; London 1765, pag. 183.

Fièvre rémittente des pays humides et chauds ;
LIND, *an essay on diseases incidental to Eu-
ropeans in hos climates*, etc. ; London 1768,
pag. 19, 32, 62, 90, etc. — J. HUNTER,
*observations on the diseases of the army in
Jamaica* ; London 1788. — R. JACKSON, *a
treatise on the fevers of Jamaica*, etc. ; London
1791.

Fièvre rémittente bilieuse putride ; SELLE,
pyretolog., ord. II, gen. II.

Fièvre de Smyrne ; GARDINER, *observations
on the animal economy*, etc. ; London 1785.

Fièvres pestilentiellles de la baie d'Atongil
au Madagascar ; l'abbé ROCHON, voyage à
Madagascar et aux Indes orientales.

L. Peste rémittente ; SAUV. , cl. III , ord. I , gen. I , esp. 2.

S-esp. IV. Fièvre quarte.

Syn. Quarte ; CULLEN , cl. I , pyrexies ; ord. I , fièvres ; sect. I , intermittentes , gen. II.

Bibl. H. SCHULZE , *de mercurialium usu in febre quartanâ curandâ* ; Halæ 1742 ; et coll. de HALLER , tom. V , pag. 101.

J. FELLINGA , *de febre quartanâ* ; Groning. 1784.

L. Q. BENARD , diss. sur la fièvre quarte ; Paris , an X.

Car. Fièvre débutant après-midi avec des accès qui reviennent après soixante et douze heures , ou chaque troisième jour. Le froid est long et la chaleur qui lui succède a des accroissemens lents.

Rap. A. Claquement des dents (*trismus crepitans*) ; SAUV. , cl. IV , ord. I , gen. II. — HAMBERGER , *de frigore morbifico* ; Jenæ 1725.

Var. A. Intermittente.

Syn. Quarte ; SAUVAGES , cl. II , fièvres ;

ord. III, intermittentes; gen. XI. — LINNÉ, cl. II, critiques; ord. II, intermittentes; gen. XVII. — VOGEL, cl. I, fièvres; ord. I, intermittentes; sect. I, simples; gen. III. — SAGAR, cl. XII, fièvres; ord. III, intermittentes; gen. XI. — MACBRIDE, cl. I, universelles; gen. II, fièvre intermittente; esp. 4. — VITET, cl. I, fièvres; ord. IV, intermittentes; gen. III. — PINEL, cl. I, fièvres; ord. III, adénoméningées; gen. VII.

Bibl. C. F. KALTSCHMID, de febre quartana intermittente; Jena 1757.

Car. Fièvre intermittente avec apyrexie parfaite entre les accès.

Rapports typiques.

A. Quarte (ordinaire) avec un accès reparoissant chaque quatrième jour inclusivement, et laissant deux jours d'intervalle.

Quarte légitime; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

Quarte autumnale; VITET, *loc. cit.*, esp.

III.

Quarte gastrique; VITET, *loc. cit.*, esp. 1.

B. Quarte (doublée) avec deux accès le jour paroxistique.

Quarte doublée; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

C. Quarte (triplée) avec trois accès le jour paroxystique.

Quarte triplée ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 16.

D. Double-quarte (avec un accès le premier jour , correspondant avec celui du quatrième ; un accès le second jour , correspondant avec celui du cinquième ; le troisième et le sixième jours étant libres) ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

E. Triple-quarte (avec un accès pendant trois jours de suite ; le premier correspondant au quatrième ; le second , au cinquième ; le troisième , au sixième) ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

Rapports symptomatiques.

F. Quarte hystérique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 10.

G. Quarte délirante ; VITET ; *loc. cit.*, esp. IV.

H. Quarte cataleptique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 7.

I. Quarte comateuse ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 15.

K. Quarte épileptique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

L. Quarte néphralgique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 29.

M. Quarte métastatique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 17.

N. Quarte scorbutique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 14.

O. Quarte arthritique ; SAUV., *loc. cit.* ;
esp. 11.

Goutte fiévreuse ; SAUV., cl. VII, ord. I,
gen. I, esp. 10.

Var. B. *Rémittente.*

Syn. Tetartophye ; SAUV., cl. II, fièvres ;
ord. II, rémittentes ; gen. VII. — LINNÉ, cl.
II, critiques ; ord. III, exacerbantes ; gen.
XXII. — SAGAR, cl. XII, fièvres ; ord. II,
rémittentes ; gen. XIII.

Fièvre quarte continue ; VITET, cl. I, fiè-
vres ; ord. II, exacerbantes ; gen. III.

Bibl. C. H. ROSE, de febre quartana con-
tinua ; Argent. 1758.

Rap. A. Tetartophye simple ; SAUV., *loc.*
cit. ; esp. I.

Amphimerine semi-quarte ; SAUV., cl. II,
ord. II, gen. VI, esp. 23.

B. Tetartophye maligne ; SAUV., *loc. cit.* ;
esp. 6.

Voy. P. G. ARNOLD, de febre biliosa per-
versa methodo tractata ac in febrem quarta-
tanam, tandemque in hydropem ascitem de-
generata ; Gröphiswald 1766.

C. Amphimérine spasmodique ; SAUV., cl. II, ord. II, gen. VI, esp. 16.

Fièvre quarte continue maligne, avec spasme ; VITET, *loc. cit.*, esp. II.

D. Tétartophye carotique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

Fièvre quarte continue soporeuse ; VITET, *loc. cit.*, esp. II.

E. Tétartophye ; A. avec cécité ; B. avec amaurose ; NEW, *diss. inaug. medic. exhibens observationes medico-practicas et chirurgicas* ; Gotting. 1778.

S-esp. V. Fièvre erratique.

Syn. Erratique ; SAUVAGES, cl. II, fièvres ;

ord. III, intermittentes ; gen. XII. — LINNÉ, cl.

II, critiques ; ord. II, intermittentes ; gen.

XIX. — CULLEN, *synops. nosol. meth.*, tom. II,

Venet. 1787, pag. 16. — SAGAR, cl. XII,

fièvres ; ord. III, intermittentes ; gen. XII.

— MACBRIDE, cl. I, universelles ; ord. I,

fièvres ; gen. II, intermittentes ; esp. 4. —

VITET, cl. I, fièvres ; ord. IV, intermittentes ;

gen. IV.

Car. Accès dont les retours égaux ou iné-

gaux reviennent après un intervalle de quatre jours.

Var. A. Quinte.

Caractérisée par des accès qui reviennent chaque cinquième jour ; VOGEL , *loc. cit.* , esp. IV.

Erratique quinte ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. I.

B. Sextaine.

Se reproduisant chaque sixième jour ; VOGEL , *loc. cit.* , esp. V.

C. Septaine.

Les accès revenant après un intervalle de six jours ; VOGEL , *loc. cit.* , esp. VI.

Erratique septaine ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

Hebdomadaire de SCHENCKIUS.

Septimane de MORGAGNI , *epistol. XLIX* , art. 36.

D. Octaine.

Avec des accès dont le retour a lieu chaque huitième jour ; VOGEL , *loc. cit.* , esp. VII.

Erratique octaine ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

E. Nonaine.

Ayant des accès qui reparoissent après huit jours d'intervalle ; VOGEL , *loc. cit.* , esp. VIII.

Erratique nonaine ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

F. *Décimaine.*

Le retour des accès tombant chaque dixième jour ; VOGEL, *loc. cit.*, esp. IX.

Erratique décimaine ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

G. *Vague.*

Les accès revenant sans règle ; VOGEL, *loc. cit.*, esp. X.

Erratique vaguë ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

Formes de fièvre intermittente.

Voyez A. E. BUCHNER, *de morbo periodico generatim* ; Halæ-Magdeb. 1754.

A. NIETZKI, *de motibus febrilibus febrium intermittentium indoli analogis* ; Halæ 1763.

F. C. MEDICUS, etc. *geschichte periodischer krankheiten*, etc. ; Carlsruhe 1764 ; en français par LEFEBVRE de VILLEBRUNE ; Paris 1790.

J. F. HIMMELREICH, *de morbis intermittentibus topicis* ; Utrecht 1789.

Sor. 1. Hémorragie fébrile ; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. 1, esp. 3.

2. Vomissement fiévreux ; SAUV., cl. IX, ord. 11, gen. XIII, esp. 12, var. A.

— STRACK, *loc. cit.*, pag. 137.

3. Chorée intermittente; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XXI, esp. 4.

4. Cochémar tiercenaire; SAUV., cl. V, ord. I, gen. I, esp. 5.

5. Passion hystérique, fièvre intermittente; STRACK, *loc. cit.*; pag. 145.

6. Délire fiévreux; SAUV., cl. VIII, ord. III, esp. XVII, gen. IO.

7. Tétanos fiévreux; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. IO.

8. Carus, fièvre intermittente; STRACK, *loc. cit.*, pag. 110.

9. Eclampsie fiévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 15.

10. Epilepsie fiévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 9.

11. Convulsion, fièvre intermittente; STRACK, *loc. cit.*, pag. 150.

12. Frisson tiercenaire; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVII, esp. 6.

13. Palpitation fiévreuse; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XV, esp. 15.

14. Toux sèche, fièvre intermittente; STRACK, *loc. cit.*, pag. 133.

15. Asthme, fièvre intermittente; STRACK, *loc. cit.*, pag. 134.

16. Orthopnée fiévreuse ; SAUV. , cl. v , ord. 11 , gen. IX , esp. 20.

17. Phthisie pulmonaire , fièvre intermittente ; STRACK , *loc. cit.* , pag. 154. — Phthisie fiévreuse (elle complique plutôt qu'elle n'accompagne essentiellement les fièvres intermittentes) ; SAUV. , cl. x , ord. 1 , gen. 11 , esp. 13.

18. Céphalalgie , fièvre intermittente ; STRACK , *loc. cit.* , pag. 105.

19. Cholérée , fièvre intermittente ; STRACK , *loc. cit.* , pag. 141.

20. Colique , fièvre intermittente ; STRACK , *loc. cit.* , pag. 139.

21. Hémiplégie intermittente ; SAUV. , cl. vi , ord. 111 , gen. XIX , esp. 8.

22. Paraplexie intermittente ; SAUV. , cl. vi , ord. 111 , gen. xx , esp. 6.

23. Diarrhée fiévreuse ; SAUV. , cl. ix , ord. 11 , sect. 2 , gen. XVI , esp. 20.

24. Ophtalmie , fièvre intermittente ; STRACK , *loc. cit.* , pag. 114.

25. Pleurésie , fièvre intermittente ; STRACK , *loc. cit.* , pag. 115.

26. Catarre , fièvre intermittente ; STRACK , *loc. cit.* , pag. 128.

27. Rhumatisme fiévreux ; SAUV. , cl. vii , ord. 1 , gen. III , esp. 9.

28. Jaunisse févreuse; SAUV., cl. x, ord. vi, gen. xxxii, esp. 8.

29. Goutte; fièvre intermittente; STRACK, loc. cit., pag. 143.

30. Gonflement épigastrique, à la suite des fièvres intermittentes supprimées mal-à-propos; BUEKING, *rec. périod. de littér. méd. étrang.*, tom. 1, pag. 223.

Esp. III. Stuporisme (synoqué) par l'action du miasme animal ou humain.

Bibl. A. P. NAHUY, verhandeling over de schadelike hoedanigheid der lugt in de gasthuysen en gevangenissen benevens deszelvs hulpmiddelen, etc.; the Haarlem 1770.

I. L. GERICKE, *diss. sistens miasmatologiam generalem*; Gotting. 1775.

I. F. DELIUS, *vicinia morbifica, etc.*; *Er-lang* 1788; et *advers. argum. phys. med. fascic. sextus. diss. XXVII.*

EHMSEM, *de aere corrupto, ejusque remediis*; Gotting. 1788.

GUYTON-MORVEAU, *traité des moyens de désinfecter l'air*; *Paris*, an ix-1801.

Car. Maladie fébrile continue avec asthénie profonde et contagion.

Rap. A. Fièvre putrido-sanguine.

Syn² Typhus; SAUVAGES, cl. II, fièvres;
ord. II, continues; gen. IV. I — CULLEN, cl.
I, pyrexies; ord. I, fièvres; gen. V. — SAGAR,
cl. XII, fièvres; ord. I, continues; gen. IV.
Fièvre continue putride; MACBRIDE, cl. I,
universelles; ord. I, fièvres; esp. 4.

Fièvre continue maligne; VITET, cl. I,
fièvres; ord. I, continues, simples; gen. IV.

Fièvres adynamiques; PINEL, cl. I, fièvres;
ord. V.

Fièvre continue putride; SELLE, *pyretol.*,
ord. I, gen. II.

Fièvre putride; QUARIN, *method. medend.*
febrium, cap. IV.

Fièvre putride sanguine; BAUMES, *ann. mé-*
dicin., I.^{re} part.

Fièvre putride primitive; HERZIG, cl. I,
ord. I, sect. I, sous-sect. II, gen. I.

Bibl. VAN DER MYE, *de morbis et symp-*
tomatibus popularibus brédanis, etc.; Antwerp.
1627, 1629; édit. de GRÜNER; Jena 1792.

G. LAURIE; *de malignitate et de peste*;
Edinb. 1744.

I. G. BRENDÉL, *de cognatione paraphre-*

nitidis et febrium malignarum; Gotting. 1752.

DE MEZEREY, méthode aisée et peu coûteuse de traiter avec succès plusieurs maladies épidémiques, etc.; nouv. édit.; Paris 1753.

A. NIETZKY, de febribus complicatis in genere; Halæ 1753.

A. E. BUCHNER, de gradibus malignitatis in morbis malignis; Halæ-Magdeb. 1755.

J. JUNCKER, de motuum antipræxia in febribus malignis materia maligna sæpius maligniore; Halæ-Magdeb. 1755.

S. T. QUEMALT, de exhalationum putridarum ex cadaveribus bello trucidatorum suppressione; Lipsiæ 1757.

G. R. BOEHMER, de crâcidismo et captoplogiâ; signa in morbis acutis plerumque lethali; Wittebergæ 1757.

L. A. VERBEK, de synochâ putridâ epidemica hujus et elapsi anni vermibus stipata; Pragæ 1758.

Traité des fièvres malignes et pourprées; Montpel. 1763.

PH. A. BOEHMER, de transitu febrium benignarum in malignas, præsertim in fristâ orientali; Halæ 1764.

I. M. KRAHMER, diss. sistens meditationes circa febrem malignam, topicam biliosam vel

cholericam putrem recentiorum, ejusque medelam; Argentor. 1765.

J. H. RIEPENHAUSEN, *morbi epidemii statim ab initio proximi belli usque ad ejus finem scilicet ab anno 1757, usque ad 1762 Goettingæ et circa eam grassati*; Halæ 1765.

A. BAECK, *tål om farsoter, som mase haria ibland rikets allmoge*; Stockolm 1765.

C. H. CARGER, *diss. curationem febrium continuarum putridarum spectans*; Gryphiswald 1766.

F. PENROSE, *a dissertation on the inflammatory, gangrenous and putrid sore throat also on the putrid fever, etc.*; Oxford 1766.

O. NERUCCI, *historia febris epidemicæ senensis 1766 et 1767, etc.*; Senis 1767.

I. E. H. SCHROEDER, *de putridis febribus*; Harderovici 1767.

E. A. NICOLAI, *de notione morbi maligni*; Jena 1767.

G. F. SIGWART, *febris malignæ pathologia*; Tubing. 1768.

P. SCHROEDER, *diss. sistens febrium putridarum differentias*; Gotting. 1768; et *opusc. medic.*, tom. 11, pag. 147.

E. A. NICOLAI, *de putredine*; Jena 1769.

LUDWIG, *morbi epidemici sub finem anni*

1757 et initium 1758 Lipsiæ grassantis, etc.,
advers. med. pract.; Lipsiæ 1770, vol. I,
 pars I, art. I, pag. 21.

— *Meletemata de putredine animali et mor-
 bis putrid.*, ib., pag. 189, 382.

I. F. GRIMM, *historia febris malignæ, quæ
 in urbe et agro isenacensi annis 1769, 1770
 et 1771 epidemiæ grassata fuit; nova acta
 natur. curios.*, tom. III, in *append.*, art. 4,
 pag. 145.

I. G. HOPMANN, *de febre continuâ putridâ;
 Argent.* 1771.

X. FAUKEN, *das in wien im jähre 1771
 und 1772, sehr viele menschen anfallende fau-
 lungsfieber? Wien* 1772.

PH. A. BOEHMER, *de notione malignitatis
 morbis adscriptæ; Halæ* 1772.

F. MIGLIORI, *trattato delle febre maligne
 e delle perniciose, etc.; Perugia* 1772.

E. A. NICOLAI, *de febribus malignis; Jena*
 1772.

I. CH. POHL, *de febribus continuis putri-
 dis; Lipsiæ* 1772.

W. FORDYCE, *a new inquiry into the
 causes, symptoms and cure of putrid and
 inflammatory fevers, etc.; Lond.* 1773.

M. C. STAHLMANN, *diss. sistens examen remedium in febribus putridis adhiberi solitorum*; Gotting. 1773.

J. SIMS, *observations on epidemic disorders with remarks on nervous and malignant fevers*; Lond. 1773, en français 1779.

A. F. SETTAGAST, *apitome historię febrium putridarum anno 1754 nascentium in 1773 perseverantium, genesis*, etc.; Bonnæ 1774.

T. KIRBY, *de febre putridâ libellus*, etc.; Lugd-Batav. 1774.

FRIDSCH, *de febre putridâ in diocœsi Ripensi epidemice grassante ab anno 1770 ad 1774*; soc. med. haun. collect.; Hauniæ 1775, vol. II, pag. 213.

MARET, *mémoire pour servir au traitement d'une fièvre épidémique*, etc.; Dijon. 1775.

J. PANZANI, *raggiamento critico sull'uso interne degli agli nelle febre grave sull'ordinario trattamento delle putride e biliose affezioni*, etc.; Venezia 1775.

W. J. N. LANGSVERT, *historia medica morbi epidemici sive febris putridæ ann. 1771 et 1772*; Pragæ 1775.

D. I. WEIBAUCH, *de limitandis laudibus*

vomitoriorum ad curandas febres malignas ; Gryphisw 1775.

OVERCAMP , *de febribus putridis ; Halæ 1775.*

FOURNIER , *observat. sur les fièvres putrides et malignes , etc. ; Dijon 1775.*

C. A. EICHELBERG , *de causis phænomenorum quæ observantur in progressionem morborum epidemicorum , lente progredientium , præsertim pestilentiae hominum , etc. ; Nymagen 1776.*

A. NIETZKY , *diss. casum notabilem febris malignæ continens ; Halæ 1776.*

J. ROGERS , *de curatione febrium a contagione ; Edinb. 1778.*

BANG , *tractatus de febre putridâ ; acta haviensia , vol. II , pag. 156.*

G. JEARNE , *de typho ; Edinb. 1778.*

C. DE MERTENS , *observ. med. de febribus putridis , de peste , etc. ; Vindob. 1778.*

H. OSTOICH , *de duabus constitutionibus epidemicis dalmaticis ; Vindob. 1778.*

J. B. (JEAN BANAU) *observations sur les moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes , et à préserver de leur contagion ; Amsterdam 1778 , Paris 1785.*

P. J. VASTAPANI, *de china china in synochis putridis*; Taurini 1779.

J. CLARK, *de putredine in typho coercendâ*; Edinb. 1779.

CH. L. MURSINNA, *beobachtungen uber die ruhr, nebst einem anhang von den faulfiebern*; Berlin 1780.

J. CLARKE, *observations on fever, etc.*; Lond. 1780.

W. E. RUDOLPH, *de sanguinis missione in febribus putridis*; Gotting. 1780.

F. MILMAN, *an inquiry in tho the source from whence the symptoms of the scurvy and of putrid fevers arise, etc.*; Lond. 1782, en français, par M. VIGAROUS; Paris 1786.

J. U. BILGUER, *versuche und erfahrungen uber die faulfieber und ruhren, dem haufigen sterben bey den armeen, etc.*; Berlin 1782.

J. A. UNZER, *einleitung zur allgemeinen pathologie der ansteckenden krankheiten*; Leipzig 1782.

HEYNE, *de febribus epidemicis Romæ falso in pestium censum relatis*; Gotting. 1783.

F. VACCA BERLINGHIERI, *considerazioni intorno alle malattie dette volgarmente putride, etc.*; Lucques 1783.

H. OWEN, *de contagione*; Edinburg. 1783;

et *dissertat. medic. Edinburg.*, ann. 1783;
n.º 6.

TH. WALLER, *de typho*; *Edinb.* 1783;
et *dissertat. medic. Edinburg.*, ann. 1783,
n.º 10.

FERRIS, *de sanguinis per corpus vivum cir-
culantis putredine*; *Edinburg.* 1784; et *coll.*
d'Edimbourg, tom. IV, pag. 480.

D. CAMPBELL, *med. observ. on the thy-
phus, or low contagious fever and on the
means of preventing the production and com-
munication of this disease*; *Lancaster* 1785.

TH. W. SCHROEDER, *historia febris bilioso-
pituitoso-putridæ quæ mense decembri 1783,
etc. epidemicè grassata est*; *Gotting.* 1785.

A. TH. GEMEINER, *de verâ februm putri-
darum notione*; *Erlang.* 1786.

J. J. VERNISCHEK, *frage woher emstehen
die vielen faulieber, etc.*; *Vienne* 1786.

G. H. C. MEHLIS, *de excitantium usu in
febris potissimum putridis*; *Gotting.* 1787.

E. G. F. BALDINGER, *malignitas in morbis
ex mente HIPPOCRATIS, per recentiorum ir-
ritabilitatem et sensibilitatem illustratâ*; *opusc.
med. Gotting.* 1787, art. 5, pag. 114.

K. A. ZWIERLING, *histoire d'une fièvre pu-
tride qui a régné, en 1784 et 1785, à Ham-*

melbourg dans le pays de Fulde ; *vermischte medicinische schriften* , etc. ; Heidelb. et Leips. 1788 , art. II. ; *WALLER* , H. I.

VAN BAGEVEM , *verhandeling over de rot-koorts en roodeloop* , etc. (traité sur les fièvres putrides et la dyssentérie) ; Dendermonde et Amsterdam 1790. ; *WALLER* , H. I.

G. FORDYCE , *a letter to sir JOHN SINCLAIR, concerning the virtues of the muriatic acid* , etc. ; Lond. 1790. ; *WALLER* , H. I.

GATTENHOF , *de febre epidemica putrida* (de nature un peu bilieuse) ; coll. dissert. et program. Heibelberg , vol. I ; *Heidelberga* 1791 , pag. 104. ; *WALLER* , H. I.

F. SAALMAN , *descriptio februm malignarum in genere* , etc. ; Munster et Strasbourg 1791. ; *WALLER* , H. I.

A. OLMI , *de febribus synoco-putrido-biliosis quæ more epidemico in nosocomio florentino , annis 1791-92 grassatae sunt , tractatus* ; Florence 1792. ; *WALLER* , H. I.

A. B. DESAINS , *dissert. sur les fièvres ataxique , sporadique et adynamique continue ; (maligne et putride)* , etc. ; Paris , an IX-1801. ; *WALLER* , H. I.

Car. Pouls mou et fréquent ; chaleur en apparence moyenne , mais affectant la main

d'une sorte de picotement ; urine trouble ;
fétidité de l'haleine et des excrétiions , et lésion
progressive des fonctions mentales.

Rap. A. Hémorragie insalubre ; SAUV., cl.
IX, ord. I, gen. I, esp. 5.

B. Tremblement typhodé ; SAUV., cl. IV,
ord. III, gen. XIV, esp. 19.

C. Tremblement tendineux, soubresauts des
tendons ; SAUV., *ibid*, esp. 10.

D. Trisme fébrile ; SAUV., cl. IV, ord. I,
gen. II, esp. 10.

E. Carus fébrile ; SAUV., cl. VI, ord. V,
gen. XXX, esp. 2.

Sespe. I. Fièvre putride.

Syn. Typhus modéré ; CULLEN, *loc. cit.*,
esp. I, var. I.

Peste de Siam ; SAUV., cl. III, ord. I,
gen. I, esp. 8.

Rap. A. Fièvre maligne hectique ; WILLIS,
de morb. conv., cap. 8.

B. Fièvre pestilentielle ; FRACASTOR, *de
morbis contag.*, lib. II, cap. 4.

C. Fièvre pestilentielle sans venin ; FORE-
STUS (PIERRE VAN FOREEST), *lib. VI* ; *ob-
servat.* 26.

D. Fièvre hecticque pestilentielle (a) ; FOERSTUS, *lib. VI, obs. 32.*

E. Nouvelle fièvre de 1085 ; SYDENHAM, *schedula monitoria*, etc.

F. Fièvre putride nerveuse des années 1720-21 ; WINTRINGHAM ; *comment. nosolog.*

G. Fièvre lente nerveuse ; HUXHAM, *on fevers* chap. 8. — *Edinb. medic. essays*, vol. II, art. 18 ; vol. IV, art. 23 ; vol. V, art. 48.

H. Fièvre contagieuse ; LIND, *on fevers and infection.*

I. Typhus nerveux ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

K. Typhus comateux ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

L. Trytæophye typhode ; SAUV., *loc. cit.*, esp.

M. Fièvre putride épidémique en 1770 et 1774 ; FRIDSCH, *soc. med. Haun. coll.*, vol. II ; *Haun. 1775*, art. 25, pag. 213.

S-esp. II. Fièvre maligne.

Syn. Typhus grave ; CULLEN, *loc. cit.*, esp. I, var. II.

(4) BURSERI ne la regarde que comme une fièvre gastrique maligne, tom. I, pag. 381.

Rap. A. Fièvre pestilentielle ; Pierre SALIUS DIVERSUS , de febre pestilent.

B. Fièvre pestilentielle des Égyptiens ; PROSPER ALPIN , de medic. Ægyptior. , lib. 1 , cap. 14.

Typhus ægyptiacus ; SAUV. , loc. cit. , esp. 6.

Cephalitis épidémique de 1516 ; SAUV. , cl. III , ord. III , gen. XIX , esp. 6.

C. Fièvre pestilentielle maligne ; SENNERT , de febris , lib. IV , cap. 10.

Fièvre maligne pestilentielle ; RIVIERE , lib. XVII , sect. III , cap. 1.

Fièvre pestilentielle maligne de 1643 ; WIL- LIS , de febris , cap. 14.

D. Fièvre du Sénégal ; London medical ob- servat. , obs. 11 , 21.

E. Fièvre putride bilieuse de 1769 ; DE MERTENS , loc. cit. , cap. 11.

F. Fièvre putride nerveuse de 1770 ; DE MERTENS , ib. , cap. 11.

G. Fièvre putride épidémique de Riga ; FRIDSCH , soc. med. Haun. collectan. , tom. II , pag. 213.

H. Fièvre putride de 1779 et 1780 ; CAL- LISEN , acta reg. soc. med. Haun. , vol. I , pag. 353.

I. Synoque très-putride de Bielitz en Silésie; N. RIGLER, *constitutio epidemica annorum* 1775 à 1779; Breslaw 1780.

Fièvre synoque atrabiliense du Sénégal, en 1778; T. P. SCHOTTE, *a treatise on the synochus atrabiliosa*, etc; Lond. 1782; en français; Paris 1785.

Fièvres épidémiques de Novi, en 1783; B. CAPURRI, *historia delle feбри epidemiche che carsero nella cita di novi l'anno* 1783; Milan 1786.

Epidémie de Grenoble en l'an VIII; TROUSSET, *histoire de la fièvre qui a régné épidémiquement à Grenoble*, etc.; Grenoble, an VIII.

Fièvre putride maligne du département des Basses-Alpes; M. BOUTEILLE, *mémoire sur l'épidémie régnante dans le département des Basses-Alpes*; Marseille.

Var. A. Fièvre d'hôpital.

Voy. E. FOSTER, *de nosocomiis*; Edinb. 1767.

W. GRANT, *essay on the pestilential fever of sydenham, commonly called the gool, hospital, ship, and camp fever*; London 1775.

Fièvre putride contagieuse de 1742; HUXHAM, *de aere et morbis epidemicis*; édit. de REICHEL, tom. I, pag. 268.

Fièvre des prisons et des hôpitaux; PRINGLE, *observat. on the diseases of the army*, etc.; Lond. 1763; pag. 287. — ROBERT ROBERTSON, *observations on the jail, hospital, or ship fever*, etc.; Lond. 1783.

Fièvre d'hôpital de la campagne de 1792; CHAMSERU, *journ. de méd. chir. et pharm.*, par M. BACHER, tom. I, pag. 173.

Opinion de l'école de médecine de Montpellier, sur la nature.... de la fièvre observée dans les hôpitaux de cette commune, en l'an VIII.

Fièvre nosocomiale; CERA, *de feбри nosocomica*; Mediol. 1789.

Miliaire pourprée; SAUV., cl. III, ord. I, gen. V, var. H.

Var. B. Fièvre de prison.

Voy. PRINGLE, *observations on the nature and cure of hospital and jail fevers*, 1750; et *observat. on the diseases of the army*, 1752-1755.

I. HEISHAM, *an account of the jail fever*,

or typhus carcerum : as it appeared at Carlisle in the year 1781 ; London 1782.

RUETTE , observations cliniques sur une maladie épidémique qui a régné cette année à l'hospice du nord ; Paris an ix.

Fièvre continue affectant le cerveau , les nerfs et les humeurs avec douleur obtuse de la tête , tremblement des mains dès le commencement et nausées.

Typhus des prisons ; SAUV. , cl. II , ord. I , gen. IV , esp. I. I. P. 1. I. P. 1. I. P. 1.

Var. C. Fièvre de vaisseau.

Voy. La fièvre des vaisseaux pestilentielle en 1740 ; HUXHAM , *oper. physic. med.* , édit. de REICHEL , Lipsiæ 1773 , tom. I , pag. 240.

Relatio epidemiæ bilioso-nervoso-putridæ in classe regiâ ac nosocomio nautico grassantis , etc. ; CALLISEN , *act. reg. societ. med. Haun.* , vol. I , Hauniæ 1783 , pag. 407.

Maladie épidémique qui a régné dans les vaisseaux , parmi les troupes de France à leur débarquement à Algesire ; THION DE LA CHAUME , *journ. de medec.* , avril 1790 , tom. LXXXIII , pag. 34.

G. RENWICK ; *an inquiry in to the nature and causes of sickness in ships of war*, etc. ; Lond. 1792.

Miliaire nautique ; SAUV. , cl. III , ord. 1 , gen. V , var. G.

Var. D. Fièvre des camps.

Voy. H. MAI , *de febre castrensi quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant* ; Rinth. 1691 ; et coll. de HALLER , tom. V , pag. 341.

M. ALBERTI , *de morbo hungaricæ hâgimas* , etc. ; Halæ 1726 ; et coll. de HALLER , tom. V , pag. 361.

JUNCKER , *de febre hungarica seu castrensi* , consp. med. ; Halæ 1734 , tab. LXXIV , pag. 604.

J. CSAPO *de febre hungaricâ* ; Basil. 1759.

Typhus des camps ; SAUV. , cl. II , ord. 1 , gen. IV , esp. 5.

Conf. J. CH. J. WOLF. , *entwurf zur vermindering der lagerfieber* , etc. ; Francf.-sur-le-Mein 1791.

Nota bene. Ces variétés constituent des maladies tellement identiques , que BURSERI , *inst. medic.* , tom. 1 , pag. 380 , n'a pas hésité de

dire que le *typhus nervosus*, SAUV., esp. 2 ; le *typhus carcerum* ; SAUV., esp. 2 ; la *miliaris nautica*, SAUV., esp. 9, la *miliaris purpurata*, SAUV., esp. 4 ; le *typhus castrensis*, SAUV., esp. 5 ; et le *typhus ægyptiacus*, SAUV., esp. 6, sont plutôt des synonymes que des variétés.

S-esp. III. Fièvre pétéchiiale (a).

Bibl. G. PATON, de *typho graviore petechiali* ; Edinb. 1782.

Car. Aux symptômes propres à l'espèce se joignent, à la fin de la première période ou au commencement de la seconde, des taches de pourpre ou de miliaire.

Pourpre malin ; SAUV., cl. III, ord. I, gen. VI, esp. 2.

Fièvre putride pétéchiiale, par la puanteur des poissons salés et putréfiés ; AASKOW, *soc. med. haun. collect.*, vol. II ; Haun. 1775, art 8, pag. 82.

(a) MONRO (*diseases of military hospitals*, pag. 1.) et BURSERI (*loc. cit.*) ont avancé que la fièvre pétéchiiale est la même que la nosocomiale ; s'il y a de la différence, elle n'existe que dans le degré ou par les circonstances.

Rap. A. Fièvre lenticulaire , punctulaire ou péticulaire ; FRACASTOR, *de morb. contag.*, lib. II, cap. 6.

B. Fièvre péticulaire de Trente en 1591 ; ROBRET, *de febre peticul.*

C. Fièvre pétéchiiale épidémique de Cologne de 1672 ; DONCKERS, *idea febris petechialis.*

D. Fièvre pétéchiiale épidémique de Presbourg en 1683 ; C. F. LOEU, *act. natur. curios.*, vol. II, in append.

E. Fièvre pétéchiiale épidémique de Modène en 1692 ; RAMAZZINI, *constitut. mutin. oper.*, pag. 187.

F. Fièvre maligne pétéchizante de 1698 ; HOFFMAN *oper.*, tom. II, pag. 80.

G. Fièvre pétéchiiale de Breslaw en 1699 ; HELWICH *ephem. german.*, dec. III, ann. VII et VIII, obs. 132, pag. 616.

H. Fièvre épidémique de Leipsick en 1718 ; M. ADOLPH, *act. natur. curios.*, vol. III, obs. 131, pag. 296.

I. Fièvre endémique et épidémique de Corck en 1708, 1718 et suiv. ; ROGERS, *essay on epidemic diseases.*

K. Fièvre continue épidémique de Corck en 1719 ; M. O. CONNEL, *observ. de morbis.*

L. Fièvre pétéchiiale épidémique de Cre-

mone en 1734 ; VALCHARENGI , *medic. rat.* ;
sect. III.

M. Fièvre pétéchizante de *Petersbourg* en
1735 ; WEITBRECHT , *de febrili constitutione*
petechizante petropoli ann. 1735 grassante ;
Regiom. 1736 ; et coll. de HALLER , tom. v ,
pag. 395.

N. Fièvre pétéchiale de 1740 , 1741 , dans
la *Hesse* ; RITTER , *act. natur. curios.* , vol.
VII , obs. 4.

O. Fièvre pétéchiale épidémique de quel-
ques endroits d'Angleterre ; WALL's , *works*
pag. 337.

P. Fièvre maligne pétéchiale de *Rintel* en
1741 ; FURSTENAU , *act. natur. curios.* , vol.
VII , obs. 5.

Q. Fièvre maligne du camp français en
Bohème ; I. A. I. SCRINC , *de febris malignæ*
castrensi gallorum , etc. ; Pragæ 1743 ; et
coll. de HALLER , tom. v , pag. 385.

R. Fièvre de camp pétéchiale épidémique ;
BRANDHORST , *historia febris castrensis pete-*
chialis epidemica ; Leidæ 1746 ; et coll. de
HALLER , tom. v , pag. 421.

S. Epidémie maligne de *Breslaw* ; HAHN ,
journ. de méd. , déc. 1757. — Tritæophye de
Breslaw ; SAUV. , cl. II , ord. II , gen. VII , esp. 3.

Fièvre

Fièvre putride maligne de la Chatellenie de Lille en Flandre, en 1758 ; BOUCHER, *journ. de medeci*, tom. X, pag. 442 et 523.

AI. Fièvre pétéchiiale épidémique de Vienne, en 1757 ; HASENOEHRL, *hist. med. morbi epidemici sive febris petechialis*, etc. ; Vind. 1760.

U. Fièvre pétéchiiale épidémique en Allemagne, pendant les années 1760 et suivantes ; STRACK, *obs. medicin. de morbo cum petechiis*, etc. ; Carolsruhæ 1766.

V. Fièvres malignes pétéchiiales épidémiques de Stockolm ; P. J. BERGIUS, *kongl. vetenskaps akademiens handlingar*, etc. ; vol. XXVIII, Stock. 1767, trim. 4, art. 10, pag. 326.

X. Fièvre maligne pétéchiiale de la Bourgogne, en 1761 et 1762 ; MARET, *mém. de l'acad. de Dijon* ; vol. I, Dijon 1769, pag. 125.

Y. Fièvre pétéchiiale épidémique de Leypsick, en 1757 ; LUDWIG, *advers. medic. pract.* ; Lips. 1770, tom. I, pag. 21.

Z. Fièvre pétéchiiale nerveuse de Dijon, en 1760-61 ; MARET, *mém. pour servir au traitement d'une fièvre épidémique* ; Dijon 1775.

AA. Fièvre maligne épidémique à Coutances, en 1772-73 ; BONPÉ, *hist. et mém. de*
Tom. II.

la soc. roy. de médéc.; ann. 1776; Paris 1779,
pag. 23 des mém.

Fièvre putride maligne pétéchiale épidémi-
que et contagieuse, etc.; ROBIN de KERIA-
VALLE, *hist. et mém. de la soc. roy. de méd.*,
ann. 1778-79; Paris 1780, pag. 53 des mém.

Epidémie du cercle d'Iglaw, en 1771-72;
J. B. M. SAGAR, *historia morbi epidemici*,
etc.; Leips. 1780.

BB. Epidémie des troupes françaises après
le siège de Gibraltar; BUREL le jeune, *journ.*
de médecine milit., tom. VII; Paris 1788,
pag. 32.

Fièvre nerveuse pétéchiale de Schelestat,
en 1790-91; COZE, *journ. de médéc.*, mai
1792, tom. XCI, pag. 3.

Epidémie de Jena, en 1791; PH. I. HART-
LAUB, *dissert. med. sistens descriptionem cons-
titutionis epidemicæ sub fine præteriti anni
Jenæ grassatæ*, etc.; Jena 1792.

Rose épidémique; HARMAND-MONTGARNY,
précis médical et curatif de la rose épidémi-
que qui règne dans le département de la Meuse;
juin 1793.

S-esp. IV. Fièvre jaune.

Car. A la fin de la première période ou

au commencement de la seconde, les symptômes de l'espèce se compliquent de jaunisse.

Rap. A. Typhus ictéreux; SAUV., *loc. cit.* esp. 7.

B. Fièvre jaune des Indes occidentales; WAREN, *malignant fever of barbadoes*. — J. MOULTRIE, *de febre malignâ biliosâ Americæ flavâ*; Edinb. 1749; et coll. de BALDINGER, tom. 1, pag. 163. — J. WILSON, *de febre biliosâ Indiæ occidentalis*, etc.; Edinb. 1750. — HILLARY, *observations on the changes of the air and the concomitant epidemical diseases in the island of barbados*; Lond. 1759, pag. 143. — LINNING, *essays and observations, physical and litterari*, etc.; vol. 11, art. 29, pag. 370. — J. MAKITTICH, *de febre Indiæ occidentalis malignâ flavâ*; Edinb. 1766. — TH. M. FARQUHAR, *de typhi flavi symptomaticis et causis*; Edinb. 1777. — S. CURTIN, *de febre flavâ Indiæ occidentalis*; Edinb. 1778. — MOSELEY, *a treatise on tropical diseases*, etc.; Lond. 1788.

C. Fièvre jaune d'Espagne; HALLÉ, *journ. de médec. de CORVISARD*, etc., tom. 1; pag. 292, 305; et *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*, tom. IX, pag. 266. — R. G. Sou-

GRAMPE, *rec. périod. de la soc. de médec. de Paris*, tom. x, pag. 264.

S-esp. V. Fièvre suette.

Car. Une sueur générale domine parmi les symptômes de l'espèce.

Rap. A. Ephémère suette; SAUV., cl. II, ord. I, gen. I, esp. 7.

B. Ephémère britannique; CAIUS, *de ephemerâ britannicâ, liber unus*; Lonyan 1756.

Sueur anglaise; SENNERT, *lib. IV, cap. 15.*

Hydronose; FORESTUS, *lib. VI, obs. 8.*

S-esp. VI. Fièvre dyssentérique.

Bibl. C. DOUGLASS, *de dyssenteriâ putridâ*; Edinb. 1766.

B. CLIFTON, *de dyssenteriâ epidemicâ*; Edinb. 1766.

H. F. GRIMM, *historia dyssentericæ malignæ annorum 1770-71*; etc.; *novâ acta natur. curios.*, tom. III; Norimb. 1767; in *append. art. 5*, pag. 172.

A. WARDROP, *de dyssenteriâ contagiosâ*; Edinb. 1775; et coll. de WEBSTER, t. I, p. 476.

J. MILLAR, obs. sur les maladies qui règnent

en Angleterre ; *Lond.* 1783 , chap. viii , de la dysenterie.

Car. Des déjections tormineuses , sanguinolentes et putrides constituent le symptôme général de cette sous-espèce.

Rap. A. Dysenterie des camps ; SAUV. , cl. ix , ord. ii , gen. x , esp. 7.

Dysenterie de la campagne de 1792 ; CHAMSERU , *journ. de méd. chir. et pharm.* , par BACHER , tom. i , pag. 27.

Dysenterie atrabilaire ; SAUV. , *ib.* , esp. 5.

B. Dysenterie bilioso-contagieuse de Nîmegue , en 1736 ; I. H. DEGNER , *historia medic. de dysenteriâ bilioso-contagiosâ* , etc. *Traject. ad Rhen.* 1738 , 1754.

C. Fièvre dyssentérique ; L. GRUBER , *de febre acutâ epidemicâ exanthematico-dyssentericâ* ; *Basil.* 1747 ; et coll. de HALLER , tom. iii , pag. 385.

D. Dysenterie épidémique ; A. VATER , *de dysenteriâ epidemicâ , maxime contagiosâ et malignâ* ; *Witteb.* 1747 ; et coll. de HALLER , tom. iii , pag. 399.

E. Dysenterie des Indes ; A. E. BUCHNER , *de singulari quâdam Indorum orientalium dysenteriâ* , etc. ; *Halæ* 1752 ; et coll. de HALLER , tom. iii , pag. 421.

F. Dyssenterie automnale de *Newcastle* ; A. WILSON , *an essay on the autumnal dysentery* ; Lond. 1761.

Fièvre dyssenterique putride maligne ; I. G. ZIMMERMAN , *von der ruhr unter dem volke im Jahre 1765* , etc. ; Zurch 1767 , pag. 10 , 354 , 359 , 369.

G. Dyssenterie épidémique de *Tyrnaw* ; P. I. RODTSPERGERGER , *de dysenteriâ Tyrnaviensi , anno 1775 epidemicâ* ; Tyrnaw 1775.

H. Dyssenterie de la province du Maine , en 1779 ; VETILLARD , *histoire médicale des maladies dyssenteriques* , etc. ; Au Mans 1779.

I. Epidémie dyssenterique de 1779 ; CAILLE , *hist. et mém. de la soc. roy. de médéc. de Paris* , ann. 1779 , pag. 32 des mém. — *Journ. de médéc. milit.* , tom. IV ; Paris 1785 , pag. 423.

K. Dyssenterie automnale du pays de Zell ; TAUBE , dans *neves magazin fur aerzte* , etc. , par E. G. BALDINGER , vol. II , Leips. 1780 , pag. I.

L. Maladie dyssenterique de *Noyers* , en 1779 ; MARET , *journ. de méd.* , février 1780 , tom. III , pag. 153.

M. Epidémie dyssentérique de 1779 ; DU-RAND , *hist. et mém. de la soc. roy. de méd.* Paris , ann. 1780--81 , pag. 84 des mém. —
ROUSSEL , *recherches sur la petite vérole.....*
et sur la dyssentérie de 1779 , etc. ; Caen
 1781.

N. Epidémie dyssentérique ; F. GEACH , *some*
observations on the present epidemic dyssen-
tery ; Lond. 1781.

O. Dyssentérie des Indes ; B. MOSELEY ,
observations on the dysentery of the west
Indies , etc. ; Lond. 1781.

P. Dyssentérie de Manheim , en 1778--79-
 80 ; F. H. BIRNSTIEL , *de dyssenteriâ liber* ,
etc. ; Manheim 1786.

S-esp. VII. Fièvre colliquative.

Car. Il y a une fonte générale d'humeurs
 qui s'échappent par les selles , avec amaigris-
 sement rapide , et prostration absolue des
 forces.

Rap. A. Fièvre colliquative de Quesnay ;
traité des fièvres , tom. 11 , pag. 371.

Fièvre colliquative primitive ou essentielle ;

BURSERI, *institut. med. pract.*, vol. 1; *Mediolani* 1785; pag. 436.

S-esp. VIII. Peste.

Syn. Peste; JÜNCKER, *tab.* LXXVIII. — SAUVAGES, cl. III, phlegmasies; ord. I, exanthématiques; gen. I. — LINNÉ, cl. I, exanthématiques; ord. I, contagieuses; gen. II. — CULLEN, cl. I, pyrexies; ord. I, fièvres; ord. III, exanthèmes; gen. XXX. — SAGAR, cl. X, exanthèmes; ord. I, contagieux; gen. I. — MACBRIDE, cl. I, universelles; ord. I, fièvres; gen. IV, fièvre exanthématique; esp. 8. — VITET, cl. I, fièvres; ord. III, exanthématiques; gen. V.

Fièvre pestilentielle; VOGEL, cl. I, fièvres; ord. II, continues; sect. I, simples; gen. XXXIII. — PINEL, cl. I, fièvres; ord. VI, adéno-méningées; gen. XV.

Bibl. ASTRUC, dissertation sur la contagion de la peste; Toulouse 1725.

CHICHOYNEAU, traité des causes, des accidens et de la cure de la peste; Paris 1744.

ST. WESPREM, *de inoculanda peste*; Pannon, 1755.

A. CHENOT, *tractatus de peste*; Vindob., 1766.

DE HAEN, *de peste*, etc. ; *rat. medend.*, pars XIV ; *Viennæ* 1770, pag. 211.

W. BROWNRIGG, *considerations on the means of preventing the communications of pestilential contagion*, etc. ; *Lond.* 1771.

B. THOMAS, *de peste* ; *Edinb.* 1775 ; et coll. de WEBSTER, tom. I ; *Edimb.* 1781, pag. 436.

PARIS, *mémoire sur la peste* ; *Avignon*, *Marseille*, *Paris* 1778.

C. DE MERTENS, *observ. med. de febris putridis, de peste*, etc. ; *Vindobon.* 1778.

SAMOLOWITZ, 1.^o lettre sur les expériences des frictions glaciales pour la guérison de la peste ; *Paris* 1781, *Strasb.* 1783. 2.^o Mém. sur l'inoculation de la peste ; *Strasb.* 1782. 3.^o Lettre à l'académie de Dijon au sujet de l'inoculation de la peste ; *Paris* 1783.

P. J. FERRO, *næhere, untersuchung der pestans teckung*, etc. (considérations ultérieures sur la contagion de la peste) ; *Vienne* 1787.

P. VON VONSEL, *mémoire sur la peste* ; *St-Petersb.* 1788.

G. CH. REIL, *de la fièvre en général, de la rage, de la fièvre jaune et de la peste*,

etc. ; Metz , an. IX--1800. — Mémoire sur la peste , etc. , Metz , an--IX--1801.

Car. Avec les symptômes de l'espèce , portés au plus haut degré de foiblesse et de stupeur , il y a des bubons , des charbons et des anthrax.

Rap. A. Peste benigne ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

B. Peste vulgaire ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

C. Peste interne ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

D. Peste d'Égypte ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 11.

E. Peste de Siam ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 8.

F. Peste de Venise et de Padoue ; MERCURIALI , de *pestilentia in universum , præsertim vero de Venetâ et Patavinâ ; Venetiis 1577-1580 ; Leidæ 1623.* — CAPIVACCIO , *oper. medic.*

G. Peste de Milan ; L. SETTALA (*Septalius*) de *peste et pestiferis affectibus ; Mediolani 1622.*

H. Peste de Nîmegue ; I. de DIEMERBROECK , de *peste arenaci 1644 ; Amstelod. 1665.*

I. Peste de Marseille , en 1721 ; CHYCOINEAU , *observat. et refl. touchant la nature... de la peste de Marseille ; Lyon et Paris 1721.* — ASTRUC , *dissert. sur la peste de Provence ; Montpell. 1722.*

K. Peste du duché d'Holsace ; W. U. WALDSCHMIDT , de *singularibus quibusdam pestis Holsaticæ* ; Kilia 1721 ; et colle de HALLER , tom. V , pag. 547.

L. Peste de Bologne ; L. A. MURATORI , del governo della peste ; Brescia 1721.

M. Peste de l'Ukraine , en 1738-39 ; I. F. SCREIBERG , *observationes et cogitata de pestilentia quæ ann. 1738-39 in Ukrania grassata est* ; edit. nov. petrop. 1750.

N. Peste de Constantinople ; 1.^o M. MACKENSIE , dans *philosoph. transact.* , vol. XLVII , 1751-52-53 , pag. 384 , 514 , art. 63 , 87. — 2.^o D. SESTINI , della peste di Costantinopoli ; Florence 1779.

O. Peste d'Alep , en 1760-61-62 ; A. RUSSEL , *the natural history of Aleppo* , etc. ; Lond. 1756 ; et *a treatise of the plague* , etc. ; Lond. 1791. — TH. DAWES , dans *philosophical transact.* , etc. ; vol. LIII , Lond. 1764 , art. 12 , pag. 39.

P. Peste d'Orient ; *berlinische sammlungen* , vol. VII ; Berlin 1775 , pag. 118.

Q. Peste des Russes et des Turcs ; KLINT , dans *neves magazin for aertze* ; vol. I ; Leips. 1779 , pag. 193.

R. Peste de la Syrie ; l'abbé MARITI , voya-

ges dans l'île de Chypre, la Syrie et la Palestine, tom. I.

S. Peste de Moscou, en 1771; 1.^o SAMOLOWITZ, mémoire sur la peste qui, en 1771, ravagea l'empire de Russie et Moscou, etc.; Paris, Moscou 1783. — 2.^o De MERTENS, traité de la peste, contenant l'histoire de celle qui a régné à Moscou en 1771; Vienne et Strassb. 1784.

T. Peste de Spalatro; P. PINELLI, giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo, tom. III; Venet. 1786, art. 20., pag. 215.

U. Peste de la Dalmatie, en 1783--84; J. BAJAMONTI, storia della peste che regno in Dalmatia, etc.; Venise 1786.

V. Peste de la Transylvanie, en 1786; M. LANGE, rudimenta doctrinæ de peste; Vienn. 1784, Offenbach 1791.

X. Peste des armées russes, depuis 1769 jusqu'en 1774; J. M. MODERER, abermal ein beytrag zur kenntniss und keilund der pest, etc.; Riga 1790. — Comment. de peste, etc.; Jena 1791.

Formes.

Sor. 1. Syncope vénénique (occasionnée par

les vapeurs putrides d'hôpital, etc.); SAUV.,
cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 10.
2. Emphysème, suivi d'un abcès par des
vapeurs putrides; MORAND, *hist. de l'acad.
roy. des sciences*, ann. 1766, pag. 1315 des
mémoires.

3. Fièvre avec charbon; LEROY, *mém. sur
les fièvr. aig.*, pag. 32.

4. Fièvre inflammatoire putride; maladie
putride débutant par l'inflammation ou mas-
quée sous les apparences de l'inflammation.

Voy. J. A. GLYCKERR, *de febre inflamma-
toriâ mesenterio-intestinali*; Argent. 1757.

5. Angine putride maligne.

A. Squinancie maligne; SAUV., cl. III, ord.
III, gen. XX, esp. 3.

B. Squinancie purpuro-parotidée; SAUV.,
ibid; esp. 15.

C. Amphimerine angineuse; SAUV., cl. II,
ord. II, gen. VI, esp. 14.

D. Squinancie ulcéreuse; SAUV., cl. III, ord.
III, gen. XX, esp. 3, var. A.

E. Squinancie gangreneuse; SAUV., *ibid*,
var. B.

Voy. J. JOHNSTONS, *de anginâ malignâ*;
Edinb. 1773.

I. TAYLOR, *de cynanche gangrenosa*; Edinb. 1776.

G. BRUGNONI, *storia della squinancia gangrenosa epidemica e contagiosa*; Turin 1777.

J. JOHNSTONE, *a treatise on the malignant angina or putrid and ulcerous, etc.*; Lond. 1779.

J. DANIEL, *de cynanche typho*; Edinburg. 1782.

6. Pneumonie putride maligne.

A. Péripleurésie putride; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XXII, esp. 2.

B. Péripleurésie maligne; SAUV., *ibid*, esp. 4.

C. Pleuro-péripleurésie érysipélateuse maligne à Eplechin dans le Tournes; PLANCHON, *journ. de méd.*, juillet 1776, tom. XLVI, pag. 24.

D. Pleurésie pestilentielle; SAUV., cl. III, ord. II, gen. XIII, esp. 16.

Voy. G. A. JACQUES, *an peripneumoniæ putridæ vomitoria?* Paris 1752.

A. E. BUCHNER, *de peripneumoniâ nothâ*; Halæ 1757.

BOUILLET, *mém. sur les pleuro pneumonies épidémiques, etc.*; Beziers 1759.

G. FR. SIGWART, *historia pneumonitidis malignæ* ; Tubing. 1763.

J. TYMKOWSKI, *de peripneumoniâ nobilâ* ; 1765.

7. Variole putride , maligne.

A. Variole confluyente cohérente ; SAUV. , cl. III , ord. 1 , gen. II , esp. I.

B. Variole confluyente à placards ; SAUV. , *ibid* ; esp. 13. — Variole confluyente maligne , 4.^e espèce d'HELVETIUS.

C. Variole confluyente noire ; SAUV. , *ibid* , esp. 12. — Variole confluyente maligne , 3.^e espèce d'HELVETIUS. — Variole sanguine de MEAD. — Varioles sanguinolentes ; G. LUND , *kongl. vetenskaps akademiens handlingar* ; etc. vol. XXXI ; Stockh. 1770 , pag. 29 , art. 5.

Hémoptysie varioleuse ; SAUV. , cl. IX , ord. I , gen. II , esp. 7.

Hématurie exanthématique ; SAUV. , cl. IX , ord. I , gen. V , esp. 6.

D. Variole confluyente cristalline ; SAUV. , *ib.* , esp. 10. — Variole japonaise de Wepfer. — Vésicules de la déesse *Barbara*. — Variole confluyente maligne , 2.^e espèce d'HELVETIUS.

E. Variole discrète vésiculaire ; SAUV. , *ib.* , esp. 5. — Variole discrète cristalline de MEAD.

216 F. Variole discrète siliqueuse ; SAUV. , *ib.* ,
esp. 7.

217 G. Variole discrète miliaire ; SAUV. , *ibid.* ,
esp. 8.

H. Variole discrète verruqueuse ; SAUV. , *ib.* ,
esp. 6.

8. Fièvre érysipélateuse.

Voy. PH. G. SCHROEDER , *de febribus ery-*
sipelatosis ; Gotting. 1771 ; et *opusc. medic.*
tom. 1 , pag. 175.

VOGLERS , *handlung der practischen arz-*
neywissenschaft , etc. ; Stendal 1788 , chap.
XI.

9. Pleurésie putride maligne.

Pleurésie pestilentielle ; SAUV. , cl. III , ord.
II , gen. XIII , esp. 16.

Voy. A. E. BUCHNER , *de pleuritide spuria* ;
Halæ 1760.

10. Catarre putride malin ; fièvre catarrale
putride maligne.

— Phrénésie synoco-pleurétique ; SAUV. , cl. III ,
ord. II , gen. XI , esp. 2.

2 Fièvre catarrale maligne de la Franconie ;
HIRSCHING , *franckische sammlungen* , etc. ;
Nurnberg 1759 , vol. IV , art. 7 , pag. 177.

Fièvre

Fièvre catarrhale putride de 1768 ; De MER-
TENS, *obs. med. de febr. putrid., de peste,*
etc., *cap. I.* — BURSERI, tom. I, pag. 341,
rapporte cette maladie à la gastrique maligne
compliquée de catarre. — M. U. WILlich,
de frequenti catarrhorum ex primis viis ori-
gine ; Gotting. 1776.

Voy. H. P. JUCH, *de febre catarrhali epi-*
demicâ, etc. ; Erford 1743 ; et coll. de HAL-
LER, tom. V, pag. 295.

J. TH. ELLER, *obs. de cognosc. et curandâ*
morb. ; Regiom. et Lips. 1762, cap. de ca-
tarrhali malignâ.

PH. A. BOEHMER, *de febre catarrhali ma-*
lignâ epidemicâ, anginâ gangrænosâ stipatâ ;
Halæ 1768.

II. Fièvre scarlatine putride maligne.

Synoque putride ou fièvre continente avec
exanthèmes ; FORESTUS, *de feb. ephem., lib.*
I, obs. XVII.

Scarlatine angineuse ; SAUV., *cl. III, ord.*
I, gen. VIII, esp. 6.

Scarlatine squinancique ; CULLEN, *cl. I,*
ord. III, gen. XXIX, esp. II.

Voy. G. F. H. BRUNICH, *constitutio epi-*
demicâ essendiensis anni 1769--70 sistens his-

toriam febris scarlatino-miliaris anginosæ ; Wesel et Leips. 1771.

J. M. LUTHER, *de scarlatinâ malignâ ; Erford 1777.*

12. Rougeole putride , maligne.

Rougeole anormale ; SAUV. , cl. III , ord. I , gen. IV , esp. 2.

Rougeoles putrides de Londres en 1763 et 1768 ; G. WATSON , *medical observations and inquiries* , etc. , vol. IV ; Lond. 1771 , art. II , pag. 132.

Voy. A. MATTHIEU , *diss. sistens febris malignæ morbillosæ anno 1766-67 ; in inferiore Alsatiâ epidemicæ historiam ; Argentorati 1768.*

13. Fièvre aphteuse putride , maligne.

Aphte malin ; SAUV. , cl. III , ord. I , gen. X , esp. 3.

14. Fièvre phlycténique.

Pemphigüe des camps ; SAUV. , cl. III , ord. I , gen. III , esp. 2.

Pemphigüe helvétien ; SAUV. , *ib.* , esp. 3.

Morta ; LINNÉ , cl. I , gen. I. Phlyctènes répandues en petit nombre sur le bas-ventre ou sur les extrémités , de la grosseur d'une

aveline, avec une fièvre éphémère très-maligne, très-funeste.

→ Fièvre bulleuse (*bullosa*); VOGEL, cl. I, ord. II, sect. II, gen. XLI.

→ Voy. Fièvre pemphygode; *ephem. german. dec. I, an. VIII, obs. 59.*

→ Fièvre synèche avec des vésicules sur la poitrine et sur le cou; MORTON, *append. ad exercit. II.*

→ Fièvre vésicatoriée; MACBRIDE, *a methodical introduct.*, etc., cl. I, gen. IV, esp. 7.

→ Pemphigue indien; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

15. Gangrène du nez emphysématique; I. D. BUSCH, *neves magazin-furt aerzte*, etc., *zenhter band*; Leips. 1788, pag. 230. Cette gangrène fut l'effet de la matière putride provenant d'un animal mort d'une angine suppurée.

Esp. IV. Stuporisme (lipothymique) par l'action d'un venin (a) introduit dans le corps par la morsure ou par la piqûre d'un animal.

Syn. Morsure des serpens; PINEL, classe non déterminée, gen. LXXXIV.

(a) On peut distinguer le venin d'avec le poison

Bibl. D. BROGIANI, de veneno animantium naturali et acquisito tractatus; Florenz. 1752.

J. L. AMOREUX, de noxâ animalium; Avenione 1762.

LINNÉ, morsura serpentum; Upsal. 1762; amæn. academ., tom. VI, 1764, pag. 197.

Morsure des serpens; C. F. HOFFTER, kongl svenska vetenskaps akademiens handlingar, etc., vol. XXIX; Stock. 1778, trim. II, art. I, pag. 85.

Car. Le poulx se déprime; il survient quelquefois des enflures considérables avec soif, des foiblesses, une difficulté de respirer, des sueurs froides et abondantes; la mort.

S-esp. I. (Crotalique) par la morsure d'un serpent du genre des crotales.

proprement dit, en ce que le premier n'agit que lorsqu'il est mêlé avec le sang par une plaie quelconque; au lieu que le poison ne peut nuire que lorsqu'il est avalé et qu'il s'est répandu dans les organes de la digestion. Enfin il y a une troisième et dernière sorte de substances mal-faisantes, qu'on peut nommer poisons vénimeux: telles sont toutes celles qui nuisent également lorsqu'elles sont appliquées sur la peau, ou avalées, ou mêlées avec le sang. *Hist. natur. des reptiles; par DAUDIN, tom. I, pag. 131.*

9 Crotale; LATREILLE, *méthode d'herpétologie*; 1801, divis. II, gen. XIX. Dessous du corps et de la queue, garnis d'une suite de plaques et de bandes transversales; des crochets à venin; queue renfermée à son extrémité dans une ou plusieurs pièces d'une consistance écailleuse, mobiles et bruyantes.

A. Morsure du *boiquira*, mortelle en cinq minutes; l'abbé BONNATERRE, tableau méthodique et encyclopédique des trois règnes de la nature; ophiologie; Paris 1790, esp. 2.

B. Du *dryinas*, mortelle en un ou deux jours; l'abbé BONNATERRE, *ib.*, esp. 3.

C. Du *millet*; très-dangereuse, mais pas toujours mortelle à cause de la petitesse du serpent; l'abbé BONNATERRE, *ib.*, esp. I.

S. esp. II. (Scytalique) par la morsure d'un serpent du genre des scytales.

Scytale; LATREILLE, *ib.*, gen. XVIII. Dessous du corps et de la queue garnis d'une suite de plaques ou de bandes transversales; des crochets à venin; queue nue.

A. Morsure du *piscivore*; seulement dangereuse; l'abbé BONNATERRE, *ib.*, esp. 5.

S-esp. III. (Couleuvrique) par la morsure d'un serpent du genre des couleuvres.

Couleuvre ; LATREILLE , *ib.* , gen. XXII. Dessous du corps garni de plaques ou d'une suite de pièces transversales ; dessous de la queue en ayant des rangées de petites ; tête petite sans cou distinct ; presque toujours couverte en dessus de petites plaques ou d'écailles beaucoup plus grandes que celles du dos , et au nombre de neuf : écaille verticale et antérieure de l'extrémité de la mâchoire supérieure , plus large que haute , presque demi-circulaire ; point de crochets à venin ou de dents tubulées percées d'un ou de deux trous , plus grandes que les dents ordinaires , et renfermées dans une capsule à la branche extérieure de la mâchoire supérieure ; dents égales ou presque égales.

A. Morsure du serpent poison , mortelle en moins de deux minutes ; l'abbé BONNATERRE , *ib.* , esp. 170.

B. Du *baeten* ; produit une enflure considérable , et donne la mort à l'instant ; l'abbé BONNATERRE , *ib.* , esp. 174.

C. De l'*ammodyte* ; mortelle en trois heures ; l'abbé BONNATERRE , *ib.* , esp. 151.

D. Du *serpent à lunettes* ; mortelle dans l'espace de quelques heures ; l'abbé BONNATERRE , *ib.* , esp. 46.

E. Du *chersée* ; mortelle et sans antidote ; l'abbé BONNATERRE , *ib.* , esp. 81.

A. De l'*aspic* ; l'abbé BONNATERRE , *ib.* , esp. 71.

F. Du *lebetin* ; mortelle avec un sommeil léthargique ; l'abbé BONNATERRE , *ib.* , esp. 101.

Esp. V. *Stuporisme* (narcotique) par l'action de quelque poison végétal.

Syn. Narcotisme ; PINEL , cl. IV , névroses ; ord. IV , affections soporeuses ; gen. XLII.

Bibl. G. RICHTER , *assuetudo venena ferendi* , etc. ; Gotting. 1744 ; et *opusc. med.* , tom. III , pag. 118.

SPROEGEL , *experimenta circa venena in vivis animalibus* ; Gotting. 1753 ; coll. de HALLER , tom. VI , pag. 543.

ROSSI , *de nonnullis plantis quæ pro veneratis habentur* ; Pisis. 1762.

I. I. PICCARD , *de venenis et antidotis* 1764.

G. F. SIGWART , *venenorum discrimina summatim excussa* ; Tubing. 1765.

PH. F. GMELIN, *de materiâ toxicorum hominis vegetabilium simplicium in medicamentum convertenda*; Tubing. 1765.

I. R. SPIELMANN, *de vegetabilibus venenatis alsatiæ*; Argent. 1766.

G. L. GRAETER, *diss. tradens doctrinam de venenis in genere*; Argent. 1767.

J. F. ISENFLAMM, *de remediis suspectis et venenatis*; Erlang. 1767.

J. B. FISCHER, *assertiones de venenis*; Pragæ 1768.

G. A. LANGGUTH, *de plantarum venenatarum arcendo scelere*; Viteb. 1770.

C. DRAYTON, *de venenis*; Edinb. 1770.

LUTHER, *diss. de venenis eorumque differentiâ et actione*; Erford 1773.

G. HERVEY, *de venenis*; Edinb. 1774.

PRESTWICH'S, *dissertation on mineral animal, and vegetable poisons, containing a description of poisons in general, etc.*; London 1775.

J. F. GMELINS, *der arzneyk dokt, etc., abhandlung von den giftigen gervachsen, etc.* Ulm. 1775. *Plantes vénéneuses de l'Allemagne et de la Suède.*

VICAT, *histoire des plantes vénéneuses de la Suisse*; Yverdun 1776.

I. F. GMELINS, *allgemeine geschichte der gifte*; 1 theil, *Leipsig*. 1776. Histoire générale des poisons.

I. F. GMELINS, *allgemeine geschichte der pflanzengifte*; *Nurnberg* 1777. Histoire universelle des poisons végétaux.

BULLIARD, *plantes vénéneuses et suspectes de la France*; 1779 et suiv.

B. WILMER, *observations on the poisons vegetables*, etc.; *Lond.* 1781.

LOGAN, *de venenis*; *Edinb.*; et coll. de WEBSTER, tom. III, *Edinb.* 1781, art. 9, pag. 214.

EHRMANN, *de veneficio doloso*; *Argentor.* 1781. — *De veneficio culposo*; *Argentor.* 1782; et coll. de SCHLEGEL, tom. III, pag. 99, 188.

BERGERET, *phytonomatotechnie universelle*, etc.; *Paris* 1782.

BRUGMANS, *de plantis venenatis*, etc.; *Groning.* 1783.

HALLE, *die deutschen giftpflanzen*, etc.; *Berlin* 1784. Plantes vénéneuses de l'Allemagne.

TH. HOULSTON, *observations on poison*, etc.; *Lond.* 1784.

J. J. PLENCK, *toxicologia seu de venenis et antidotis*; *Viennæ* 1785.

PUHN, *materia venenaria regni vegetabilis* ;
Lips. 1785.

SCHULZE, *toxicologia veterum plantas venenatas exhibens*, etc. ; Halæ 1788.

DOELTZ, *neue versuche und erfahrungen uber einige pflanzengiste*, etc. ; Nurnberg 1792.
Essais et expériences sur quelques poisons du règne végétal.

J. H. HEINZE, *de veneni effectu* ; Erlang. 1792.

Car. Langueur ou stupeur souvent spasmodico-convulsive, quelquefois avec délire, vertiges, altération profonde des humeurs ; dégénéral en accablement, profond assoupissement et apoplexie mortelle, ordinairement sans douleurs ni inflammation vive.

§. I.^{er} Produits simples.

S-esp. I. Par des plantes tirées de la Diandrie ; cl. II, LIN.

A. Poivre à large feuille, *piper latifolium* ; LIN., racine.

Éruption des taches, tantôt rouges, tantôt d'un vert jaune, donnant quelquefois lieu à des ulcères qui serpentent sous la peau, de-

viennent fongueux et ichoreux; PUIHN, *loc. cit.*, gen. 2, pag. 21.

S-esp. II. Par des plantes de la Triandrie; cl. III, LIN.

A. Safran, *crocus sativus*; LIN., stigmates. Assoupissement, ris sardonique, délire; PUIHN, *ib.*, gen. 4, pag. 23.

B. Ivraie, *lolium tumulentum*; LIN., graines. Assoupissement phantasmique, difficulté d'avaler et de parler; paralysie; PUIHN, gen. 10, pag. 28.

C. Seigle, *secale cereale*; LIN., excroissance morbifique connue sous le nom d'*ergot*. Convulsions, spasmes, émoussement des sens, paralysie ou nécrose.

A. Raphanie (contraction spastique des articulations avec agitation convulsive, douleur extrême, périodique); LINNÉ, cl. VII, motrices; ord. II, agitatoires, gen. CXLV. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; sect. I, dans les fonctions animales; gen. LII. — HEUVELL, part. III, sect. II, ord. II, gen. III, esp. 3, pag. 92. — PUIHN, gen. II, esp. 29.

Voy. LINNÉ, *raphania* ; *Upsal.* 1763 ; et *amœnit. academ.* , tom. VI, diss. 123, pag. 430. — A. M. WAHLIN, *kongl. vetenskaps akademiens handlingar for aar* , 1771, vol. XXXII, trim. I, art. 2, pag. 14, et trim. II, art. 6, pag. 153. — MARCARD, *medicinsche versuche* , etc. ; Leipsic 1780. — M. RYAW *de raphaniâ* ; *Edinb.* 1784, et *dissert. medic. Edinburgenses* , 1784, n.^o 9.

Kriebel krankheit , *voy.* J. G. LEIDENFROST, *de morbo convulsivo epidemico, germanorum caritatis annonæ comite* , vulgo *die kriebel krankheit* ; *Duisburg.* 1771. — TAUBE, *geschichte der kriebel krankheit* , etc. ; *Gotting.* 1782.

Maladie varene ; *voy.* CRAMER, *diss. sistens casum morbi vareni* , etc. ; *Duisbourg* 1782.

B. Eclampsie typhode ; SAUV. , cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 1.

C. Convulsion ergotique ; SAUV. , cl. IV, ord. III, gen. XIII, esp. 13.

D. Convulsion suédoise ; SAUV. , *ib.* , esp. 7.

E. Rhumatisme nécrosique ; SAUV. , cl. VII, ord. I, gen. III, esp. 14.

F. Nécrose ergotique ; SAUV. , cl. X, ord. VII, gen. XLI, esp. 1.

Mal des ardens ; MEZERAU, *hist. de France*,
ann. 1090.

S-esp. III. Par des plantes de la Tétran-
drie ; cl. IV , LIN.

A. Hypecoum procumbens ; LIN. , suc jau-
nâtre et opiforme.

Des effets analogues à ceux de l'opium ;
PUIGN, gen. 15 , pag. 31.

S-esp. IV. Par des plantes de la Pentran-
drie ; cl. V , LIN.

A. Spigelia, 1.^o *anthelmia*, 2.^o *marylan-
dica* ; LIN. , plante.

Assoupissement, fixité des yeux, scintillation
et dilatation de la pupille.

B. Azalea pontica ; LIN. , fleur.

Nausée, vertige, céphalalgie, stupeur ; PUIGN,
gen. 21 , pag. 35.

C. Chèvre-feuille vulgaire, *lonicera caprifo-
lium* ; LIN. , ses feuilles et ses sommités.

Engourdissement, stupeur, état catalepsi-
forme ; CHAUSSIER, flore de Bourgogne ; *Dijon*
1782.

D. Datura, 1.^o *ferox*, 2.^o *stramonium*,
3.^o *metel* ; LIN.

Sécheresse de la bouche et du gozier ; obscurcissement de la vue avec dilatation de la pupille ; abolition de la mémoire ; PUIHN , gen. 30 , pag. 38. — A. SWAINE , *essays and observations , physical and literary* ; etc. , vol. II ; Edimb. 1756 , art. II , pag. 247.

A. Démence daturique ; SAUV. , cl. VIII , ord. III , gen. XVIII , esp. 3.

B. Délire daturique ; SAUV. , cl. VIII , ord. III , gen. XVII , esp. 2. — Magique ; SAUV. , *ib.* , esp. 5.

C. Manie daturique ; SAUV. , cl. VIII , ord. III , gen. XX , esp. 5.

D. Amaurose narcotique ; SAUV. , cl. VI , ord. I , gen. IV , esp. 12.

E. Mutite narcotique ; SAUV. , cl. VI , ord. III , gen. XIV , esp. 3.

F. Dysphagie daturique ; SAUV. , cl. VII , ord. III , gen. XVII , esp. 11.

E. Jusquiame , *hyosciamus* , 1.^o noire , 2.^o blanche , 3.^o physaloïde ; LIN. , toute la plante.

Délire querelleur , vue microscopique , sommeil quelquefois suivi d'éruptions gangréneuses aux cuisses et aux jambes ; PUIHN , gen. 33 , pag. 41. — A. PITCARN , *essays observations physical and literary* , etc. , vol. II ; Edimb.

1756, art. 10, pag. 143. — COSTA, *journal de méd.*, janvier 1769, tom. XXX, pag. 134.

A. Vertige vénérique; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. I, esp. 6.

B. Délire jusquiamique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 13. — Temulent, SAUV. *ib.*, esp. 1.

C. Dysphagie siccative; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 18.

F. Tabac, *nicotiana*, 1.^o *tabacum*, 2.^o *fruticosa*, 3.^o *rustica*, 4.^o *paniculata*, 5.^o *glutinosa*; LIN.

Etourdissement vertigineux, ivresse, affoiblissement de la mémoire; PUIHN, gen. 38, pag. 43.

A. Hématémèse vénérique; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. IV, esp. 14.

B. Dyspepsie nicotianique; TRILLER, *de tabaci ptarmici abusu*; *opusc. medic.*, tom. I, pag. 220.

C. Dysphagie sèche, difficulté d'avaler causée par la sécheresse du gozier à l'occasion de la fumée du tabac; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 18.

G. *Atropa*, 1.^o *mandragora*, 2.^o *belladonna*; LIN., leur racine et leurs baies.

Stupéfaction vertigineuse, sécheresse de la gorge, dilatation de la pupille, gangrène universelle ; PUIHN, gen. 43, pag. 45.

A. Délire belladonique ; CH. FR. S. GIRAUDY, le délire causé par la belladone a-t-il un caractère qui lui soit propre ? Paris an x.

B. Manie belladonique ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 5.

C. Convulsions belladoniques ; *acad. des sc.* ann. 1703, art. *botan. hist.*

D. Dysphagie par sécheresse ; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 18.

H. *Physalis somnifera* ; LIN., racine et baies. Les effets de l'opium avec moins d'activité ; PUIHN, gen. 45, pag. 47.

I. *Solanum*, 1.^o *dulcamara*, 2.^o *nigrum*, 3.^o *mammosum*, 4.^o *sodomeum*, 5.^o *foetidum* ; LIN., racine, baies et suc épaissi.

Étourdissement, vertige, délire, évacuations ; PUIHN, gen. 46, pag. 47.

K. Noix vomique ; *strychnos nux vomica* ; LIN., racine, écorce, feuilles et sur-tout fruit avec les graines.

Ivresse, angoisses, langueur subite, évacuations violentes ; PUIHN, gen. 52, pag. 50.

L. Fève

L. Fève de St-Ignace; *ignatia amara*; LIN.,
baies.

Vertiges avec tremblement universel, défaillances, mouvemens convulsifs, sueurs froides, sentiment prurigineux ou de fourmillement surtout à la tête; PUIHN, gen. 54, pag. 52.

M. *Cestrum*, 1.^o *nocturnum*; 2.^o *venenatum*, 3.^o *vespertinum*; LIN., baies.

Extrêmement vénéneux; PUIHN, gen. 55, pag. 52.

N. *Cerbera*, 1.^o *ahouai*, 2.^o *manghas*, 3.^o *thewetia*; LIN., suc laiteux du tronc et des feuilles.

Extrêmement vénéneux; PUIHN, gen. 61, pag. 54.

O. *Chenopodium hybridum*; LIN., feuilles.

Vertige, trouble de la vue, foiblesse du poul, relâchement de la pupille, lividité de la peau, des lèvres, de la langue, des ongles, ictère; PUIHN, gen. 74, pag. 60.

P. Grande ciguë, *conium maculatum*; LIN., la plante, sur-tout fraîche.

Vomissemens, cardialgie, étourdissemens, perte de la vue, délire mortel; PUIHN, gen. 76, pag. 61.

Délire cicutique ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 4.

Q. Angélique atro-purpure, *angelica atro-purpurea* ; LIN.

Effets d'un poison indomptable ; PUIHN, gen. 77, pag. 63.

R. *Sium latifolium* ; LIN., l'herbe.

Céphalalgie vertigineuse, délire, insensibilité ; funeste sur-tout aux épileptiques ; PUIHN, gen. 78, pag. 64.

S. Cénanthe, 1.^o cénanthe aquatique, *œnanthe fistulosa* ; LIN. ; 2.^o cénanthe safranée, *œnanthe crocata* ; LIN. ; 3.^o *phellandrium aquaticum* ; LIN., plante et sur-tout racine.

Langueur, évacuations, convulsions, lipothymie, chute des cheveux et des ongles, rhinorrhagie et mort ; PUIHN., gen. 79-81, pag. 64-65.

A. Syncope convulsive mortelle ; VACHER, *acta helvetica*, vol. IV, art. 11, pag. 69.

B. Eclampsie cénanthique ; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 17.

C. Eclampsie phellandrique ; SAUV. *ib.* esp. 18.

D. Convulsions mortelles après une extrême foiblesse des jambes et une cholérée ; W. VAT-

SON, *philosophical transactions*, vol. L, part.
11; Lond. 1759, art. 114, pag. 856.

T. Cicutaire aquatique, *cicuta virosa*; LIN.
la plante.

Voy. WEPFER, *cicutæ aquaticæ historia et
noxæ*; Basil. 1679, 1716.

Ivresse, vertige, pente au sommeil, carus,
stupeur, anxiétés, coliques dégénérant en in-
flammation, convulsions, pétéchies, sèche-
resse de la gorge; et après la mort, lividité
affreuse, gonflement énorme du corps; PUIHN,
gen. 82, pag. 66.

Mort très-prompte, *acad. des sciences*, ann.
1715, art. botan.

U. Petite ciguë, *æthusa cinapium*; LIN.,
herbe et racine.

Voy. BUCHHAVE, *æthusæ cynapii in corpore
humano effectus nocivus*; *acta hauniensia*, tom.
I, pag. 51.

Effets analogues à ceux de la cicutaire aqua-
tique; PUIHN, gen. 84, pag. 67.

V. *Coriandrium*, 1.^o *sativum*, 2.^o *testicu-
latum*; LIN., l'herbe fraîche.

Amblyopie, enrouement, stupeur, assoupis-
sement; PUIHN, gen. 85, pag. 68.

X. Chærophylum , 1.^o *temulentum* , 2.^o *sylvestre* , 3.^o *bulbosum* ; LIN. , racine , plante et même semences.

Délire , étranglement , vertige ; PUIHN , gen. 87 , pag. 68.

S-esp. V. Par des plantes de l'hexandrie ; cl. VII , LIN.

A. Fritillaria imperialis ; LIN. , toute la plante.

Effets analogues à ceux de la grande ciguë ; PUIHN , gen. 101 , pag. 77.

B. Gloriosa superba ; LIN. , racine.

La mort , même en petite quantité ; PUIHN , gen. 102 , pag. 78.

S-esp. VI. Par des plantes de l'octandrie ; cl. VIII , LIN.

A. Paris quadrifolia ; LIN. , plante et baies.

Sécheresse à l'arrière bouche , anxietés , vomissemens , sommeil ; *démonstr. élém. de botan.* , tom. II , gen. 214 , pag. 316.

S-esp. VII. Par des plantes de la décandrie ; cl. X , LIN.

A. Ledum palustre ; LIN.

Violente céphalalgie , vertige , narcose ; et à forte dose peut être la mort ; PUIHN , gen. 125 , pag. 92.

B. Rhododendrum , 1.^o *ferrugineum* , 2.^o *chrysanthum* , 3.^o *ponticum* ; LIN. , feuilles.

Vertige ; ivresse , stupeur , ardeur et constriction de l'œsophage ; foiblesse et froid des extrémités ; PUIHN , gen. 126 , pag. 92.

S-esp. VIII. Par des plantes de l'icosandrie ; cl. XII , LIN.

A. Laurier-cerise , *prunus lauro-cerasus* ; LIN. , eau distillée.

Vertige , douleurs des membres , irritabilité tantôt augmentée , tantôt diminuée , dissolution du sang , la mort ; PUIHN , gen. 152 , pag. 104. — A. VATER , de *lauro-cerasi indole venenata* ; Viteberg. 1737. — PENCHIENATI , acad. des scienc. de Turin , ann. 1786 et 1787 ; Turin 1788 , art. VIII , pag. 108. — FONTANA , traité du venin de la vipère , tom. II , pag. 125 , 137.

B. Pêcher , *amygdalus persica* ; LIN. , eau distillée des noyaux.

C. Amandier , *amygdalus communis* ; LIN. ,

eau distillée des amandes amères ; DARIES ,
epistola gratulatoria , de amygdalis et oleo ama-
rarum æthereo ; Leips. 1776.

Convulsions , vomissement , étourdissement ;
 PIÈVRE , *bibliothèque germanique* , tom. 1 ,
 pag. 107.

S-esp, IX. Par des plantes de la polian-
 drie ; cl. XIII , LIN.

A. Actæa spicata ; LIN. , herbe , racine ,
 semences.

Délire , mort , etc. ; PUHN , gen. 154 , pag.
 105.

B. Pavot , papaver somniferum ; LIN. , ex-
 trait connu sous le nom d'opium.

Voy. WEDEL , opiologia ; Jenæ 1674.

YOUNG , *treatise an opium* , etc. ; London
 1753.

TRALLES , *usus opii salutaris et noxius ;*
Breslaw 1757.

GARTSHORL , *de papaveris usu tam noxio ;*
etc. ; Edinb. 1764.

BARD , *de viribus opii ; Edinb. 1765.*

LINNÉ , *opium ; Upsal, 1775 ; et amænité,*
academ. , tom. VIII , diss. CLXVIII , pag. 289.

WIRTENSOHN , *dissertat. opium vires fibra-*

rum cordis debilitari, etc.; *Harderovici* 1775;
 et *HOFFMANNI opusc. latin.*, etc.; édit. de
CHAVET, monast. Westph. 1789, art. x, pag.
 205.

BASSIANI CARMINATI, de animalium ex me-
phitibus, etc.; *Laudepompeia* 1777, lib. III.

LEIGH, an experimental inquiry in to the
properties of opium, etc.; *London* 1786.

De l'opium et de la manière d'agir chez les
 orientaux; *gazette salulaire*, ann. 1786, n.^o
 XXXVIII.

SIEBOLD, de effectibus opii in corpus ani-
male, maxime respectu habito ad ejus ana-
logiam cum vino, etc.; *Gotting.* 1790.

Gaité, délire, salacité, fureur, vertige, dis-
 solution du sang, apoplexie mortelle.

Ou langueur, tristesse, sommeil paisible et
 agréable ou phantasmique, abolition des sens,
 sueur prurigineuse, carus mortel; *PUHN*, gen.
 157, pag. 106.

A. Démonomanie indienne; *SAUV.*, cl. VIII,
 ord. III, gen. XXI, esp. 7.

B. Délire opiique; *SAUV.*, cl. VIII, ord.
 III, gen. XVII, esp. 3.

Délire mortel, *acad. des sciences*, ann. 1735,
 obs. de physique générale.

C. Carus narcotique ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXX, esp. 14.

Léthargie narcotique ; SAUV., cl. V, ord. V, gen. XXVIII, esp. 3.

C. Myristica fatua ; LIN., fruit.

Dérailonnement, délire.

D. Lecythis minor ; LIN., sémence.

Nausée, anxiété, trouble de tête ; PUIHN, gen. 161, pag. 109.

E. Thé, thea bohea ; LIN., feuilles récentes.

Voy. LINNÉ, potus theæ ; Upsal. 1765 ; et amœnit. academ., tom. VII, art. 133.

Nausée, spasme, gaité, cardialgie, hémoptysie, toux phthisique.

Vertige, foiblesse, tremblement, pusillanimité, aphonie, affoiblissement de la mémoire, paralysie, mort lente ; PUIHN, gen. 164, pag.

111, esp. 10110de, supin stansq no eldsrps

F. Nielle, nigella, 1.° damascena, 2.° sativa, 3.° arvensis, LIN., sémence.

Convulsion nigellique ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIII, esp. 8.

S. esp. X. Par les plantes de la monadelphie ; cl. XVI ; LIN.

A. Sida asiatica ; LIN., sémence.

Sommeil soutenu ; PUIHN , gen. 202 , pag. 131.

B. Baringtonia speciosa ; LIN. , noyaux.
Ivresse ; PUIHN , gen. 203 , pag. 131.

S-esp. XI. Par des plantes de la diadelphie ; cl. XVII , LIN.

A. Ers , *eryum eryilia* ; LIN. , semences.
Débilité des pieds , telle qu'on chancelle et qu'on ne peut se tenir debout ; PUIHN , pag. 135.

S-esp. XII. Par des plantes de la syngénésie ,

A. Laitue , *lactuca* , 1.^o *scariola* , 2.^o *virrosa* ; LIN. , la plante.

Les effets de l'opium , moins forts ; PUIHN , gen. 206 , pag. 138.

S-esp. XIII. Par des plantes de la monœcie ; cl. XXI , LIN.

A. Hêtre , *fagus sylvatica* ; LIN. , noix.
Engourdissement , tristesse , imbécillité , céphalalgie , fièvre aiguë , hydrophobie mortelle ; PUIHN , gen. 225 , pag. 148.

B. Bryone , *bryonia alba* ; LIN. , racine récente et bourgeons.

Vomissement , superpurgation , folie , stupeur , vertige avec obscurcissement de la vue , anxiété , peut-être la mort ; PUIHN , gen. 239 , pag. 155.

S.-esp. XIV. Par des plantes de la diocisie ; cl. XXII , LIN.

A. Chanvre , cannabis sativa ; LIN. , sémences , écorce des feuilles , suc et sommités , et principalement la poussière fécondante.

Les effets d'un narcotique ; PUIHN , gen. 241 , pag. 157.

B. Mercuriale , mercurialis perennis ; LIN. , herbe.

Evacuations , ardeur de la tête , douleurs arthritiques , assoupissement , quelquefois la mort ; PUIHN , gen. 242 , pag. 158.

C. Coriaria myrtifolia ; LIN. , feuilles , surtout les baies.

Convulsions générales , anesthésie mortelle ; PUIHN , gen. 243 , pag. 158.

D. Menispermum cocculus ; LIN. , baies ou plutôt noyaux.

Spasmes , hémorragie , nausée , évacuations ,

lipothymie , mort si ce n'est de l'homme , au moins des animaux ; PUIHN , gen. 244 , pag. 159.

E. If, taxus baccata ; LIN. , feuilles , baies , semences.

Vomissement mortel , diarrhée , fièvre ardente , étranglement , froid universel ; PUIHN , gen. 245 , pag. 160.

S-esp. XV. Par des plantes de la polygamie ; cl. XXIII , LIN.

A. Sensitive, mimosa , 1.^o *sensitive* , 2.^o *pudica* , 3.^o *fornesiana*.

Mort plus ou moins prompte ; acrimonie des humeurs , hecticie ; narcose ; PUIHN , gen. 248.

B. Figuier, ficus , 1.^o *caricæ* , 2.^o *sycomori* , 3.^o *toxicaria* , 4.^o *grossularioides* ; LIN. , suc en général , et fruit de l'espèce 3.

Effets vénéneux ; PUIHN , gen. 250-251 , pag. 164.

S-esp. XVI. Par des plantes de la cryptogamie ; cl. XXIV , LIN.

Champignons (*). *Voy. BATTARA, historia fungorum agri arimiensis; Faventiae 1755.*

(*) *Principaux champignons vénéneux de LAMARCK.*

A. Amanite poivrée ; LAMARCK , esp. 1 ; *agaricus piperatus* ; LIN. , esp. 8.

B. Amanite pernicieuse ; LAMARCK , esp. 4. — Laitreuse ; LAMARCK , esp. 2. — *Agaricus lactifluus* ; LIN. esp. 7. — Sanguine ; LAMARCK , esp. 3. — *Agaricus deliciosus* ; LIN. , esp. 6.

C. Amanite vénéneuse ; LAMARCK , esp. 5.

D. Amanite à zones ; LAMARCK , esp. 6.

E. Amanite bronzée ; LAMARCK , esp. 7.

F. Amanite rouge ; LAMARCK , esp. 8 ; *agaricus integer* , esp. 3.

G. Amanite aranéuse ; LAMARCK , esp. 13 ; *agaricus violaceus* ; LIN. , esp. 11.

H. Amanite blanche ; LAMARCK , esp. 24.

I. Amanite glutineuse ; LAMARCK , esp. 25 ; *an agaricus viscidus* ; LIN. , esp. 13.

K. Amanite mouchetée ; LAMARCK , esp. 45 ; *agaricus muscarius* ; LIN. , esp. 4.

L. Amanite printanière ; LAMARCK , esp. 51.

Désignation des champignons vénéneux par
PUIGN.

A. *Agaricus cantharellus* , gen. 253 , pag. 166.

B. *Agaricus integer* , gen. 254 , pag. 166.

C. *Agaricus muscarius* , gen. 255 , pag. 167.

D. *Agaricus necator* , gen. 256 , pag. 167.

SCHAEFFER, *fungorum etc. icones*; Ratisb.
1762--63.

- E. *Agaricus pustulatus*, gen. 257, pag. 168.
- F. *Agaricus piperatus*, gen. 258, pag. 168.
- G. *Agaricus bulbosus vernus*, gen. 259, pag. 168.
- H. *Agaricus viscidus*, gen. 260, pag. 168.
- I. *Agaricus clypeatus*, gen. 261, pag. 169.
- K. *Agaricus fimetarius*, gen. 262, pag. 169.
- L. *Agaricus stypticus*, gen. 263, pag. 169.
- M. *Agaricus radicosus*, gen. 264, pag. 169.
- N. *Agaricus sanguineus*, gen. 265, pag. 169.
- O. *Agaricus pileo cucullato*, etc., pag. 170.
- P. *Agaricus pileo plano*, etc., pag. 170.
- Q. *Agaricus candidus et viscidus*, etc., pag. 170.
- R. *Amanita coniformis*, etc., pag. 170.
- S. *Agaricus globoso-viscida*, etc., pag. 170.
- T. *Boletus luteus*, pag. 170.
- U. *Hydnum repandum*, pag. 170.
- V. *Phallus impudicus*, gen. 266, pag. 171.
- X. *Phallus-mokusin*, gen. 267, pag. 171.
- Y. *Peziza auricula*, pag. 171.
- Z. *Lycoperdum bovista*, gen. 268, pag. 171.
- AA. *Lycoperdum stellatum*, gen. 269, pag. 171.
- BB. *Fungus phalloides*, etc., gen. 270, pag. 173.
- CC. *Fungus bulbosus*, etc., gen. 271, pag. 173.

Champignons vénéneux indéterminés.

- A. *Agaric conique*; PICCO, *hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris*, tom. IV, pag. 355, *hist.*

PAULET , mémoire sur un ordre particulier de champignons , etc. ; *hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris* , ann. 1776 , tom. 1 , pag. 431 des mém.

CARTHEUSER , *de fungorum venenatorum notis* ; Giessæ 1777.

DE NECKER , traité sur la mycologie , etc. ; *Manhein* 1783.

BATSCH , *elénchus fungorum* , etc. ; *Halæ* 1783. — *Elenchi fungorum continuatio prima* ; *Halæ* 1786.

LEVIANI , *sopra il veneno de funghi* ; etc. ; *mémorie della societa italiana* , tom. III ; *Verona* 1786 , pag. 471.

B. Boletus cancellatus ; AYMEN , *hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris* , tom. 1 , pag. 344.

C. Agaric champêtre , *agaricus campestris* ; DARDANA , *in agaricum campestre veneno in patria infamen acta* ; à la suite de l'ouvrage de PICCO , *melethemata inauguralia*. L'auteur des *démônstr. élém. de botan.* , Lyon , 3.^e édit. , 1787 , tom. III , pag. 418 , place sous le n.^o 9 l'agaric champêtre de LINNÉ , et dit que c'est le plus usité comme aliment. Cet agaric est l'amanite comestible , LAMARCK , esp. 51 , ou le champignon des couches. D'après les observations de DARDANA , on voit que le même champignon est esculent et a été mangé sans danger. Il y a donc une erreur dans l'observation qu'il cite , ou , parmi les champignons innocens , il s'en étoit trouvé de vénéneux.

Pieco , de *fungorum generatione* , etc. ;
melethemata inaug. aug. Taurin. 1788 , pag.
 1 , 105 , 237 , 265.

PAULET , *tabula plantarum fungosarum* ;
Paris 1791.

Car. Coliques , évacuations , tremblement ,
 délire , assoupissement , mort.

A. Orthopnée par les champignons ; SAUV. ,
 cl. v , ord. 11 , gen. IX , esp. 25.

B. Cholera sec par les champignons ; SAUV. ,
 cl. IX , ord. 11 , gen. XV , esp. 2 , var. A et B.

§. I I.

Produits de la fermentation.

S-esp. XVII. Par le produit fermenté de
 la vigne ; *vitis vinifera* ; LIN. , pentand.
monog.

Voy. T. G. HERNISEN , de *causâ inebriandi*
spirituum vinosorum ; *Duisb.* 1780.

Le vin , en excès , détermine la perte de
 la raison , le vertige , le balbutiement , le gon-
 flement du visage et des yeux , la foiblesse
 des jambes , la perte des sens , le sommeil
 profond , l'apoplexie.

A. Tremblement ébriétique ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 3.

Tremblement hydrocéphalique (effet de l'abus du vin) ; SAUV., *ibid*, esp. 8.

B. Diplopie temulente ; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. III, esp. 10.

C. Délire temulent ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 1.

Bachantisme ; PAW, *œuvr. philosoph.*, tom. VI, pag. 181.

D. Apoplexie temulente ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXXI, esp. 3.

E. Aphonie ébriétique ; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XV, esp. 3.

F. Diabète vineux ; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXV, esp. 5.

§. III.

Plantes narcotiques indéterminées.

S-esp. XVIII. Par la *Jatropha umbellata*;

LIN., la plante.

Approchées du nez, il en provient la céphalalgie, le vomissement, la diarrhée ; PUIHN, gen. 274, pag. 176.

Gen. XX.

Gen. XX. DÉMENCE.

Eth. du mot latin *dementia*, qui signifie *perte de raison*.

Syn. Démence ; SAUVAGES , cl. VIII , vésanies ; ord. III , délires ; gen. XVIII. — LINNÉ , cl. V , mentales ; ord. I , idéales ; gen. LXVII. — VOGEL , cl. IX , paranoïes ; gen. CCCXXXVII. — CULLEN , cl. II , névroses ; ord. IV , vésanies ; gen. LXV. — SAGAR , cl. XIII , vésanies ; ord. III , délires ; gen. XIX.

Vésanie ; LINNÉ , cl. V , mentales ; ord. I , idéales ; gen. LXX.

Imbécillité , démente ; VITET , cl. V , maladies de l'esprit ; ord. IV , vices du jugement et de la mémoire ; gen. II.

Bibl. CL. F. GRANDCLAS , *an mente motis multum sanguinem detrahere conducatur ?* Paris 1750.

I. H. KNIPHOF , *de insaniâ* ; Erford 1753.

C. A. KLOEKHOFF , *de morbis animi ab infirmato tenore medullæ cerebri* ; Traject. ad Rhen. 1753.

Z. PLATNER , *prolusio quâ medicos de insanis et furiosis audiendos esse ostendit* ; opusc.

medic., tom. II, pag. 146; et coll. de SCHLEGEL, tom. II, pag. 156.

R. A. VOGEL, *de insaniâ longâ*; Gotting. 1763.

E. G. BOSE, *de morbis mentis delicta excusantibus*; Lips. 1774.

Instruction sur la manière de gouverner les insensés; Paris 1783; et *journ. de médéc.*, ann. 1785, tom. LXIV, pag. 529.

ARNOLD, *observations on the nature, kinds, causes and prevention of insanity, lunacy, or madness*, etc., vol. I; Leicester 1782; — vol. II 1786; et en allemand, Leipsic 1784--88.

G. PERFECT, *select cases in different species of insanity*, etc.; Lond. 1787; en allemand; Leipz. 1789.

L'abbé ROBIN, du traitement des insensés dans l'hôpital de Béthléem de Londres; traduit de l'anglais, etc.; Amsterdam 1787.

G. LANDIS, *de melancoliâ ex mente*; Gotting. 1788.

HARPER, *a treatise of the real cause and cure of insanity*, etc.; Lond. 1789.

Détails sur l'établissement du docteur WILLIS, pour la guérison des aliénés; *biblioth. britann., littérat.*, vol. I, pag. 759.

G. PERFECT, *a remarkable case of madness* ; etc. ; Lond. 1791.

Car. Foiblesse et même abolition de la faculté intellectuelle , dans les rapports de la mémoire , des perceptions et des jugemens.

Esp. I. Oubli.

Syn. Oubli (*amnesia*) ; SAUVAGES , cl. VIII ; vésanies ; ord. IV , anormales ; gen. XXII. — LINNÉ , cl. VI , quiétales ; ord. III , privatives ; gen. CVII. — VOGEL , cl. IX , paranoies ; gen. CCCXXXVIII. — SAGAR , cl. XIII , vésanies ; ord. IV ; anormales ; gen. XXIII.

Bibl. RICHTER , *de naturâ , labæ et præsidis memoriæ humanæ* ; Gotting. 1752 ; et *opusc. medic.* , tom. II , pag. 55 et 103.

ERN. PLATNER , *de vi corporis in memoriâ* ; etc. , *specimen* I et II ; Lips. 1767 ; et coll. de BALDINGER , tom. II , pag. 55.

Car. Défaut de reproduction des idées dans l'esprit.

S-esp. I. Oubli coïtique (par le trop grand usage des femmes) ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

S-esp. II. Oubli sénile ; SAUV. , *ib.* , esp. 2.

Esp. II. Imbécillité.

Syn. Démence proprement dite ; imbécillité ; fatuité.

Stupidité ; VOGEL , cl. IX , paranoïes ; gen. CCCXXXVI.

Car. Difficulté et souvent impossibilité de juger et d'imaginer.

S-esp. I. Incohérente.

Impossibilité de lier les idées et les mots.

Folie incohérente ; ARNOLD , *loc. cit.* , gen. I , esp. 2.

S-esp. II. Niaise.

Dépravation du jugement qui , par incapacité d'apprécier les objets , semble applaudir à tout par une expression sensible de joie et par une contenance naïve et ridicule.

Niaiserie ; VITET , cl. V , ord. II , gen. VII , esp. I.

Folie inepte ; ARNOLD , *loc. cit.* , gen. II , esp. 3.

S-esp. III. Bête.

Dépravation du jugement qui, par défaut d'idées distinctes sur les objets et sur leurs rapports, fait agir et parler sans goût et sans justesse, pour l'ordinaire avec entêtement.

Bêtise; VITET, cl. V, ord. II, gen. VII, esp. II.

Folie impulsive; ARNOLD, *loc. cit.*, gen. II, esp. 3.

Var. A. Démence à la suite d'une fièvre quarte; SAUV., *loc. cit.*, esp. II.

B. Démence par une maladie externe de la tête; SIBBERN, *act. soc. méd. Haun.*, vol. I, pag. 86.

C. Démence sénile; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.

Esp. III. Idiotisme.

Car. Impossibilité absolue de former des idées, avec un degré plus ou moins considérable de taciturnité, de stupeur et d'insensibilité.

Rap. A. Démence morosique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

S-esp. I. Microcéphalique (par un excès de petitesse de la tête).

Démence microcéphalique; SAUV., *loc. cit.*,
esp. 6.

Esp. IV. Crétinisme.

*Bibl. Tentamen de scrophulis et stupiditate
in nonnullis provinciis eas comitante*; Turin
1789.

ACKERMAN, *uber die kretinen*, etc.; Gotha
1790.

R. KLAYTON, sur les cretins du Vallais;
*memoirs of the litterary and philosophical
society of manchester*, etc., vol. 111; Lond.
1790, art. XIII.

FODERÉ, essai sur le goître et le crétinage;
Turin 1792.

MALACARNE, *giornale per servire alla storia
ragionata della medicina di questo secolo*,
tom. VI, art. 529.

SAUSSURE, des cretins et des albinos; *voya-
ges dans les Alpes*, tom. IV, pag. 391.

Car. Abolition de toute intelligence pour
l'ordinaire avec goître, surdité, muétisme, et
un très-haut degré d'insensibilité.

Gen. XXI, GOITRE,

Eth. Mot formé par corruption du latin,
guttur, qui veut dire gorge.

Syn. Bronchocèle ; SAUVAGES, cl. I, vices ; ord. IV, excroissances ; gen. XXVIII. — VOGEL, cl. X, vices ; ord. II, tumeurs ; gen. 369.

Trachelophyma , SAGAR, cl. I, vices ; ord. IV, excroissances ; gen. XXXIII.

Gongrona ; VOGEL, cl. X, vices ; ord. II, tumeurs ; gen. 371.

Bibl. TH. PROSSER, *an account and method of cure of the bronchocele* ; etc. ; Lond. 1769.

READ, mém. sur les bronchocèles du pays Messin ; etc. ; Nancy 1777.

VALENTIN, *dissert. méd. chirurg. de strumâ , bronchocele dictâ , et de hemeralopiâ* ; Nancy 1787.

FODERÉ, essai sur le goître et le crétinage ; Turin 1792.

J. GAUSIERI, *tyrolensium , carynthiorum , styriorumque struma* ; Vindobon. 1794.

Car. Tumeur molle ou pâteuse, placée au devant de la gorge, souvent en forme de croissant.

Esp. I. Goître cellulaire.

Tumeur uniforme et d'une extension à peu près égale d'une oreille à l'autre.

S-esp. I. Séreux.

Principalement remarquable par l'empâtement de la tumeur, et même par un certain degré de fluctuation.

Rap. A. Bronchocèle aqueux; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

S-esp. II. Mellicérique.

Caractérisé par la rénitence de la tumeur.

S-esp. III. Stéatomatique.

Indiqué par une plus grande dureté de la tumeur.

Rap. A. Bronchocèle botique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

B. Bronchocèle adipeux; GESSCHER, *præve over de voornaamste langduccrige gezurellen*, etc.; Amsterd. 1780, esp. 1.

Esp. II. Goître thyroïdien.

Car. La saillie de chaque côté du cou est beaucoup plus considérable; le gonflement est plus ou moins inégal; la rénitence est plus marquée.

Rap. A. Bronchocèle sarcome; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

B. Bronchocèle thyroïdien; GESSCHER, loc. cit., esp. 3.

Gen. XXII. DYSCLINIE.

Eth. de *dys*, difficilement; et *kineo*, je me meus.

Car. Les mouvemens volontaires sont pénibles, incomplets, désordonnés.

Esp. I. Tremblement.

Syn. Tremblement; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. III, cloniques partiels; gen. XIV. — LINNÉ, cl. VII, moteurs; ord. II, agitateurs; gen. CXXXI. — VOGEL, cl. V, gen. CLXXXIV. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. III, cloniques partiels; gen. XV.

Bibl. G. G. RICHTER, *de tremore*; Gotting. 1750.

A. E. BUCHNER, *de tremore artuum ejusque causis*; Halæ 1752.

G. E. HAMBERGER, *de tremore*; Jenæ 1754.

Car. Mouvement involontaire, de nature clonique, principalement lorsque la partie affectée perd son point d'appui.

S-esp. I. Tremblement débilitique; SAUV.,
loc. cit., esp. 1.

S-esp. II. Tremblement palpitant; SAUV.,
loc. cit., esp. 16.

S-esp. III. Tremblement paralytodé; SAUV.,
loc. cit., esp. 11.

S-esp. IV. Tremblement sénile; SAUV.,
loc. cit., esp. 2.

Esp. II. Chorée.

Syn. Danse de Saint-Guy, de Saint-Weit.
Scelotyrbe; SAUVAGES, cl. IV, spasmes;
ord. IV, cloniques généraux; gen. XXI. — SA-
GAR, cl. IV, spasmes; ord. IV, cloniques gé-
néraux; gen. XXII.

Chorée; LINNÉ, cl. VII, motoires; ord.
II, agitatoires; gen. CXXXIX. — VOGEL, cl.
V, spasmes; gen. CXCH. — CULLEN, cl. II,
névroses; ord. III, spasmes; gen. LI.

Bibl. J. H. FURSTENAU, *de sancti-Viti saltu
sive choreâ, vulgo vits-tanz; Rinthel 1750.*
G. CH. DETHARDING, *de choreâ sancti-Viti;
Rostoch 1760.*
J. B. M. SCHWARZ, *de tarantismo et choreâ*

sancti-Viti, quantum scilicet inter sese hi morbi aut conveniant aut differant; Viennæ 1766.

C. P. BRUCKMANN, *enarratio choreæ sancti-Viti et epilepsiæ quæ, per fontes medicatos et thermas embsenses curatæ sunt*; Francof. ad Mæn. 1786.

Car. Mouvemens irréguliers et involontaires des extrémités, pour l'ordinaire dans une seule partie latérale du corps, et principalement lorsqu'il s'agit de saisir un corps ou de marcher; souvent avec contorsions du visage.

Rap. A. Scelotyrbe choréique; SAUV., *loc. cit.*, esp.

S-esp. I. Chorée tétanique; MARC, *historia morbi rarioris spasmodici*; Erlang. 1792.

Esp. III. Bériberi.

Nota bene. ZIMMERMAN, de l'exper. en méd. tom. II, pag. 341, prétend que la maladie appelée dans les Indes *beriberi*, est véritablement l'*opithotonos*. PLATNER, dans son *ars medendi*, etc.; Leipsik 1765, avance que cette maladie n'est autre chose que la colique de Poitou; mais BONTIUS semble plutôt l'assimiler

au tremblement ou à la paralysie incomplète, ce qui l'a fait évidemment rentrer dans le genre *dyscinie*.

Car. L'action de marcher consiste dans une sorte d'élancement des genoux et des jambes, d'après l'allure naturelle de la brebis.

Rap. A. Faux beriberi ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

S-esp. I. Bériberi épileptiforme.
Bériberi indien ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

Gen. XXIII. VÉSANIE (a).

Eth. de *vesania*, aliénation d'esprit.

Syn. Vésanie ; LINNÉ, cl. v, mentales ; ord. 1, idéales ; gen. LXX.

Car. Démence chronique partielle, tranquille, sans fièvre.

Esp. I. Mélancolie.

Eth. de *melas*, noir ; et *chole*, bile.

(a) Dans le tableau des genres qui composent la sous-classe première de la deuxième classe, pag. 26, lign. dernière, on a mis *mélancolie* au lieu de *vésanie*, par erreur qu'on voudra bien rectifier.

Syn. Mélancolie; JUNCKER, *tab.* CXXII. — SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XIX. — LINNÉ, cl. V, mentales; ord. I, idéales; gen. LXXI. — VOGEL, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXXII. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. IV, vésanies; gen. LXVI. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XX. — PINEL, cl. IV, névroses; ord. I, vésanies ou égaremens d'esprit non fébriles, gen. XLVI.

Bibl. MAC-MAHON, *an in morbis melancholicis purgatio per inferiora?* Paris. 1750.

E. DE MARQ, *de melancholiâ*; Erford 1751.

LORRY, *de melancholiâ et morbis melancholicis*; Lutet.-Paris. 1765; en allemand par KRAUSE, 1769.

B. FAWCET, *observations on the nature, causes and cure of melancholy, especially of that, wick is commonly called religious melancholy*; Schrewsbury 1780; en allemand par J. F. LEHZEN, Lips. 1785.

I. E. GREDING, *vermischte medicinische und chirurgische schriften*; Altenb. 1781, pag. 128.

J. H. MUNCH, *diss. sistens observationes practicas circa usum Belladonæ in melancholiâ, maniâ et epilepsiâ*; Gotting. 1783.

J. PH. TRUCKENMILLER, *specimen inaug. medic. sistens affectus melancholici historiam cum epicrisi* ; Erl. ngæ 1786.

ANDRY, recherches sur la mélancolie ; *hist. et mém. de la soc. roy. de médéc. de Paris* , ann. 1782--83 , pag. 89 des mém.

Car. L'esprit est aliéné sur un objet particulier , sans fureur ni fièvre.

Rap. A. Démence illusoire, *insania delusiva* ; ARNOLD, *observat. on the nature , kinds , causes and prevention of insanity* , etc. , gen. 11 , esp. 1.

B. Mélancolie dans les fièvres ; BOUVIER , *rec. périod. de la soc. de médéc. de Paris* , tom. IV , pag. 343.

S-esp. I. Mélancolie illusoire.

Le malade s'abuse sur un danger imaginaire , sur la nature de son espèce , ou sur toute autre circonstance.

Var. A. Craintive.

Roulant sur la crainte d'un danger imaginaire : par exemple sur

A. La crainte d'être empoisonné et inspirant le refus de prendre des alimens. M. H. I.

B. La crainte de trop user ses habits , et portant au refus absolu de se vêtir.

C. La crainte de procurer une inondation en pissant , et déterminant au refus obstiné de lâcher ses urines.

D. La crainte qu'ATLAS ne dépose le monde sur ses épaules , et faisant naître une surveillance continuelle pour l'éviter.

E. La crainte , se croyant toujours plongé dans une rivière jusques au nombril , d'être sur le point de se noyer. Mélancolie de PASCAL.

Mélancolie vulgaire ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

B. *Inanimique.*

Dans laquelle le malade croit être mort ou avoir quelques parties du corps composées de substances inanimées.

A. Avoir la tête de verre , de glace.

B. Être une cruche.

C. Avoir les jambes de paille.

D. Être mort.

Mélancolie vulgaire ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

C. *Morbidique.*

Donnant l'idée d'une maladie existante ou de quelque cause supposée de maladie.

A. Mélancolie argante ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4. — MOLIÈRE , comédie du *malade imaginaire*.

B. Mélancolie dans laquelle on croit avoir dans l'estomac des grenouilles ;

Dans la tête , des lapins ou des clapiers , etc.

D. Religieuse.

Avec crainte superstitieuse des événemens futurs ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

A. Austérité ; disposition habituelle à se priver avec opiniâtreté des choses les plus essentielles à la vie , accompagnée de maigreur et de mélancolie ; VITET , cl. v , ord. 11 , gen. xxx.

B. Abstinence ; sentiment habituel qui porte à se priver avec opiniâtreté des alimens nécessaires , accompagné de maigreur , de douleur dans la région épigastrique , et de diminution plus ou moins considérable des forces ; VITET , cl. v , ord. 11 , gen. xxx , esp. 1.

E. Phrontique.

Dans laquelle on a peur de tout , on est inquiet , on fuit le jour et la compagnie , on fait des rêves effrayans , etc. ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 14.

Panophobie phrontique ; SAUV. , cl. viii , ord. 11 , gen. xii , esp. 3.

F. Stupéfactive.

Dans

Dans laquelle la domination de quelque crainte rend pensif et obstiné à ne point changer de place ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6.

G. Zoantropique.

Déterminant la croyance d'être changé en quelque animal ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 12.

A. En chat ; galéantropie.

B. En chien ; lycantropie.

C. En lapin.

D. En cheval , dans la métempsychose. Mélancolie hyppantropique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 12.

E. En coq ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 11.

H. Féminine.

Avec la ferme idée d'être changé en femme.

Mélancolie scytique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 10.

I. Gaie.

Dans laquelle on se repaît de bonheur et de prospérité.

Mélancolie morique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

Mélancolie inspirant l'idée d'être dieu , roi , prince , poëte ; SAUV. , *ib.* — D'assister à des représentations dramatiques ; HORACE , *épître* liv. 11 , *épître* 2. — De voir un port de mer rempli de vaisseaux , et d'en être le propriétaire.

taire ; D'YVOIRY, *essai de médec.*, tom. II, esp. 185.

K. *Plaintive.*

Dans laquelle on s'afflige mal-à-propos sur la nature des événemens et l'état des circonstances.

Le plaintif ; caractère toujours porté à être mécontent de ce qui arrive ; VITET, cl. v, ord. I, gen. III, esp. IX.

L. *Suicidique.*

Portant le dégoût de la vie au point de faire desirer la mort et de déterminer à se la donner.

Mélancolie anglaise ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 11.

Splén des Anglais, le suicide.

Dégoût de soi-même et des choses, qui rend la vie insupportable ; VITET, cl. v, ord. I, gen. III, esp. VII.

GRESSET, comédie de *Sydney*.

PATRAT, comédie de *l'anglais ou le fou raisonnable*.

M. *Érotomanique.*

Avec un amour de vénération pour la personne aimée.

Mélancolie érotomanique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

ROUSSEAU, mélodrame de *Pigmalion*.

N. *Nympholepsique*.

Avec desir de s'égarer dans des solitudes.

Nympholepsie ; accès mélancolique qui faisoit fuir les Grecs dans des endroits solitaires, propres aux rêveries profondes ; PAW ; *œuvr. philosoph.*, tom. VI, pag. 121.

Formes.

Sort. 1. Pleurodynie flatueuse ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. XI, esp. 4.

2. Palpitation mélancolique ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XV, esp. 7. Cette sorte appartient, sous plusieurs rapports, au genre *névrose*.

3. Céphalée mélancolique ; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XII, esp. 5.

4. Goutte mélancolique ; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. I, esp. 6.

Esp. II. Nostalgie.

Eth. de *nostein*, retourner ; et *algeia*, chagrin, tristesse.

Syn. Nostalgie ; JÜNCKER, *tab.* CXXVII. — SAUVAGES, cl. VIII, vésanies ; ord. II, mo-

rosités ; gen. XI. — LINNÉ , cl. V , mentales ;
ord. III , pathétiques ; gen. LXXXIII. — CUL-
LEN , cl. IV , locales ; ord. II , dysorexies ;
sect. I , appétits erronés ; gen. CVI. — SAGAR ,
cl. XIII , vésanies ; ord. II , morosités ; gen.
XI.

Philopatridomanie ; STOLL , *diss. de nostalg.*
— SAUVAGES , gen. *nostalgie*.

Pothopatridalgie ; STOLL , *diss. de nostalg.*

Nostomanie ; STOLL , *ib.*

Maladie du pays.

Bibl. HARDER et HOFER , *de nostalgia* ;
Basil. 1678 ; et coll. de HALLER , tom. I ,
pag. 181.

STOLL , *de nostalgia* ; *dissert. medic.* ; coll.
D'EYEREL , tom. III , pag. 205.

Car. Ardent desir des étrangers pour leur
pays.

Rap. A. Nostalgie simple ; SAUV. , *loc. cit.* ,
esp. 1.

B. Nostalgie simulée ; SAUV. , *loc. cit.* ,
esp. 3.

S-esp. I. Nostalgie compliquée (d'une
fièvre) ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

Esp. III. Démonomanie.

Eth. de *dæmo*, démon; et *mania*, manie, folie.

Syn. démonomanie ; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies ; ord. III, délire ; gen. XXI. — SAGAR, cl. XIII, vésanies ; ord. III, délires ; gen. XXI.

Bibl. A. DE HAEN, *de magia liber, rat. medend.*, tom. VIII, pars II ; Paris 1777.

— *De dæmoniacis ; rat. medend.*, tom. VIII, pars II, cap. IV, pag. 92.

J. FERRIAR, sur l'illusion populaire, et particulièrement sur la démonologie médicale ; *memoirs of the literary and philosophical society of manchester*, etc. ; vol. III ; Lond. 1790, art. II.

Car. Symptômes bizarres imputés à la possession du diable ou aux effets de la magie.

Rap. A. Démonomanie sortilégique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.

B. Démonomanie hystérique (fourberie de deux jeunes filles) ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

C. Démonomanie vampirique (prétendue ar-

tribution d'un pouvoir sur les morts); SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

Voy. DON A. CALMET, traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, de Moravie, etc.; Paris 1751.

Sous - classe deuxième.

SUROXIGÉNÈSES.

Cette sous-classe, destinée aux maladies dans lesquelles on a lieu de croire que l'oxigène est en excès dans les corps vivans, est extrêmement nombreuse. Faut-il s'en étonner, lorsque MM. ROLLO, BEDDOËS, qui ont cru devoir diviser les maladies d'après une doctrine chimique, ont pensé qu'elles pouvoient être toutes comprises sous deux grandes divisions générales, les *oxigénantes* et les *désoxigénantes*? C'est qu'en effet les affections morbifiques où se trouve de la tension, de l'irritation, de l'inflammation, se rencontrent fréquemment dans l'exercice de la médecine; et c'est sous ce rapport que j'ai rangé dans cette sous-classe, à titre de genres,

- XXIV. Le *Phantasme*.
 XXV. La *Physéose*.
 XXVI. Le *Mentisme*.
 XXVII. L'*Agrypnie*.
 XXVIII. La *Névrose*.
 XXIX. La *Paraphrénie*.
 XXX. Le *Salacisme*.
 XXXI. Le *Tonisme*.
 XXXII. La *Narcose*.
 XXXIII. Le *Clonisme*.
 XXXIV. La *Toux*.
 XXXV. L'*Asthme*.
 XXXVI. La *Phthisie*.
 XXXVII. La *Gastroréxie*.
 XXXVIII. L'*Algie*.
 XXXIX. La *Toxicose*.
 XL. La *Paralysie*.
 XLI. L'*Amaigrissement*.
 XLII. L'*Épischésie*.
 XLIII. Le *Spermatisme*.
 XLIV. La *Diarrhée*.
 XLV. La *Cénose*.
 XLVI. Le *Diabète*.
 XLVII. La *Grossesse*.
 XLVIII. L'*Avortement*.
 XLIX. Le *Calcul*.
 L. La *Concrétion*.

LI. Le *Leucome*.

LII. La *Parectamie*.

LIII. La *Pneumatose*.

LIV. L'*Emphraxie*.

LV. Le *Polype*.

LVI. La *Phlegmose*.

LVII. Le *Phlegmon*.

LVIII. La *Phlegmonitie*.

LIX. La *Variole*.

LX. La *Vaccine*.

Gen. XXIV. *PHANTASME*.

Eth. de *phantasma*, fantôme, spectre, vision. Mot adopté pour désigner un genre de maladie qui présente à l'esprit des objets imaginaires ou fantastiques.

LINNÉ s'est servi du mot *phantasma*; mais dans ce nosologiste, cette dénomination, a trop peu d'extension, parce qu'elle n'est synonyme qu'à vision mensongère.

Car. Illusion des sens.

Esp. I. *Berlue*.

Syn. *Berlue*, *suffusio*; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. II. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. II.

Phantasme ; LINNÉ, cl. v, mentales ; ord. 11, imaginaires ; gen. LXXIII. — VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses ; gen. CCLXXXVII.

Pseudoblepsie ; CULLEN, cl. IV, locales ; ord. 1, dysæsthésies ; gen. XCV.

Bibl. J. J. FR. DELIUS, *phantasmata ante oculos volitantia, oculorum adfectus singularis* ; Erlangæ 1751.

I. R. KINKE, *de diplopiâ* ; Gotting. 1774.

Car. On voit des objets qui n'existent pas.

S-esp. I. Myode.

Dans laquelle on voit une tache noire ou une mouche qui vole.

Berlue myodé ; SAUV., *loc. cit.* ; esp. 1.

S-esp. II. Réticulaire.

Dans laquelle on aperçoit des ombres minces et rameuses ; des toiles d'araignée.

Berlue réticulaire ; SAUV., *loc. cit.* ; esp. 2.

S-esp. III. Étincellante.

Dans laquelle on imagine voir des étincelles, des rayons.

Berlue scintillante ; SAUV., *loc. cit.* ; esp. 3.

Marmarige d'HIPPOCRATE.

Hœmalopie ; VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses ;
gen. CCLXXXIX.

S-esp. VI. Colorante.

Dans laquelle on voit les objets autrement
colorés qu'ils ne le sont.

Berlue colorante ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

Esp. II. Bévue.

Syn. Bévue, *diplopia* ; SAUVAGES, cl. VIII,
vésanies ; ord. I, hallucinations ; gen. III. —
CULLEN, cl. IV, locales ; ord. I, dysæsthé-
sies ; gen. XCV, esp. 2, var. D. — SAGAR,
cl. XIII, vésanies ; ord. I, hallucinations ;
gen. III.

Dysopie ; VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses ;
gen. CCXCI.

Car. Les objets que l'on voit existent ; mais
ils sont aperçus avec des changemens quel-
conques.

S-esp. I. Métamorphosique.

Dans laquelle les objets sont vus avec un
changement de figure.

Berlue métamorphosique ; SAUV., *loc. cit.*,
esp. 5.

S-esp. II. Chancelante.

- Dans laquelle on voit les objets chancelans et prêts à tomber ou à être renversés.

Berlue chancelante ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7.

S-esp. III. Diminutive.

Dans laquelle les objets paroissent plus petits.

Berlue diminutive ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6.

S-esp. IV. Multiplicatives.

Dans laquelle les objets paroissent multipliés.

J. P. BUCHNER , *de visione simplici et duplici , ex principiis opticis methodo euclidea deductus* ; Argent. 1753.

S-esp. V. Éloignée.

Dans laquelle les objets éloignés paroissent doubles , mais non ceux qui sont proches.

Bevue d'éloignement ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7.

S-esp. VI. Palpébrale.

Dans laquelle les objets ne paroissent multipliés que par une concrétion irrégulière des targes des paupières.

Bevue anchyloblepharique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

Esp. III. Vertige.

Eth. de vertigo , mouvement circulaire , tournoiement.

2^e *Syn.* Vertige ; JUNCKER, *tab.* XXVII. — SAUVAGES ; cl. VIII, vésanies ; ord. I, hallucinations ; gen. I. — LINNÉ, cl. V, mentales ; ord. II, imaginaires ; gen. LXXIV. — VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses ; gen. CCXCIII. — SAGAR, cl. XIII, vésanies ; ord. I, hallucinations ; gen. I.

Tournoiement de tête.

Bibl. E. A. NICOLAI, *de genesi vertiginis* ; Jenæ 1759.

HERZ, *versuch uber den schwindel*, etc. ; Berlin 1791.

Car. Les objets en repos paroissent se mouvoir et tourner autour de nous.

S-esp. I. Psychique.

Par un effet de l'action mentale ; HERZ, *loc. cit.*, esp. 8.

S-esp. II. Accidentel.

Arrivant après avoir pivoté quelque temps, après avoir regardé en bas d'un lieu élevé, etc. ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

S-esp. III. Traumatique.

Survenant à un coup, une commotion, etc. ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5. -- HERZ, *loc. cit.*, esp. I.

Esp. IV. Bourdonnement.

Syn. Bourdonnement, *syrigmus*; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. 1, hallucinations; gen. IV. — LINNÉ, cl. V, mentales; ord. 11, imaginaires; gen. LXXII. — SAGAR, lcl. XIII, vésanies; ord. 1, hallucinations.

Bourdonnement, *susurrus*; VOGEL, cl. VII, hypercæsthèses; gen. CCXCII.

Car. On entend des sons qui n'ont pas lieu.

Var. A. Sifflement d'oreilles, *sibilus*; SAUV., cl. VIII, ord. 1, gen. IV, esp. 5.

B. Bruissement d'oreilles, *susurrus*; SAUV., cl. VIII, ord. 1, gen. IV, esp. 5. — VOGEL, cl. VII, gen. CCXCII.

C. Coup de marteau, *bombus*; SAUV., cl. VIII, ord. 1, gen. IV, esp. 11.

S-esp. I. Oxiccæique.

Par une trop grande subtilité de l'ouïe.

Bourdonnement oxiccæique; SAUV., loc. cit., esp. 9.

Esp. V. Paracuse.

Eth. de *para*, vicieusement; et *acouo*, j'entends.

Syn. Paracuse ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. I , dysesthésies ; gen. VIII. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. I , dysesthésies ; gen. VIII.

Fausse ouïe.

Car. Les sons qui se font entendre ont lieu , mais avec des circonstances extraordinaires.

S-esp. I. Baricoïque.

Dans laquelle les sons forts ne sont pas entendus.

Paracuse barycoïque ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

Ouïe dure , grave.

S-esp. II. Oxicoïque.

Dans laquelle le plus léger son est fatigant.

Paracuse oxicoïque ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

Ouïe tendre.

S-esp. III. Doublée.

Dans laquelle un seul son est entendu deux fois.

Paracuse doublée ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

S-esp. IV. Bruyante.

Dans laquelle les sons ne peuvent être entendus qu'à la faveur d'un bruit violent fait en même temps.

Paracuse willisienne ; SAUV. ; *loc. cit.* , esp. 4.

S-esp. V. Opposée.

Dans laquelle on entend à droite des paroles proférées à gauche.

Bourdonnement vertigineux; SAUV., cl. VIII, ord. 1, gen. IV, esp. 10.

Esp. VI. Hydrophobie.

Eth. d'ydor, eau; et phobos, crainte.

Syn. Fausse hydrophobie.

Bibl. Alla dissertazione pubblicata col titolo: *de falsa hydrophobia; apologia del doctor FL. INTERLENGHI; Milano 1750.*

A. A. APOTA, *riflessioni critico-mediche, e difesa della dissertazione de falsa hydrophobia; Coira 1750.*

Car. Crainte de tout liquide, sans fureur ni envie de mordre.

Rap. A. Hydrophobie spontanée; SAUV., cl. VIII, ord. 11, gen. XVI, esp. 2. — HOULSTON, *journ. de médéc.*, décembre 1792, tom. XCII, pag. 378.

Hydrophobie spasmodique.

Hydrophobie accidentelle de BADER, voy. l'art. *rage*, gen. XXXIX.

B. Péripneumonie hydrophobique ; SAUV. ; cl. III , ord. III , gen. XXII , esp. 10.

C. Dyssenterie hydrophobique. *Obs.* J'ai rencontré trois cas isolés de dyssenterie dans laquelle il y eut pendant trois jours une aversion très-forte pour toute boisson.

D. Hydrophobie sphacélique (guérie par un sphacèle mortel) ; J. CH. HILDEBRAND, *novæ actæ natur. curios.* , tom. III ; Norimb. 1767 ; art. 8 , pag. 39.

Esp. VII. Antipathie.

Eth. d'*anti* , contre ; et *pathos* , affection.

Syn. Antipathie ; LINNÉ , cl. V , mentales ; ord. III , pathétiques ; gen. LXXXVIII. -- VITET ; cl. V , maladies de l'esprit ; ord. II , vices du jugement ; gen. II.

Bibl. CH. WEIGEL , de *horrore* ; Lips. 1791. Il en traite au moral et au physique.

Car. A la vue de certains objets , on éprouve un sentiment indéfinissable et pénible , souvent avec oppression , aphonie , défaillances , etc.

Formes.

Sor. I. Syncope antipathique ; SAUV. , cl. VI , ord. IV , gen. XXIII , esp. 9.

2. Orthopnée

2. Orthopnée antipathique ; SAUV. , cl. V ,
ord. II , gen. IX , esp. 15.

3. Aphonie antipathique ; SAUV. , cl. VI ,
ord. III , gen. XV , esp. 2.

Esp. VIII. Cochemar.

Syn. Ephialte (d'*ephallōmai*, je saute dessus) ;
SAUVAGES , cl. V , essoufflemens ; ord. I , con-
vulsifs ; gen. I. — LINNÉ , cl. VIII , suppres-
soires ; ord. I , suffocatoires ; gen. CLXIII. —
SAGAR , cl. VIII , essoufflemens ; ord. I , con-
vulsifs , gen. I.

Incube ; JUNCKER , *tab.* LI. — VOGEL , cl.
V , spasmes ; gen. CCXI.

Oneyrodinie ; CULLEN , cl. II , névroses ;
ord. IV , vésanies ; gen. LXVIII.

Bibl. J. BOND , *an essay on the incubus
or nightmare* ; London 1753.

TOURNAY , *de incubo* ; Nancy 1783.

Car. Imagination décevante pendant le som-
meil avec oppression , cris étouffés et terreur
qui se prolonge quelquefois pendant quelque
temps après le réveil.

Rap. A. Oneyrodinie gravative ; CULLEN ,
loc. cit. , esp. II.

B. Rêve (*somnium*), réalité donnée à ce qu'on a vu d'effrayant en songe; VOGEL, cl. IX, gen. CCCXXXIX.

Agrypnie pathématique; SAUV, cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 2.

Panophobie; SAUV., cl. VIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. XII.

Esp. IX. *Somnambulisme*.

Eth. *d'ambulo per somnum*, je me promène pendant le sommeil.

Syn. Somnambulisme; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. VI. — LINNÉ, cl. V, mentales; ord. II, imaginaires; gen. LXXVII. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. I, hallucinations; gen. VI.

Noctambulation; JUNCKER, *tab.* CXXVI.

Hypnobotase; VOGEL, cl. IX, paranoïes; gen. CCCXL.

Bibl. BOHN, *casus ægri noctambulationis morbo laborantis resolutus*; Lips. 1717; et coll. de HALLER, tom. VII, pag. 438.

G. M. PAGANI, *aggiunta alla storia del somnambulo pubblicata del sign. D. G. PIGATI, col racconto della di lui guarigione per mezzo della virtu ellectrica*; Vicenza 1751.

RICHTER, *de statu mixto somni et vigiliæ, quo dormientes multa vigilantium munera obeant*; Gotting. 1756; et *opusc. med.*, vol. 11, *Francof. et Lips.* 1780, pag. 196.

*F. **** Essai sur les probabilités du somnambulisme magnétique, etc.; *Amsterd.* 1785.

Car. Exercice des mouvemens volontaires, avec les apparences du sommeil.

Rap. A. Oneyrodinie active; **CULLEN**, cl. 11, ord. IV, gen. LXVIII, esp. 1.

B. Somnambulisme vulgaire; **SAUV.**, *loc. cit.*, esp. 1.

S-esp. I. Mélancolique.

L'ame n'étant occupée que d'un seul objet.

A. Paraphrosyne hystérique; **SAUV.**, cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 12.

B. Cataleptique (commençant et finissant par un accès de catalepsie); **SAUV.**, *loc. cit.*, esp. 2.

A. Catalepsie délirante; **SAUV.**, cl. VI, ord. V, gen. XXV, esp. 6.

Gen. XXV. PHYSEOSE.

Eth. de physis, physeos, naturel.

Car. Dépravation du caractère par quelque vice ou travers moral.

Esp. I. Orgueil.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. 1 , vices de l'imagination ; gen. XXVII.

Car. Préoccupation de son propre mérite , qui rend plein et bouffi de soi-même ; qui fait que de tout ce qui est au monde l'on n'estime que soi ; et qui rend très-attentif à faire sentir la supériorité que l'on croit avoir sur les autres.

S-esp. I. Hauteur.

Voy. VITET , loc. cit. , esp. 1.

Car. Dédain affecté pour les autres par un sentiment orgueilleux de soi-même.

S-esp. II. Fierté.

Voy. VITET , loc. cit. , esp. II.

Car. Sentiment fondé sur une estime exagérée de soi-même , qui empêche de se familiariser , et qui éloigne des personnes que l'on croit au dessous de soi sous un rapport quelconque.

S-esp. III. Arrogance.

Voy. VITET , loc. cit. , esp. III.

Car. Disposition habituelle à faire sentir aux autres, par des paroles dures et des manières hautaines, la supériorité que l'on croit avoir sur eux.

S-esp. IV. Dédain.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. IV.

Car. Mépris que l'on affecte des autres par le peu de cas que l'on en fait.

Esp. II. Vanité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. 1, vices de l'imagination, gen. XXVIII.

Car. Avidité ridicule d'estime, avec desir d'occuper la pensée de tout le monde, au moyen de certains avantages dont on prétend se faire honneur.

S-esp. I. Prétention.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Efforts continuels pour prévaloir sur les autres, à l'aide de certaines qualités dont on se glorifie.

S-esp. II. Affectation.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. II.

Car. Étalage maniéré de toutes ses qualités, pour capter l'attention ou les égards.

S-esp. III. Coquetterie.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. III.

Car. Dérèglement de l'esprit, dans une femme, fondé sur la vanité et la légèreté, avec desir dominant d'être trouvée aimable, et de passer pour belle; goût excessif pour plusieurs amusemens tout à la fois, et habitude formée de se contenter de plaire.

Caractère tracé par LA NOUE dans la comédie de la *coquette corrigée*.

Esp. III. Vaine-gloire.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXIX.

Car. Habitude dans laquelle on est de se repaître d'une vaine considération, en insistant, en toute occasion, sur des actes de supériorité gratuite.

Caractère présenté par DESTOUCHES dans la comédie du *glorieux*.

S-esp. I. Magnificence.

Le magnifique; VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Étalage minutieux de tout ce qui tient à la grandeur et à la somptuosité pour capriver l'admiration.

Caractère esquissé par LA MOTTE dans l'opéra du *magnifique*.

S-esp. II. Dissipation.

Le dissipateur ; VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. II, vices du jugement ; gen. XXXIII.

Car. Satisfaction habituelle à prodiguer sa fortune avec ostentation et vanité.

Caractère exposé par DESTOUCHES dans la comédie du *dissipateur*.

S-esp. III. L'important.

Voy. VITET, cl. v, ord. VI, gen. XXIX, esp. II.

Car. Caractère toujours occupé à se prévaloir, aux yeux des autres, de la science qu'on a, de la faveur dont on jouit ou de la fortune qu'on possède.

S-esp. IV. Grandomanie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. III.

Car. Imitation ridicule du ton et des ma-

nières des personnes d'un rang plus élevé, avec prétention affectée d'être de la bonne compagnie.

Caractère offert par MOLIERE dans la comédie du *bourgeois gentilhomme*.

S-esp. V. L'avantageux.

Voy. VITET, loc. cit., esp. IV.

Car. Travers ayant pour objet une parade outrée de l'idée qu'on a de soi-même.

S-esp. VI. Fanfaronade.

Le fanfaron; VITET, loc. cit., esp. v.

Car. Parade de bravoure ou des succès réels ou supposés que l'on peut avoir.

Esp. IV. Présomption.

Voy. VITET, cl. I, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. xxx.

Car. Croyance chimérique sur l'article des vertus ou des talents et du pouvoir.

S-esp. I. Pédanterie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. I.

Car. Manie à étaler des connoissances scien-

riques, et une érudition déplacée avec affectation à endoctriner ou à reprendre les autres.

S esp. II. Suffisance.

Voy. VITET, loc. cit., esp. II.

Car. Prévention sur soi-même, avec habitude de le faire sentir avec emphase.

Esp. V. Caprice.

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit; ord. 1, vices de l'imagination; gen. XXXVII.

Car. Inconstance ou changement subit de goût, sans raison et sans cause.

S-esp. I. Bizarrerie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. I.

Car. Habitude de s'écarter du goût commun par une singularité d'objet non convenable.

S-esp. II. Le Fantasque.

Voy. VITET, loc. cit., esp. II.

Car. Caractère que distingue la manie de s'écarter du goût commun par excès de délicatesse ou par une recherche du mieux, faite hors de saison.

Esp. VI. Singularité.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ;
ord. 1 , vices de l'imagination ; gen. XXXVIII.

Car. Habitude de penser et d'agir d'une
manière contraire aux usages et aux sentimens
admis dans la société.

Caractère offert par DESTOUCHES dans la
comédie de *l'homme singulier*.

S-esp. I. L'original.

Voy. VITET , loc. cit. , esp. 1.

Car. Habitude de penser et d'agir d'une façon
nouvelle et particulière.

Esp. VII. Distraction.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ;
ord. 1 , vices de l'imagination ; gen. XL.

Car. Mobilité plus ou moins grande de l'at-
tention , fréquemment détournée de l'objet ex-
térieur à qui on l'a donnée ou à qui on doit
la donner.

Esp. VIII. *Le dissipé.*

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ;
ord. 1 , vices de l'imagination ; gen. XLI.

Car. Caractère que domine une imagination qui ne peut point se fixer, et qui est continuellement entraînée par les objets les plus frivoles.

S-esp. I. Le volage.

Voy. VITET, loc. cit., esp. I.

Car. Caractère que distingue le désir renaissant de former d'autres attachemens avec difficulté de se fixer sur aucun.

S-esp. II. L'évaporé.

Voy. VITET, loc. cit., esp. II.

Car. Caractère que particularise le passage rapide d'une idée à l'autre, avec extrême légèreté dans l'attention; incertitude dans le discours, inconstance dans le regard et vivacité dans les mouvemens.

Esp. IX. Le babillard.

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. XII.

Car. Caractère invinciblement entraîné à beaucoup parler, d'une manière rapide et diffuse sur les objets même les plus frivoles, sans écouter les autres ni leur laisser le temps de répondre.

Caractère développé par M. Boissy dans la comédie du *babillard*.

Esp. X. Frivolité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. II, vices du jugement ; gen. XIII.

Car. Penchant continu et involontaire à traiter légèrement les objets importants pour ne s'occuper que des choses superficielles, avec empressement pour les nouveautés.

Esp. XI. Inconséquence.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. II, vices du jugement ; gen. XIV.

Car. Dépravation du jugement qui fait parler et agir d'une manière contraire aux principes mêmes qu'on a adoptés, et au but qu'on se propose.

Esp. XII. Curiosité.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. II, vices du jugement ; gen. XV.

Car. Disposition habituelle à désirer avec impatience de pénétrer dans les secrets et les affaires d'autrui.

Esp. XIII. Prévention. VI.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ;
ord. II, vices du jugement ; gen. XVI.

Car. Dépravation du jugement, par laquelle on est incapable d'apprécier les sentimens contraires à l'idée que l'on a conçue, et à l'opinion que l'on a embrassée.

S-esp. I. Entêtement.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Jugement déterminé sur un objet, avec impossibilité d'en revenir, fondé sur un esprit trop fortement persuadé et abondant trop en son sens.

S-esp. II. Opiniâfreté.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. II.

Car. Constance mal-entendue, par une volonté revêche, dans un sentiment adopté, avec refus de se rendre à la raison.

S-esp. III. Obstination.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. III.

Car. Volonté de pur caprice et de propos délibéré, sur un point sur lequel on ne revient pas.

S-esp. IV. L'implacable.

Voy. VITET, cl. v, ord. i, gen. XXXIV, esp. v.

Car. Caractère que la fierté ou l'entêtement porte à ne jamais pardonner un mal ou une offense, souvent sans aucun desir de vengeance.

Esp. XIV. Imprudence.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. II, vices du jugement ; gen. XVII.

Car. Disposition habituelle à agir inconsidérément, sans égard à l'importance des choses.

Esp. XV. Le menteur.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. II, vices du jugement ; gen. XVIII.

Car. Caractère toujours porté à donner hardiment des choses fausses pour véritables, avec satisfaction d'avoir réussi à persuader, souvent sans intérêt ni but particulier.

Caractère tracé par CORNEILLE dans la comédie du *menteur*.

S-esp. I. Le fourbe.

Voy. VITET, cl. v, ord. II, gen. XIX, esp. I.

Car. Caractère toujours porté à mentir avec assurance et à se servir de faussetés combinées pour parvenir à un but qui est nuisible aux autres.

S-esp. II. Le charlatan.

Voy. VITET, cl. V, ord. II, gen. XIX, esp. II.

Car. Caractère toujours porté à en imposer avec effronterie par les paroles et par les actions, ordinairement pour son propre intérêt.

Esp. XVI. *Impudence.*

Voy. VITET, cl. II, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. XX.

Car. Hardiesse à commettre sans honte pour soi, ni respect pour les autres, des actions qu'on sait être blâmables.

Esp. XVII. *Effronterie.*

Voy. VITET, cl. II, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement, gen. XXI.

Car. Disposition habituelle à ne rougir de rien et à braver l'infamie.

Esp. XVIII. *Insolence.*

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit;

ord. II, vices du jugement; gen. XXIII.

Car. Disposition habituelle à faire sentir aux autres, d'une manière outrageante, leurs défauts réels ou prétendus.

S-esp. I. Le railleur.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Caractère qui se livre sans cesse au plaisir de tourner en ridicule les paroles et les actions des autres.

Esp. XIX. *L'indépendant.*

Esprit d'indépendance; VITET, cl. V, maladies mentales; ord. II, vices du jugement; gen. XXIV.

Car. Disposition habituelle à ne souffrir aucune loi et à ne suivre que ses propres idées.

S-esp. I. Indocilité.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Disposition habituelle à résister à tout ce que la supériorité légitime exige.

Esp. XX. *Le mécontent.*

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit; ord. II, vices du jugement; gen. XXV.

Car.

Car. Caractère toujours disposé à désapprouver les paroles et les actions des autres.

S-esp. I. Le bourru.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Caractère maussade, toujours disposé par grossièreté des mœurs et défaut d'éducation, à témoigner de la mauvaise humeur même dans les circonstances agréables.

Caractère présenté par GOLDONI dans la comédie du *bourru bienfaisant*. — Par l'auteur de la comédie du *mariage secret*.

S-esp. II. Le grondeur.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. II.

Car. Caractère toujours disposé à réprimander les autres par des paroles dures et brusques, sans examen des actions.

Caractère exposé par PALAPRAT dans la comédie du *grondeur*.

S-esp. III. Le boudeur.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. III.

Car. Caractère toujours disposé à témoigner du mécontentement par un silence obstiné et un air sombre et fâché.

Esp. XXI. Contradiction.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ;
ord. II, vices de l'imagination ; gen. XXVI.

Car. Disposition habituelle à être contraire
aux sentimens, aux desirs ou aux actions des
autres.

S-esp. I. Le chicaneur.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Caractère toujours porté à disputer avec
acharnement sur des prétentions réelles ou ima-
ginaires, et à chercher dans les paroles, les
actions ou les propriétés des autres, des moyens
pour leur élever des difficultés.

Caractère tracé par RACINE dans la comédie
des *plaideurs*.

Esp. XXII. L'intrigant.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ;
ord. II, vices de l'imagination ; gen. XXVII.

Car. Caractère porté sans cesse par son ac-
tivité à s'insinuer dans toutes les affaires, à
les mettre en mouvement, à les faire tourner
à son gré par une multitude de moyens adroits
ou cachés.

Caractère exposé par DUMANIANT dans la comédie des *intrigans*. — Par BEAUMARCHAIS, dans la comédie du *barbier de Séville*, du *mariage de Figaro*, etc.

S-esp. I. Le brouillon.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Caractère toujours porté à s'insinuer dans les affaires des autres pour y faire naître des obstacles, en empêcher le succès et produire des inimitiés ou la discorde.

Esp. XXIII. *Insensibilité.*

Voy. VITET, *cl.* VI, maladies de l'esprit ; *ord.* II, vices de l'imagination ; *gen.* XXVIII.

Car. Disposition habituelle à n'être point affecté du mal d'autrui.

S-esp. I. Dureté.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Disposition habituelle à témoigner son insensibilité par des paroles ou par des actions.

S-esp. II. Cruauté.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. II.

Car. Penchant habituel à commettre, de

sang-froid et sans émotion, les actions les plus inhumaines ; et à goûter du plaisir à faire souffrir ou à être témoin des souffrances des autres.

S-esp. III. Ingratitude.

L'ingrat ; VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. III, vices de la mémoire ; gen. v.

Car. Insensibilité constante pour les bienfaits reçus ; souvent avec aversion pour les bienfaiteurs, desir d'éviter leur présence, et même disposition à leur nuire.

Gen. XXVI. *MENTISME.*

Eth. de *mens*, *mentis*, ame, esprit.

Dénomination proposée et adoptée dans cet ouvrage pour exprimer tout mouvement déréglé de l'action mentale, considérée principalement dans les effets d'une imagination vive et des passions.

Bibl. LE CAMUS, la médecine de l'esprit ; Paris 1753 et 1769.

G. A. LANGGUTH, *de animo, sanitatis præside atque custode optimo* ; Vittenb. 1758.

CH. RICHMANN, *de affectibus animæ, quatenus machinam corpoream in consensum trahunt* ; Jenæ 1768.

PH. HOLLAND , *de mente* ; Edinb. 1782.

CHRICHTON , *an inquiry in to the nature and origin of mental derangement* , etc. ; Lond. 1798.

CABANIS , 1.^o histoire physiologique des sensations , 2.^o rapports entre l'organisation physique de l'homme et ses facultés intellectuelles ; *mém. de l'instit. nation. scienc. mor. et pol.* , tom. 1 , pag. 37 , 98.

Car. Excès des tempéramens dans le rapport de l'imagination et des affections de l'ame.

Esp. I. Mentisme (imaginatif) par trop d'ardeur dans l'imagination.

S-esp. I. Méditabilité.

Bibl. TISSOT , des effets de la forte tension de l'ame et de ceux de l'imagination ; *traité des nerfs* , tom. 11 , part. 1 , pag. 285.

CH. G. LUDWIG , *de contentione studiorum in puerili ætate cavendâ* ; Lipsiæ 1767.

Car. Disposition habituelle de l'imagination à méditer fortement.

Rap. A. Enflure par de fortes méditations ; TISSOT , d'après BORDEU , *loc. cit.* , pag. 288.

B. Syncope par méditation trop forte ; TISSOT , d'après PECHLIN , *loc. cit.* pag. 287.

C. Anorexie mélancolique ; SAUV. , cl. VI , ord. II , gen. XI , esp. 5.

D. Mélancolie mentale ; G. LANDIS , *de melancholiâ ex mente* ; Gotting. 1788.

E. Apoplexie par contention d'esprit ; J. NONNEMANN , *dissert. sistens observationem apoplexiæ ex nimis animi contentionibus ortæ* ; Argentor. 1771.

F. Épilepsie par méditation trop forte ; TISSOT , d'après GALIEN , *loc. cit.* , pag. 288.

G. Convulsion par forte méditation ; TISSOT *ibid.*

H. Colique par méditation trop forte ; TISSOT , d'après VIRIDET , *loc. cit.* , pag. 288.

I. Impotence par forte méditation ; TISSOT , d'après PECHLIN , *loc. cit.* , pag. 287.

K. Anaphrodisie magique ; SAUV. , cl. VI , ord. II , gen. VIII , esp. 3.

L. Diarrhée par méditation trop forte ; TISSOT , d'après PECHLIN , *loc. cit.* , pag. 287.

M. Éphidrose par forte méditation ; TISSOT , *loc. cit.*

S-esp. II. Sensibilité.

Voy. VITET , cl. V , maladies de l'esprit ;

ord. 1, vices de l'imagination ; gen. xxxix.

Car. Susceptibilité d'être vivement affecté de la moindre impression sur les sens.

Var. A. Tendresse.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. I.

Car. Facilité extrême à être ému en faveur d'un ou de plusieurs objets, souvent avec larmes et léger saisissement.

B. Pitié.

Voy. TISSOT, *traité des nerfs*, tom. II, part. I, pag. 386.

Car. Disposition à être affecté de douleur pour éprouver trop vivement la peine des autres.

A. Lipothymie pathématique ; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXII, esp. I.

S-esp. III. Vivacité.

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit ; ord. I, vices de l'imagination ; gen. xxxiii.

Car. Disposition à agir promptement, et exécution rapide.

Var. A. Esprit embrouillé.

Voy. VITET, cl. v, ord. ii, gen. viii.

Car. Aptitude à rassembler avec rapidité sur le même objet, une multitude d'idées obscures, sans pouvoir les préciser.

B. L'homme Bouillant.

Voy. VITET, loc. cit., esp. i.

Car. Caractère ardent et capable des plus grands efforts pour surmonter les difficultés et les obstacles, avec vivacité extrême dans la conception et dans l'action.

C. Brutalité.

Voy. VITET, loc. cit., esp. ii.

Car. Aptitude à manifester vivement son opposition, soit en paroles peu mesurées, soit en actions violentes, et sans aucune considération.

D. Brusquerie.

Voy. VITET, loc. cit., esp. iii.

Car. Disposition naturelle à s'exprimer promptement et laconiquement, avec un ton dur et incivil, sans égard aux personnes.

E. Pétulance.

Voy. VITET, loc. cit., esp. iv.

Car. Habitude d'agir impétueusement sans motif bien réel.

F. Étourderie.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. v.

Car. Disposition habituelle à agir vivement sans réflexion, et ordinairement d'une manière opposée au but que l'on devrait se former.

G. Le téméraire.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. vi.

Car. Caractère toujours porté à affronter des dangers, sans réflexion comme sans motif.

S-esp. IV. Enthousiasme.

Voy. VOGEL, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXXV. — VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. I^{re}, vices de l'imagination; gen. XXXV.

Mélancolie par enthousiasme; SAUV. ; cl. VIII, ord. III, gen. XIX, esp. 13.

Ecplexis, exaltation de l'esprit par un trouble soudain, provenant de cause externe; VOGEL, cl. IX, paranoies; gen. CCCXXXIV.

Car. Véhémence dans la conception, le discours ou l'action sur un ou plusieurs objets, avec desir exalté de propager les sentimens

dont on est préoccupé, et pour lesquels on témoigne de l'admiration.

Var. A. Extase.

Voy. SAUVAGÈS, cl. VI, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXVI. — *VOGEL*, cl. IX, paranoïes; gen. CCCXXXIII. — *SAGAR*, cl. IX, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXVI. — *VITET*, cl. V, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXV, esp. I.

Car. Préoccupation portée au point de suspendre l'action des sens.

A. Extase résolue, sans rigidité des membres; SAUV., loc. cit., esp. 2.

B. Emphase.

Voy. VITET, loc. cit., esp. II.

Car. Représentation très-exagérée des objets, avec discours outrés sur leur compte.

C. Le chimérique.

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXIII.

Car. Caractère porté sans cesse à enfanter des idées ou des projets invraisemblables, et à s'en repaître avec enthousiasme.

D. L'extravagant.

Voy. VITET , cl. v , ord. 1 , gen. xxiii ,
esp. 1.

Car. Caractère dont les idées s'écartent tous
jours de la réalité des objets.

E. Métromanie.

Voy. VITET , cl. v , maladies de l'esprit ;
ord. 1 , vices de l'imagination ; gen. xxxi.

Car. Disposition fouguese à créer des ou-
vrages en vers , à se passionner pour eux , et
à vouloir les faire admirer aux autres.

Caractère tracé par PIRON dans la comédie
de la *métromanie*.

Musolepsie , enthousiasme poétique ; PAW ,
œuvres philosoph. , tom. vi , pag. 123.

F. Mélomanie.

Car. Disposition ardente pour tout ce qui
est mélodie , musique et chant.

Caractère présenté dans la comédie avec
chant de la *mélomanie*.

G. Tarantisme ; SAUVAGES , cl. viii , vésa-
nies ; ord. 11 , morosités ; gen. xv. — LINNÉ ,
cl. v , mentales ; ord. 111 , pathétiques ; gen.

LXXXIV. — SAGAR , cl. XIII , vésanies ; ord. II , morosités ; gen. XV.

Mélancolie dansante ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 8.

Phrénésie par le tarantisme ; SAUV. , cl. III , ord. II ; gen. XI , esp. 14.

Car. Disposition particulière à s'enthousiasmer pour la danse , à la suite d'une prétendue morsure de la *tarentule*.

H. Pythonissisme.

Car. Disposition particulière à se monter l'imagination pour prédire l'avenir , au milieu des contorsions et avec une apparence d'extrême fatigue.

S-esp. V. Fanatisme.

Voy. VITET , cl. V , maladies de l'esprit ; ord. I , vices de l'imagination ; gen. XXXVI.

Car. Ardeur aveugle pour un objet , avec disposition très-forte à tout oser en sa faveur , et souvent avec haine implacable contre ceux qui lui sont contraires.

Caractère tracé par VOLTAIRE dans la tragédie de *Mahomet*.

A. Démonomanie fanatique ; SAUV. , cl. VIII , ord. III , gen. XXI , esp. 5.

B. Démonomanie simulée ou corybantisme ;
SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

C. Manie anarchique ou fanatisme de la
liberté ; RUSH, *medical inquiries*, etc., Phi-
ladelphie 1791, art. 17.

S-esp. VI. Inquiétude.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ;
ord. 1, vices de l'imagination ; gen. XVI.

Car. Etat pénible ou douloureux, souvent
avec insomnie et mouvemens incertains du corps,
par des événemens qui affectent ou que l'on
craint.

Var. A. Souci.

Voy. VITET, *loc. cit.*, esp. 1.

Car. Inquiétude provoquée par l'incertitude
des événemens futurs.

B. Chagrin.

1.^o Par caractère.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. II,
esp. 1.

Car. Mauvaise humeur, ou inquiétude sou-
tenue par mécontentement et tracasseries de
la vie.

2.^o Comme passionnaire éternelle.

Voy. TISSOT, *traité des nerfs*, tom. II, part. I, pag. 373.

Car. Tristesse vive, subite et d'autant plus forte qu'elle est imprévue.

A. Asphyxie pathématique; SAUV, cl. VI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 7.

B. Anesthésie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. X, esp. 4.

C. Aphonie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XV, esp. I.

C. Désolation.

Voy. VITET, cl. V, ord. I, gen. II, esp. III.

Car. Chagrin que donne un événement imprévu avec sanglots et cris inarticulés.

D. Désespoir.

Voy. VITET, cl. V, ord. I, gen. XX.

Car. Désolation avec une sorte de fureur et desir de se nuire.

E. Regret.

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit; ord. III, vices de la mémoire; gen. II.

Car. Inquiétude par le ressouvenir d'une action qu'on se reproche ou d'une jouissance qu'on a perdue.

F. Repentir.

Voy. VITET, cl. v, ord. III, gen. III, esp. I.

Car. Regret que donne intimément la conviction d'une faute vraie ou imaginaire, avec un air triste et quelquefois avec larmes.

G. Remord.

Voy. VITET, *loc. cit.*

Car. Vif regret donné par le ressouvenir de quelque crime réel ou imaginaire, avec un air sombre et taciturnité.

A. Langueur mortelle ; TISSOT, *traité des nerfs*, tom. II, part. I, pag. 384.

B. Mélancolie profonde ; TISSOT, *loc. cit.*

C. Folie causée par le remord ; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 383.

H. Honte.

Voy. VITET, cl. v, ord. III, gen. III, esp. II.

Car. Inquiétude que donne le sentiment d'une chose que l'on croit reprehensible à l'appro-

che de ceux qu'on en suppose instruits , avec rougeur du visage , attitude contrainte , et desir de fuir leur présence.

I. Misanthropie.

Voy. VITET , cl. v , ord. i , gen. iiii , esp. viii.

Car. Inquiétude constante avec une sorte de haine pour les hommes , penchant à s'irriter de leurs imperfections , et desir de les fuir.

K. Mysoginie.

Voy. PAW , *œuvres philosophiques* , tom. vi , pag. 120 , 178.

Car. Misanthropie ayant les femmes pour objet.

S-esp. VII. Méchanceté.

Le méchant ; VITET , cl. v , maladies de l'esprit ; ord. ii , vices du jugement ; gen. xxix.

Car. Caractère faisant son habitude du plaisir de nuire volontairement par discours , actions ou intrigues.

Caractère tracé par GRESSET dans la comédie du *méchant*.

Var. A.

Var. A. Calomnie.

Le calomniateur ; VITET , cl. v , ord. ii ,
gen. XXIX , esp. i.

*Car. Méchanceté portant sur des imputations
fausses.*

B. Médisance.

Le médisant ; VITET , cl. v , ord. ii , gen.
XXIX , esp. ii.

*Car. Méchanceté portant sur des imputations
vraies.*

C. Le satyrique.

*Voy. VITET , cl. v , ord. ii , gen. XXIX ,
esp. iii.*

*Car. Méchanceté ayant pour objet de nuire
avec l'arme du ridicule.*

S-esp. VII. Frayeur.

*Voy. TISSOT , traité des nerfs , tom. ii ,
part. i , pag. 389. — VITET , cl. v , maladies
de l'esprit ; ord. i , vices de l'imagination ;
gen. XVII , esp. v.*

*Car. Secousse vive et passagère de l'imagi-
nation et des sens , à l'aspect d'un danger*

inattendu , ou par l'impression subite d'un objet sur les sens.

Var. A. Épouvante.

Voy. VITET , cl. v , ord. i , gen. xvii , esp. iv.

Car. Forte frayeur avec empressement de fuir.

B. Alarme.

Voy. VITET , cl. v , ord. i , gen. xvii , esp. iii.

Car. Frayeur que donne l'approche d'un péril imprévu , avec cris , incertitude dans le jugement et précipitation des mouvemens du corps.

C. Effroi.

Voy. VITET , cl. v , ord. i , gen. xvii , esp. ii.

Car. Frayeur profonde avec saisissement subit et violent , frissonnement et immobilité passagère des sens.

A. Manie par effroi ; SAUV. , cl. viii , ord. iii , gen. xx , esp. i , var. B.

B. Épilepsie par effroi ; SAUV. , cl. iv , ord. iv , gen. xix , esp. 7.

D. Terreur.

Voy. VITET, cl. v, ord. i, gen. xvii, esp. i.

Car. Frayeur excessive par quelque circonstance extraordinaire.

A. Oubli pathématique ; SAUV., cl. viii, ord. iv, gen. xxi, esp. 5.

B. Bêvue terrorique ; SAUV., cl. viii, ord. i, gen. iii, esp. 9.

C. Amenorrhée terrorique ; W. DE LOOS, *de menstruorum per terrorem obstructorum curâ* ; Utrecht 1767.

Esp. II. *Mentisme* (pathématique) par un effet des passions.

Voy. TISSOT, des effets des passions ; *traité des nerfs*, tom. ii, part. i, pag. 322.

Bibl. G. SCHAW, *de morbis ex animi passionibus orientibus* ; Edinburg. 1735 ; et coll. d'Édimbourg, tom. i, pag. 127.

LALLEMANT, essai sur le mécanisme des passions en général ; Paris 1751.

HOIN, discours sur l'utilité des passions, etc. ; Dijon 1752.

H. P. JUCH, *de animi pathematibus tanquam causis multorum morborum et mortis* ; Erford 1753.

A. HEEMSKERK, *de animi pathematum efficaciam in corpus humanum*; Lugd. Batav. 1754.

A. THOMSON, *de effectibus pathematum in corpus*; Edinb. 1754.

J. CABBELL, *de animi pathematibus quatenus morborum causis*; Edinb. 1755.

G. BAKER, *de affectibus animi et morbis inde oriundis*; Cantabr. 1755.

J. APOSTOLOVICKS, *de modo quo adfectus animi in corpus humanum agunt, generatim*; Halæ 1757.

TH. BAYER, *de animi affectibus*; Viennæ 1759.

C. (PH.) GELBICH DE OSTRICH, *de affectibus animi*; Vindobonæ 1766.

TH. COGAN, *de animi pathematum vi et modo agendi in judicandis et curandis morbis*; 1766.

LE CAT, *traité des sensations et des passions en général, et des sens en particulier*; Paris 1767 et 1768.

D. BRYAN, *de affectibus animi*; Edinb. 1782; et *diss. med.*; Edinb. 1782.

G. MERCER, *de pathematibus animi eorumque in corpus humanum effectibus*; Edinburg. 1784; et *diss. med.*; Edinb. 1784.

A. PETIT, *mémoire sur l'influence que peu-*

vent avoir sur la santé les violentes et subites affections de l'ame; *Lyon*, an VI.

BONNEFOY, mémoire sur les passions de l'ame; *prix de l'acad. de chirurg.*, tom. v, pag. 865.

Rap. A. Délire pathématique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 7.

B. Manie pathématique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 1.

Manie mentale; CULLEN, cl. II, ord. IV, gen. LXVII, esp. 1.

Manie nerveuse; FOUQUET, *quæstiones medicæ duodecim*, etc., 1777, quæst. II.

C. Épilepsie pathématique; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 7.

D. Anaphrodisie magique (effet d'une imagination frappée); SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XIII, esp. 3.

S-esp. I. Joie.

Voy. VITET, cl. V, maladies de l'esprit; ord. I, vices de l'imagination; gen. XXXII.

Car. Démonstration extérieure d'un sentiment agréable et vif, avec contentement et quelquefois transports d'allégresse.

A. Hémoptysie mortelle par une joie imprévue ; TISSOT , *loc. cit.* , pag. 330.

B. Asphyxie pathématique ; SAUV. , cl. VI , ord. IV , gen. XXIV , esp. 7.

C. Tremblement artériel par une joie vive ; TISSOT , *loc. cit.* , pag. 329.

Tremblement pathématique ; SAUV. , cl. IV , ord. III , gen. XIV , esp. 14.

D. Délire causé par une grande joie ; TISSOT , *loc. cit.* , pag. 330.

E. Hémiplegie à la suite d'une joie imprévue ; TISSOT , *loc. cit.* , pag. 330.

F. Distocie pathématique ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXVI , esp. 3.

S-esp. II. Espérance.

Voy. VITET , cl. V , maladies de l'esprit ; ord. I , vices de l'imagination ; gen. XXI.

Car. Joie intérieure par la persuasion intime de voir combler ses desirs.

Var. A. Espérance de gagner à la loterie , amenant le desir des spéculations ; *biblioth. britan.* , *littérat.* , tom. XI , pag. 224.

B. Espérance de gagner au jeu , amenant la passion de jouer.

Passion exprimée par REGNARD dans la comédie du *joueur*. — Par SAURIN dans le drame de *Beverley*. — Par LEBRUN dans le drame de la *joueuse*.

S-esp. III. Amour.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. i, vices de l'imagination ; gen. XXVI.

Bibl. J. DIEZ, *de amore* ; 1771.

De la passion de l'amour, de ses causes et de ses remèdes, etc. ; Paris 1782.

VELTER, *de morbis amatoriis* ; Erlang. 1787.

Car. Sentiment plus ou moins vif en faveur d'un objet à qui l'on accorde une prédilection exclusive.

Var. A. Amour sexuel ou entre personnes du sexe.

Voy. VITET, cl. v, ord. i, gen. XXVI, esp. i.

Amour extrême avec inquiétude, agitation, souvent avec jalousie, insomnie, etc.

A. Hecticie par amour ; effet tracé par HOFFMAN dans la comédie-opéra de *Stratonice*.

B. Mélancolie amoureuse ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XIX, esp. 2.

Érotomanie ; LINNÉ , cl. V , mentales ; ord. III , pathétiques ; gen. LXXXII.

C. Folie par amour ; TISSOT , *loc. cit.* , pag. 339.

Effet exposé par l'auteur de la comédie-opéra de *Nina ou la folle par amour*.

D. Manie par amour ; SAUV. , cl. VIII , ord. III , gen. XX , esp. 1 , var. c. — G. RICHTER , *de mania eroticâ* ; Gotting. 1741 ; et *opusc. medic.* , tom. III , *Francof et Lips.* 1781.

E. Frénésie aphrodisiaque ; SAUV. , cl. III , ord. II , gen. XI , esp. 9.

F. Catalepsie par amour ; TISSOT , *loc. cit.* , pag. 340.

G. Carus pathématique ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXX , esp. 11.

B. Amour de la gloire.

A. Délire causé par l'amour de la gloire ; TISSOT , *loc. cit.* , pag. 341.

C. Amour-propre.

Voy. VITET , cl. V , ord. 1 , gen. XXVI , esp. III.

Car. Satisfaction que donne le contentement de soi-même.

S-esp. IV. Desir.

Voy. TISSOT, traité des nerfs, tom. 11, part. 1, pag. 343.

Car. Attention soutenue sur un objet au sujet duquel on conçoit des craintes ou des espérances.

Var. A. Ambition.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. XXII.

Car. Desir actif et souvent inquiet ; ayant son élévation pour but.

Caractère tracé par DESTOUCHES dans la comédie de *l'ambitieux*.

B. Avarice.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. XXXII.

Car. Desir immodéré d'accumuler des richesses aux dépens de ses propres besoins, avec satisfaction de les posséder, et inquiétude au sujet de leur conservation.

Caractère fortement tracé par MOLIERE dans la comédie de *l'avare*.

C. Sensualité.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. XI.

Car. Desir très-vif, dirigé vers les plaisirs des sens.

D. Gourmandise.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. XI, esp. 11.

Car. Desir avide et excessif de manger le plus souvent sans besoin et avec raffinement.

E. Ivrognerie.

Voy. VITET, cl. v, ord. 1, gen. XI, esp. 11.

Car. Desir violent de boire des liqueurs fermentées, avec soif, dégoût pour les alimens solides, et le plus souvent avec abrutissement.

S-esp. V. Haine.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit; ord. 11, vices du jugement; gen. 11, esp. 11.
— TISSOT, *traité des nerfs*, tom. 11, part. 1, pag. 345.

Car. Desir, prenant sa source dans la passion ou dans le ressentiment, de nuire à quelqu'un, avec disposition à blâmer ses actions et à noircir jusques à ses vertus.

A. Névrose par haine; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 346.

B. Convulsions par haine; TISSOT, loc. cit., pag. 345.

Var. A. Aversion.

Voy. VITET, cl. v, ord. II, gen. II, esp. I.

Car. Sentiment haineux que l'on a pour certains défauts ou pour certaines façons d'agir, avec desir de n'en être pas témoin.

B. Envie.

Voy. VITET, cl. v, ord. I, gen. XXIV.

Car. Sentiment mêlé de haine et de jalousie, inspiré par le bien ou par les avantages dont on voit les autres jouir.

C. Vengeance.

Le vindicatif; VITET, cl. v, ord. I, gen. XXXIV., esp. IV.

Car. Haine durable avec desir de le prouver à ceux qui en sont l'objet.

D. Le ressentiment.

Voy. VITET, cl. v, ord. III, gen. IV.

Car. Souvenir vif et pénible que l'on conserve d'une offense avec haine et desir de s'en venger.

S-esp. VI. Jalousie.

Voy. VITET, cl. v, maladies de l'esprit ;
ord. 1, vices de l'imagination ; gen. xxv.

Car. Forte inquiétude relative à la possession d'un objet aimé, avec aversion pour ceux qui peuvent inspirer quelque crainte.

Var. A. Jalousie par amour.

Voy. VITET, loc. cit., esp. i.

Passion développée par MOLIERE dans la comédie de *l'école des maris*. — Par CAMPISTRON, dans la comédie du *jaloux désabusé*. — Par ROCHON DE CHABANES, dans la comédie du *jaloux*. — Par DEPRIEU, dans la comédie du *jaloux malgré lui*. — Par DESFORGES, dans la comédie de la *femme jalouse*. — Par BARTHE, dans la comédie de la *mère jalouse*.

B. Jalousie par vanité.

Voy. VITET, loc. cit., esp. ii.

Passion exprimée par IMBERT dans la comédie du *jaloux sans amour*.

C. Jalousie par intérêt.

Voy. VITET, loc. cit., esp. iii.

S-esp. VII. Colère.

Le colérique ; VITET, cl. v, maladies de l'esprit ; ord. 1, vices de l'imagination ; gen. XXXIV.

Bibl. J. L. J. DOELLINGER, *de effectibus iræ, medicè consideratæ* ; Wurzburg 1752.

A. E. BUCHNER, *de iræ noxiæ et salutari effectu in corpus humanum* ; Halæ 1757.

A. Dilatation anévrismatique de l'oreille gauche du cœur ; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 357.

B. Rinorrhagie par colère ; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 353.

C. Pneumorrhagie par colère ; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 353.

D. Proctorrhagie par colère ; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 353.

E. Hémorrhagie par les lèvres, par les yeux, par diverses parties du corps en même temps ; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 353, 354.

F. Vomissement par colère ; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 361.

G. Tremblement pathématique ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 14.

H. Bévus par colère; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 367.

I. Manie par colère; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. I, var. B.

K. Apoplexie par colère; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 356-57.

L. Palpitation mortelle; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 367.

M. Toux très-forte par colère; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 354.

N. Asthme mortel par colère; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 354.

O. Oppression cardiaque; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 354.

P. Cholérée mortelle par colère; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 362.

Q. Rage par colère; *berlinische sammlungen*, etc. *ster band*, part. IV, art. 1, pag. 334.

R. Paralysie par colère; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 358.

S. Ischurie mortelle; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 368.

T. Diarrhée par colère; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 361.

U. Fièvre mortelle; TISSOT, *loc. cit.*, pag. 366.

V. Erysipèle par colère ; TISSOT, *loc. cit.*,
pag. 358.

X. Pleurésie par colère ; TISSOT, *loc. cit.*,
pag. 354.

Y. Jaunisse par colère ; TISSOT, *loc. cit.*,
pag. 364.

Var. A. Le violent.

Voy. VITET, cl. v, ord. i, gen. XXXIV,
esp. i.

Car. Aptitude constante à lutter impétueu-
sement contre les obstacles ; avec rougeur du
visage , œil étincelant et menaces.

B. L'emporté.

Voy. VITET, cl. v, ord. i, gen. XXXIV,
esp. ii.

Car. Disposition à s'abandonner par accès
et sans réflexion à des paroles vives et véhé-
mentes, avec éclat de voix et mouvemens très-
prompts du corps , contre ceux qui nous ré-
sistent.

C. L'impatient.

Voy. VITET, cl. v, ord. i, gen. XXXIV,
esp. iii.

Car. Caractère inquiet et toujours disposé

à avoir de l'humeur au plus léger obstacle ,
avec paroles vives et coupées , trépignement
et contraction des différentes parties du visage.

Gen. XXVII. AGRYPNIE.

Eth. d'a , privatif ; et *ypnos* , sommeil.

Syn. Agrypnie ; SAUVAGES , cl. VIII , vé-
sanies ; ord. IV , anormales ; gen. XXII. — SAGAR ,
cl. XIII , vésanies ; ord. IV , anormales ; gen.
XXIV.

Bibl. A. B. HEBENSTREIT , *de morbis ex
pervigilio* ; Lipsiæ 1740.

W. OUDENAARDEN , *de vigilio sano et mor-
boso* ; Lugd.-Batav. 1757.

Car. Privation du sommeil avec fatigue et
épuisement des forces.

Gen. XXVIII. NÉVROSE.

Eth. de *neuron* nerf.

Syn. Névroses ; CULLEN , cl. II. — PINEL ,
cl. IV. — TOURTELLE , cl. IV.

Névroses pyrétiques.

Esp. I. Névrose (pyrétique) avec lésion apparente de la circulation.

Syn. Fièvre nerveuse ; pyrététo-névrise.

Fièvres ataxiques ; SELLE , *pyretol. method.* edit. 3 ; Berol. 1789 ; ord. IIII , pag. 299.
— PINEL , cl. I , pyrexies ; ord. V.

Bibl. R. A. VOGEL , *de febre nervosa , ejusque genuina indole* ; Gotting. 1767.

Car. Lésion de la circulation sanguine , jointe à des symptômes nerveux.

S-esp. I. Lente.

Syn. Typhus 1 et 2 HIPPOCRATIS ; voy. comment. Lips. , tom. XXXII , pag. 629.

Typhos nerveux ; HOME , *clinical experiments histories and dissections* , etc. ; Lond. 1781 ; sect. II.

Bibl. E. G. BALDINGER , *progr. sistens illustrationem malignitatis in morbis ex mente HIPPOCRATIS , per recentiorum irritabilitatem et sensibilitatem* ; Gotting. 1776.

I. G. CARELSON, *de symptomatologia et ætiologia febris lentæ nervosæ*; Gotting. 1782.

M. D. CAMPHELL, *observations on the typhus, etc.*; Lond. 1785.

M. WALL, *clinical observations on the use of opium in low fevers and in the synochus, etc.*; Lond. 1786.

S. HERZ, *observ. de febribus nervosis*; Berol. 1789.

Car. Après un frisson et des horripilations vagues et passagères, on trouve une affection du cerveau avec regard vif, pouls serré et lent, sensibilité plus vive de certains sens, avec insomnie ou sommeil léger et inquiet, anxiétés profondes et tendance à un état général de laxité vibratile.

Var. A. Fièvre du plus mauvais caractère en 1711; MORGAGNI, *de sedib. et caus. morb.*; *epistol.* VII, art. 16.

B. Maladie épidémique de Rouvray-Saint-Denis, en 1779; TEISSIER, *hist. et mém. de la soc. roy. de médec. de Paris*, ann. 1779, pag. 23 des mém.

C. Fièvre nerveuse épidémique à Halle, en

1787 ; J. CH. REIL , *memorabilium clinicorum medico-practicorum* , vol. 1 , fasc. 1 ; Halæ 1790 , sect. 1.

D. Fièvre épidémique d'Oxford , en 1785 ; M. WALLS , *journ. de médec.* , novembre 1791 , tom. LXXXIX , pag. 165. — Et février 1792 , tom. CX , pag. 272.

E. Constitution épidémique de Jena , en 1791 ; PH. I. HARTLAUB , *dissert. medic. sistens descriptionem constitutionis epidemicæ sub fine præteriti anni Jenæ grassatæ* , etc. ; Jena 1792.

Rap. A. Fièvre cérébrale. Voy. M. CHARDEL , observations pour servir à l'histoire de la fièvre cérébrale ; Paris an 8. — GODEFROY , *mémoires de la société médicale d'émulation* , 4.^e année ; Paris an IX , pag. 141.

B. Hectique vespertine (ne formant point une maladie et ne faisant qu'exprimer un effet de l'action nerveuse , sur-tout chez les êtres sensibles) ; SAUV. , cl. II , ord. I , gen. V , esp. 2.

C. Hectique nerveuse ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 13.

D. Quotidienne hystérique ; SAUV. , cl. II , ord. III , gen. IX , esp. 3.

E. Synochus tarentulé ; SAUV., cl. II, ord. I, gen. III, esp. II.

F. Peste sporadique ; SAUV., cl. III, ord. I, gen. I, esp. 4.

G. Oubli fébrique ; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. 8.

S-esp. II. Vive.

Bibl. F. G. BUTTNER, *de febribus nevrosis acutis* ; Gotting. 1786.

Cár. Chaleur plus sensible et pouls plus relevé que dans la fièvre nerveuse lente ; la marche de la maladie est plus rapide.

Rap. A. Fièvre nerveuse aiguë par contagion ; SEILLE, *pyretol*, pag. 309.

B. Fièvre ataxique par contagion ; PINEL, cl. I, ord. V, gen. XII.

§. I I.

Névroses apyrétiques.

Esp. II. *Névrose* (spasmodique) avec lésion manifeste de l'action tonique.

Syn. Spasme, maux de nerfs.

Bibl. RAULIN, traité des affections vaporeuses du sexe ; Paris 1756.

P. HUNAUUD , dissert. sur les vapeurs et sur les pertes de sang ; *Paris* 1756.

BOIRHAAVE , *prælectiones de morbis nervorum* ; *Lugd.-Batav.* 1761.

W. SMITH , *dissertation upon the nerves* ; *Lond.* 1768.

PRESAVIN , nouveau traité des vapeurs , ou traité des maladies des nerfs ; *Lyon* 1770.

La philosophie des vapeurs , etc. ; *Lausanne* 1774.

S. MUSGRAVE , *speculations and conjectures on the qualities of the nerves* ; *Lond.* 1776.

TISSOT , traité des nerfs et de leurs maladies ; *Paris et Lausanne* 1779.

F. H. BRUCKMANN , *de morbis nervorum observationes singulares* ; *Gotting.* 1780.

POMME , traité des affections vaporeuses des deux sexes , ou maladies nerveuses vulgairement appelées *maux de nerfs* ; *Paris* in-4.^o 1782.

BLAUCHÈNE , de l'influence des affections de l'ame sur les maladies nerveuses des femmes , 2.^e édit. ; *Paris* 1783.

SCHÆFFER , *versuche aus der theoretischen arzneykunde* , etc. ; *Nuremb.* 1785.

Esp. I^{re} Spasme.

Bibl. J. JUNCKER, *de spasmis eorumque quadruplici respectu*; Halæ-Magd. 1754.

C. F. KALTSCHMID, *de affectibus spasmodicis vagis*; Jenæ 1754.

H. P. JUCH, *de spasmo in genere*; Erford. 1755.

F. A. CARTHEUSER, *de spasmis in genere*; Francof. ad Viad. 1764.

I. STEVART, *de spasmo*; coll. de WEBSTER, tom. II, 1781, diss. 12, pag. 164.

I. S. KOHLER, *morbi spasmodici aliquot historiæ*; Soraviæ 1778.

Car. Le sentiment et le mouvement sont lésés sans indices de gastronévrie, ni de métronévrie.

Rap. A. PH. A. BOEHMER, *de spasmodorum externorum ratione ad viscera, indeque oriunda morborum complicatione*; Halæ 1762.

B. Spasme dorsal (affection spasmodique des muscles du dos, tendant à se terminer par une éruption); R. WORTHINGTON, *a treatise on the dorsal spasm*, etc.; Lond. 1792.

S-esp. I. Cohibant.

Resserrement par spasme.

*Var. A. Métose (phthisie de la prunelle).
Constriction spasmodique de la prunelle.*

J. F. WEISSENBORN, *de pupillâ nimis coarctatâ vel clausâ* ; Erford 1773.

Amaurose myosique ; SAUV., *el. VI*, *ord. I*, *gen. IV*, *esp. 7*.

B. Intestinal.

Anxiétés abdominales, avec cette circonstance que les excréments, quelques délayans qu'on emploie, représentent des fils passés à la filière et imbibés ou recouverts de matières glaireuses comme d'un vernis.

Voy. LORRY, observ. sur un genre particulier de colique et de constipation ; *hist. et mém. de la soc. roy. de méd.*, ann. 1777-78, pag. 193 de l'hist.

C. Rétrécissement du rectum ; E. DERRE-CAGAIX, *journ. de chirurg.*, tom. I, pag. 268 ; et *journ. de méd.*, tom. XC, pag. 49.

Faits d'anatomie pathologique.

Rétrécissement considérable de l'aorte pectorale ; *journ. de chirurg.*, tom. II, pag. 107 ; et *journ. de médec.*, tom. XCI, pag. 170.

Constipation constrictive ; EHRHARD, *noya*

acta natur. curios., tom. VIII ; Nuremb. 1791 ,
art. 40.

S-esp. II. Flatueux.

Spasme avec production prédominante de flatuosités.

Maladie flatulente , *morbus ructuosus* d'HIPPOCRATE.

A. O. GOELICKE , *de morbo ructuoso HIPPOCRATIS* ; *Francof ad Viad.* 1738 ; et BALDINGER , *select. doct. viror. opusc.* ; Gotting. 1782 , diss. V , pag. 142.

Voy. G. L. MARUGI , *le malatie flatueuse* ; *in Napoli* , tom. I , 1786 ; tom. II , 1787.

Nota bene. La maladie flatueuse existe si souvent sans apparence de flatulence , *Gen.* XVII , *Esp.* II , *S-esp.* V , ou de gastronévrie , *Gen.* XXVIII , *Esp.* III , qu'on n'a pu se refuser d'en faire une sous-espèce de spasme.

Formes.

Sor. 1. Sciatique nerveuse ; COTUGNO , *de ischiade nervosâ commentarius* ; *Viennæ* 1770.

— J. PETRINI , *de ischiade nervosâ* ; 1785.

2. Lypothimie stomachique ; SAUV. , cl. VI , ord. IV , gen. XXII , esp. 2.

A. Syncope stomachique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 113.

3. Amblyopie méridienne (les objets n'étant bien aperçus que dans l'obscurité ou pendant la nuit); SAUV., cl. VI, ord. I, gen. III, esp. 2. — Nyctalopie d'HIPPOCRATE. — SAILLANT, mémoire sur l'espèce de nyctalopie ou vue de nuit, dont parle HIPPOCRATE; *hist. de la soc. roy. de méd.*, ann. 1786, tom. VIII, pag. 121. — Dysopie luminique; CULLEN, cl. IV, ord. I, gen. XCIV, esp. 2.

A. Strabisme équinoxial; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. I, esp. 10.

4. Anorexie mélancolique; SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XI, esp. 5.

5. Nausée marine; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XII, esp. 12.

6. Vomissement marin; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. 25. — B. LUDWIG, *de vomitu navigantium*; Lips. 1738.

Vomissement hémorragique; SAUV.; cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. 28.

Vomissement sympathique; P. C. ABILGAARD, *societ. med. haun. collect.*, vol. I, Hauniæ 1774, art. 22, pag. 176 (effet de la ligature d'un sarcome au front).

7. Ivresse convulsive ; PERCY , *journ. de médéc.* , août 1792 , tom. XCI , pag. 349 ; et août 1793 , tom. XCIV , pag. 366.

8. Tremblement cafétique ; SAUV. , cl. IV , ord. III , gen. XIV , esp. 4.

9. Bévée spasmodique ; SAUV. , cl. VIII , ord. I , gen. III , esp. 2.

10. Anxiétés ; B. HAMBERGER , *de anxietatibus* ; Jenæ 1750.

11. Catalépsie vermineuse ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXV , esp. 2.

12. Carus nystagmique ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXX , esp. 17.

13. Épilepsie sympathique ; SAUV. , cl. IV , ord. III , gen. XIX , esp. 8.

14. DE BERGEN , *de morbo spasmodico convulsivo contagii experte* ; Franc. ad Viad. 1742.

15. Asthme spasmodique ; B. RUSH , *a dissertation on the spasmodic asthma* , etc. ; Lond. 1770. — TH. RYAN , *de asthmate spasmodico*

Lond. 1784 ; et *diss. med.* ; Edinb. 1784 , art. 13. — J. MILLAR , *de asthmate spasmodico* ;

coll. de WEBSTER , tom. II , 1781 , diss. 9 , pag. 124.

16. Hypocondrie phthisique ; SAUV. , cl. VIII , ord. I , gen. V , esp. 6.

Phthisie nerveuse ; PH. F. W. SEIP , *de phthisi nervosa* ; Gotting. 1773.

17. Dysphagie spasmodique; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 1.

A. Dysphagie nauséuse; SAUV., *loc. cit.*, esp. 9.

18. Pleurodynie spasmodique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. XI, esp. 9.

19. Amaurose spasmodique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 8.

20. Aphonie spasmodique; C. SMYTH, *medical communications*, etc., vol. II; Lond. 1790, art. XXXIII.

21. Mutité spasmodique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XIV, esp. 6.

22. Dyshæmorrhée spasmodique; BUXTORF, *acta helvetica*, vol. VII; Basil. 1772, art. II, pag. 90.

23. Ischurie néphrospastique; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIX, esp. 5.

A. Ischurie cystospastique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 20.

24. Diarrhée hypercathartique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 16.

25. Diabète insipide; CULLEN, cl. II, ord. III, sect. III, gen. LXII, esp. 2.

A. Diabète légitime; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXV, esp. 1.

Diurèse; VOGEL, cl. II, flux; ord. II, apocénoses; gen. CXIV.

26. Tumeur par absorption ; SOEMMERING ,
de morbis vasorum absorbentium ; Francfort-
 sur-le Mein , 1795.

27. Tympanite spasmodique ; SAUV. , cl. X ,
 ord. III , gen. XVII , esp. 5.

28. Dyssenterie cathartique ; SAUV. ; cl. IX ,
 ord. II , gen. X , esp. 12.

29. Jaunisse accidentelle ; SAUV. , cl. X ,
 ord. VI , gen. XXXII , esp. 2.

30. Ictère spasmodique des enfans ; G. F.
 H. BRUNING , *de ictero spasmodico infantum*
essendiæ anno 1772 epidemico ; Vesal. et Lips.
 1773.

31. Gangrène sèche avec douleur gravative ,
 devenant brûlante avec amaigrissement , des-
 sèchement et noirceur.

Mortification des orteils et des pieds ; PER-
 CIVAL POTT , *chirurgical observations relative*
to the cataract, the polypus of the nose, the
cancer of the scrotum ; the different kinds of
rupture the mortification of the toes and feet ;
 Lond. 1775.

Rhumatisme convulsif ; SAUV. , cl. VII , ord.
 I , gen. III , esp. 15.

Esp. IV. Névrose (hypocondrique)
 avec lésion apparente des organes appar-
 tenant aux hypocondres.

Syn. Hypochondrie , maladie hypocondriaque ; et mieux sans doute *gastronévrie* , de *gaster* , ventre , estomac ; et *neuron* , nerf.

Hypocondrie (*hypocondriasis*) ; SAUVAGES , cl. VIII , vésanies ; ord. 1 , hallucinations ; gen. V. — LINNÉ , cl. V , mentales ; ord. 11 , imaginaires ; gen. LXXVI. — VOGEL , cl. V , gen. CCXVIII. — CULLEN , cl. 11 , névroses ; ord. 11 , adynamies ; gen. XLVI — SAGAR , cl. XIII , vésanies ; ord. 1 , hallucinations ; gen. V. — PINEL , cl. IV , névroses ; ord. 1 , vésanies ; gen. XLV.

Maladie hypocondriaque ; JUNCKER , *tab.* XXXVII.

Névrose avec affection dominante des nerfs de l'estomac ; LAROCHE.

Bibl. STAHL , de *malo hypocondriaco et hysterico* ; Halæ 1703.

RICHTER , de *morbo hypocondriaco* ; Gotting. 1739 ; et *opusc. medic.* , tom. 1 , pag. 28.

F. CH. STRUVE , de *acido hypocondriacorum* ; Kilicæ 1750.

I. F. CARTHEUSER , de *passione hypocondriacâ* ; Francof. ad Viad. 1751.

A. DE HALLER, *de malo hypocondriaco*; Gotting. 1752.

M. ALBERTI, *de morbis imaginariis hypocondriacorum*; Halæ-Magdeb. 1755.

G. B. FABER, *ulterior expositio novæ methodi kœempfianæ curandi morbos chronicos inveteratos, præcipue malum hypocondriacum*; Tubingæ 1755 (a).

I. CH. STOCK, *de affectu hypocondriaco*; Jenæ 1755.

G. B. MORETTI, *del mal de nervi, o sia dell ipochondria, o del morbo isterico*; poema medico del doct. M. FLEMING; Romæ 1756.

H. F. DELIUS, *nonnulla ad malum hypocondriacum spectantia*; Erlang. 1757.

A. FRACASSINI, *opusc. pathol. alterum de febris, alterum de malo hypocondriaco*; Gryphiswaldiæ 1757.

J. F. RUBEL, *die mittel, wie denen hypo-*

(a) Quelques ouvrages ont été publiés sur la même matière, sans porter un titre aussi significatif. Voyez J. KAEMPF, *de infarctibus vasorum ventriculi*; Basileæ 1751. — D. E. KOCH, *de infarctibus vasorum in infimo ventre*; Argent. 1752. — I. G. SCHMID, *de concretis uteri*; Basileæ 1753. — G. F. SIGWART, *de infarctibus venarum abdominalium internarum, eorumque resolutione per enemata potissimum instituenda*; Tubing. 1754.

chondriacis , melancholicis , maniacis , etc. ;
Breslau 1758.

S. A. PONTICELLI *di tre specie d'affezione*
isterica e ipochondriaca , etc. ; in Lucca 1759.

G. E. ZEVIANI, *trattato del flato a favore*
degli ipocondriaci ; in Verona 1761.

P. S. GARBOE, *dissert. sistens experimenta*
quædam circa malum hypocondriacum ; Halæ
1762.

J. HILL, *hypocondriasis ; or a practical*
treatise , etc. ; Lond. 1766.

E. A. BUCHNER, *de vero ortu mali hypo-*
condriaci, et hysterici ; Halæ ad Salam 1769.

GATTENHOFF, *hypocondriasis ; Heidelberg*
1769 ; et coll. de FRANCK , tom. 1 , pag. 1.

A. HAY, *de affectionibus hystericiis et hypo-*
condriacis ; 1765.

F. G. KRAEXFAENGER, *de mali hypocon-*
driaci ad minimum sextuplici specie ; Duisburg
ad Rhen. 1771.

H. C. BRODKORB, *de affectione hypocon-*
driacâ ac hysteriâ ; Erford 1772.

OEHME, *über die hypochondrie ; Dresden*
1777.

S. BAYNES, *de hypocondriasi ; Edinburg.*
1777 ; et coll. de WEBSTER , tom. 11 , 1781 ,
diss. 2 , pag. 17.

A. COMPARETTI, *occursus medici, de vagâ ægritudine infirmitatis nervorum; Venetiis 1780.*

REVEILLON, recherches sur la cause des affections hypocondriaques, appelées communément *vapeurs*, etc.; *Paris 1779*; en allemand, *Gotha 1781.*

STOLL, *de morbo hypocondriaco; dissert. medic. edente EYEREL, tom. II, 1782, pag. 394.*

J. KÆMPF, etc., *fur aerzte und kranke bestimmte abhandlung von einer newers methode die harnaeckigsten krankheiten, die ihren sitz im unterleibe haben, besonders die hypochondrie, etc.; Frankfort 1784*; en hollandais, 1787.

J. RYMER, *a tract upon the indigestion and the hypochondriæ disease; London 1786.*

Car. Flatuosités incommodes donnant lieu à des rots, des vents, à des tensions spasmodiques dans diverses parties de l'abdomen, et manifestant le trouble qui domine dans les fonctions de la digestion; avec trouble fugace dans les idées, et disposition constante à la tristesse, à la crainte.

Rap. A. Hypochondrie mélancolique ; SAUV. ;
loc. cit. , esp. 3.

B. Hypochondrie bilieuse ; SAUV. *loc. cit.* esp. 1.

Voyez D. G. H. HOPP , nouvelle méthode
 d'expliquer les symptômes des hypocondria-
 ques ; *hamburgische magazin* , etc. ; *achter*
band (vol. VIII) ; *Hamburg.* 1751 , pag. 604.
 — vol. XI , pag. 339. — *vier zehnter band* (vol.
 XIV) , pag. 480.

Formes.

Sor. 1. Froid hypocondriaque ; SAUV. , cl.
 VIII , ord. 1 , gen. V , esp. 10.

2. Vomissement hypocondriaque ; SAUV. , cl.
 IX , ord. II , gen. XIII , esp. 9.

3. Flatulence hypocondriaque ; SAUV. , cl.
 IX , ord. IV , gen. XXXIV , esp. 3.

A. Flatulence convulsive ; SAUV. , *loc. cit.* ,
 esp. 7.

4. Vertige hypocondriaque ; HERZ , *loc. cit.* ,
 esp. 7.

5. Cochemar hypocondriaque ; SAUV. , cl.
 V , ord. 1 , gen. 1 , esp. 6.

6. Contracture hypocondriaque ; SAUV. ,
 cl. IV , ord. 1 , gen. IV , esp. 1.

7. Carus hypocondriaque ; SAUV. , cl. VI ,
 ord. V , gen. XXX , esp. 13.

8. Asthme hypocondriaque ; SAUV. , cl. v , ord. ii , gen. viii , esp. 4. — F. L. WOLF , *de asthmate hypocondriaco* ; Argentor. 1754.

9. Phthisie hypocondriaque ; SAUV. , cl. x , ord. i , gen. iiii , esp. 16.

10. Gastrodynie hypocondriaque ; SAUV. , cl. vii , ord. iv , gen. xxi , esp. 16.

11. Constipation hypocondriaque ; CULLEN , cl. iv , ord. v , gen. cxxiii , esp. 2.

12. Diarrhée hypocondriaque ; J. J. SENGGER , *de diarrhœa hypocondriacâ* ; Erford 1752.

13. Salivation hypocondriaque ; SAUV. , cl. ix , ord. iiii , gen. xxiii , esp. 8.

Esp. IV. (a) Névrose (métrique) avec lésion sensible de l'action de la matrice.

Syn. Hystérie , affection hystérique ; et mieux sans doute *métronévrie* , de *metra* , matrice , et *neuron* , nerf.

Hystérie , *hysteria* ; SAUVAGES , cl. iv , spasmes ; ord. iv , cloniques généraux ; gen. xx.

(a) Par une erreur typographique on a mis , pag. 324 lig. 19 , *Esp. II* , désignation qui ne doit pas subsister ; pag. 326 lig. 1 , *Esp. III* , il faut *Esp. II* ; pag. 332 lig. 25 , *Esp. IV* , il faut *Esp. III*. Le lecteur est invité à faire ces errata.

— LINNÉ, cl. VII, motoires ; ord. I, spas-
tiques ; gen. CXXVI. — VOGEL, cl. V, spas-
mes ; gen. CCXIX. — CULLEN, cl. II, névroses ;
ord. III, spasmes ; gen. LXIII. — SAGAR, cl.
VII ; spasmes ; ord. IV, cloniques généraux ;
gen. XXI. — PINEL, cl. IV, névroses ; ord.
I, vésanies ; gen. XLVIII.

Mal hystérique ; JUNCKER, *tab.* XXXVII.

Névrose avec affection dominante des or-
ganes de la génération ; LAROCHE.

Maladies nerveuses hystériques ; BEAUCHÈNE,
esp. 2.

Suffocation de matrice, hystérique.

Fureur utérine de quelques-uns.

Mal de mère du peuple.

Bibl. RICHTER, *de malo hysterico* ; *Göt-
ting.* 1741 ; et *opusc. medic.*, tom. I, pag. 94.

P. S. DE CHAUFÉPIÉ, *de malo hysterico* ;
Lugd-Batav. 1752.

J. JUNCKER, *de commodis ambiguë ex ma-
trimonio hystericarum* ; *Halæ-Magdeb.* 1755.

CH. PERRY, *a mechanical account and ex-
plication of the hysteric passion, etc.* ; *Lond.*
1755.

A. UVEN, *de mali hysterici symptomatum
diversitate ob regionum et vitæ regiminis di-*

versitatem, habita præsertim ratione ad hystericas in frisia orientali; Halæ 1762.

J. W. BAUMER, *de mali hysterici verâ indole et curatione; Erfordiæ 1763.*

C. RICHARDSON, *de malo hysterico; Edinb. 1763.*

F. MITTERBACHER, *de secretione urinæ fæminarum hystericarum, et de eâ ut signo affectionum hystericarum; Pragæ 1764.*

L. VAN STEVENINCK, *de hystericâ passione; Lugd.-Bat. 1766.*

PH. B. BOEHMER, *de causis cur malum hystericum morbum malo hypocondriaco majorem constituat? Halæ 1772.*

J. LANG, *de passione hystericâ; Vind. 1776.*

H. WOOLCOMBE, *de hysteriâ; Edinb. 1777; et coll. de WEBSTER, tom. 11, 1781, art. 8, pag. 109.*

E. W. L. MEURS, *de differentiâ passionis hystericæ à morbis convulsivis relinquis; Duisburgæ 1780.*

STOLL, *morbus hystericus; diss. med., tom. 11, 1782, pag. 38.*

R. GROAT, *de hysteriâ; Edinb. 1783; et dissert. medic.; Edinb., ann. 1783.*

Car. Gonflement et murmures du ventre

avec le sentiment d'un globe qui roule et monte de l'hypogastre dans l'estomac et au gosier, où il produit un étranglement; avec assoupissement par intervalles, quelquefois convulsion ou délire fugace; urines abondantes et limpides.

S-esp. I. Flatulente; W. ROWLEY, a treatise on female, nervous, hysterical, hypochondriacal, etc.; Lond. 1789; en allemand par MICHAELIS; Breslaw 1790.

S-esp. II. Convulsivé; W. ROWLEY, loc. cit.

S-esp. III. Stertoreuse; W. ROWLEY, loc. cit.

Formes.

Sor. 1. Sciatique hystérique; SAUV., cl. VII, ord. v, gen. XXXI, esp. 3.

2. Édématie hystérique; SAUV., cl. X, ord. II, gen. VIII, esp. 2.

3. Anasarque hystérique; SAUV., cl. X, ord. II, gen. VII, esp. 6.

4. Syncope hystérique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 6.

5. Asphyxie hystérique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 8.

6. Vertige hystérique ; SAUV., cl. VIII, ord. I, esp. 3.

7. Agrypnie hystérique ; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 3.

8. Hypochondrie hystérique ; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. V, esp. 5.

9. Délire hystérique ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVII, esp. 12. — A. NUNN, *de delirio hysterico* ; Erfordiae 1762.

10. Hystérie libidineuse ; SAUV., cl. VIII, ord. II, gen. XIV, esp. 6.

11. Tétane hystérique (vraie épilepsie avec convulsion tonique) ; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. 12.

12. Catalepsie hystérique ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXV, esp. 1.

13. Carus hystérique ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXX, esp. 9.

14. Apoplexie hystérique ; SAUV., cl. VI, ord. V, gen. XXXI, esp. 4.

15. Épilepsie utérine ; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 4. — BUSCH, *neues magazin für aerzte*, etc. ; zehnter band (vol. X) ; Leips. 1788, pag. 566.

16. Palpitation hystérique ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XV, esp. 12.

17. Toux hystérique; SAUV., cl. V, ord. I, gen. V, esp. 2.
18. Asthme hystérique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. VIII, esp. 3.
19. Orthopnée hystérique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. IX, esp. 4.
20. Céphalalgie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XI, esp. 12.
- A. Migraine clou; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIII, esp. 6.
21. Odontalgie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XVI, esp. 8.
22. Dysphagie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XVII, esp. 2.
23. Pleurodynie (thoraxialgie) hystérique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. XI, esp. 6.
24. Gastrodynie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 14.
- A. Gastrodynie pulsatile; SAUV., loc. cit., esp. 13.
25. Colique hystérique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 17. — F. A. NEUHAUS, *diss. sistens colicæ hystericæ casum cum suâ epicrisi*; Argentor. 1769.
26. Néphralgie hystérique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXV, esp. 5.

27. Dysurie hystérique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXVII, esp. 1.
28. Hystéralgie vaporeuse; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXVII, esp. 10.
29. Amaurose hystérique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 15.
30. Aphonie hystérique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XV, esp. 7.
31. Constipation hystérique; AASKOW, *soc. med. Haun. collect.*, vol. II; *Hauniæ* 1775, art. 2, pag. 9.
32. Larmoyement pathématique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXI, esp. 1.
33. Diabète hystérique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXV, esp. 3.
34. Météorisme hystérique; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XVIII, esp. 3.
35. Pneumatose hystérique; SAUV., cl. X, ord. II, gen. VI, esp. 3.
36. Rhumatisme hystérique; SAUV., cl. VII, ord. I, gen. III, esp. 7.
37. Jaunisse hystérique; SAUV., cl. X, ord. VI, gen. XXXII, esp. 13.
- Gen. XXIX. PARAPHRYNIE.**
- Êth.* de *para*, proche; et *phrin*, esprit.
- Syn.* Vésanies; SAUVAGES, cl. VIII. — CUL-

LEN, cl. II, névroses; ord. IV. — SAGAR, cl. XIII, vésanies.

Car. Aliénation totale de l'esprit; folie.

Esp. I. *Délire.*

Eth. du verbe latin *deliro*, je rêve, j'extra-vague; provenant lui-même de *lira*, un sillon. Ainsi *délire* signifie, au propre, *s'écarter du sillon*; et au figuré, *du droit chemin de la raison*.

Syn. Délire, paraphrosyne; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XVII. — LINNÉ, cl. V, mentales; ord. 1, idéales; gen. LXVI. — VOGEL, cl. IX, paranoïes; gen. CCCXXX. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. III, délires; gen. XVIII.

-Transport au cerveau.

Bibl. J. JUNCKER, *de chronicis deliriis legitime curandis*; Halæ-Magdeb. 1754.

E. A. NICOLAI, *dem rasen und phantasiren*; Copenhagen 1758.

J. N. PEZOLD, *de delirio febrili*; Lips. 1762.

E. A. NICOLAI, *de deliriis*; Jenæ 1763.

P. STEVEN, *de deliriis*; Götting. 1782.

Car. Folie active avec fièvre.

S-esp. I. Délire doux , tranquille.

S-esp. II. Délire fort , agité.

Frénésie ; P. LUTRAND , considérations médicales sur la frénésie ; *Montpellier* , an x.

Esp. II. Manie.

Eth. Mania , de *mainomai* , je suis en fureur , je suis fou.

Syn. Manie ; SAUVAGES , cl. VIII , vésanies ; ord. III , délires ; gen. XX. — LINNÉ , cl. V , mentales ; ord. I , idéales ; gen. LXVIII. — VOGEL , cl. IX , paranoïes ; gen. CCCXXXI. — CULLEN , cl. II , névroses ; ord. IV , vésanies ; gen. LXVII. — SAGAR , cl. XIII , vésanies ; ord. III , délires ; gen. XXII. — PINEL , cl. IV , névroses ; ord. I , vésanies ; gen. XLVII.

Bibl. J. BENEDEK , *de mania et statu maniacorum in paroxismo constitutorum* ; *Traj. ad Rhen.* 1762.

M. LOCHER , *observ. pract. circa luem veneream , epilepsiam et maniam* ; *Brux.* 1764.

D. STUART , *de mania* ; *Edinb.* ; et coll. de WEBSTER , tom. II , 1781 , pag. 255.

TH. ARNOLD , *observations on the nature , kinds , causes and prevention of insanity* , etc. ; *Lond.* 1782-86.

PARGETER, *observations on maniacal disorders*, etc. ; Lond. 1792.

PINEL, mémoire sur la manie périodique ou intermittente ; Paris, an VI-1798.

— Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie ; Paris, an VIII.

Car. Folie avec fureur sans fièvre.

S-esp. I. Manie (*vulgaire*), que n'a précédé, ni aucune affection de l'âme, ni aucun vice-sensible du corps ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 70.

A. Manie obscure ; CULLEN, cl. II, ord. IV, gen. LXVIII, esp. 2.

S-esp. II. Manie (*périodique*) quelquefois soumise à des apparences d'influence solaire ou lunaire ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

Paraphrosyne ; LINNÉ, cl. V, ord. I, gen. LXVI.

A. Manie humorale ; FOUQUET, *quest. med. duodecim pro regia cathedra vacante*, etc., thes. XI.

Gen. XXX. SALACISME.

Eth. de *salacitas*, substantif latin qui veut dire *penchant aux plaisirs vénériens*.

Syn. Satyriase ; LINNÉ , cl. v , mentales ;
ord. III , pathétiques ; gen. 81.

Manie ; VOGEL , cl. IX , paranoïes ; gen.
CCCXXXI.

Car. Penchant insurmontable pour les plaisirs de l'amour physique , qu'on cherche à remplir sans honte et avec la plus vive ardeur.

Esp. I. Masculin.

Syn. Satyriase , *satyriasis* ; SAUVAGES , cl. VIII , vésanies ; ord. II , morosités ; gen. XIII.

— CULLEN , cl. IV , locales ; ord. II , dysorexies ; sect. I , appétits erronés ; gen. CIV.

— SAGAR , cl. XIII , vésanies ; ord. II , morosités ; gen. XIII.

Car. Salacisme dans les hommes.

S-esp. I. Satyriase (des jeunes-gens) avec desir immodéré pour les plaisirs de l'amour , et un léger trouble du corps ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. I.

Satyriase néogamique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

S-esp. II. Satyriase (furieux) avec un desir effréné pour le coït , auquel se joint

un grand trouble du corps ; CULLEN, *loc. cit.*, esp. 2.

Satyriase aigu ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

Esp. II. Féminin.

Syn. Métromanie.

Nymphomanie ; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies ; ord. III, morosités ; gen. XIV. — CULLEN, cl. IV, locales ; ord. II, dysorexies ; sect. I, appétits erronés ; gen. CV. — SAGAR, cl. XIII, ord. II, morosités ; gen. XIV.

Tentigo des latins.

Mélancolie utérine de NENTER.

Hystéromanie de BOECLER.

Métromanie d'ASTRUC.

Fureur utérine.

Bibl. D. T. DE BIENVILLE, la nymphomanie ou traité de la fureur utérine ; *Amsterdam* 1771 ; en allemand 1772 ; en anglais 1775.

Car. Salacisme dans les personnes du sexe.

Var. A. Nymphomanie salacitique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

B. Nymphomanie furibonde ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

S-esp. I. Métromanie (douloureuse) avec douleur dans l'acte irrésistible du coït.

Nymphomanie douloureuse ; SAUV., loc. cit., esp. 3.

Hystéralgie prurigineuse ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXVII, esp. 7.

Gen. XXXI. TONISME.

Eth. de tonus, ton ; indiquant des maladies par excès et permanence de l'action tonique.

Car. Le corps est affecté dans une ou plusieurs de ses parties d'une rigidité constante et excessive.

§. I.^{er} Général.

Esp. I. Tétane.

Eth. de tetanos, convulsion droite et roide.

Syn. Tetanos ; SAUVAGES, cl. IV, spasmes ; ord. II, toniques généraux ; gen. VII. — LINNÉ, cl. VII, motoires ; ord. I, spastiques ; gen. CXXVII. — VOGEL, cl. V, spasmes ; gen. CLXXX. — CULLEN, cl. II, névroses ; ord. III, spasmes ; sect. I, dans les fonctions animales ; gen. XLVIII. — SAGAR, cl. VII,

spasmes; ord. II, toniques généraux; gen. VII. — PINEL, cl. IV, névroses; ord. II, spasmes; gen. VII.

Bibl. J. G. KRUGER, de *opisthotono*, *emprosthoto* et *tetano*; *Helmstad* 1754.

L. CHALMERS, mémoire sur l'*opisthotone* et le *tétane*; *medical observations and inquiries*; etc.; tom. I; *Lond.* 1758, art. 12, pag. 87.

CH. L. BILFINGER, de *tetano liber singularis*, etc.; *Lindavia* 1763.

J. G. BAUMER, de *tetano*; *Giess.* 1775.

BAJON, mémoire sur le *tétanos*; *mém. sur Cayenne et sur la Guyane française*; *Paris* 1777.

J. C. STARKE, de *tetano ejusque speciebus* etc.; *Jenæ* 1778.

G. MUNRO, de *tetano*; *Edinb.* 1783; coll. d'*Edimbourg*, tom. IV, pag. 324. — *Dissert. med. Edimburg.* 1783.

Dissertation et observations sur le *tétanos*, publiées par le cercle des *Philadelphes*; au *Cap français* 1786.

DAZILLE, observations sur le *tétanos*, ses différences, ses causes, ses symptômes, etc.; *Paris* 1788.

CURRIE, *memoirs of the medical society of London*, etc. ; Lond. 1792, art. 12.

N. HEURTELOUP, précis sur le tétanos des adultes ; Paris, an v.

Car. Rigidité spasmodique de tous les muscles, ou d'un très-grand nombre de muscles à la fois.

Rap. A. Tétane indien ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

B. Convulsion indienne ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIII, esp. 9.

C. Tétane ; BAJON, *loc. cit.*, esp. I.

Var. A. Holotonique ; occupant tout le corps ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

Tétane tonique ; SAUV., *ibid*, esp. 1.

B. Opisthotonique, renversant le corps en arrière ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

Opisthotone ; VOGEL, cl. v, gen. CLXXXI.

C. Emprosthotonique, pliant le corps en avant ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

Episthotone ; VOGEL, cl. v, gen. CLXXXII.

— J. G. BAUMER, *de emprosthotono* ; Giessæ 1776.

D. Tetane latéral ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

S-esp. I.

S-esp. I. Pyrétique.

La marche de la maladie est vive , il y a fièvre , le plus souvent mortelle.

S-esp. II. Apyrétique.

Syn. Catoche , *catochus* ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. II , toniques généraux ; gen. VIII. — SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. I , toniques généraux ; gen. VIII.

Car. Le cours de la maladie est lent , il n'y a point de fièvre , et l'espoir sur la guérison est fondé.

Rap. A. Tétane ; BAJON , *loc. cit.* , esp. 2.

B. Catoche holotonique , SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

C. Catoche cervin ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

S-esp. III. Anæsthésique.

Syn. *Catochus* ; LINNÉ , cl. VII , metoires ; ord. I , spastiques ; gen. CXXVIII.

Car. Tétane avec insensibilité.

S-esp. IV. Comateux.

Syn. *Catochus* ; VOGEL , cl. V , spasmes ; gen. CLXXXIII.

Car. Tétane avec privation des sens.

§. II. *Particulier.*

Esp. II. *Strabisme.*

Eth. de *strabizo* ; j'ai les yeux de travers.

Syn. Strabisme ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. I. — LINNÉ , cl. XI , vices ; ord. VII , difformités ; gen. CCCV. — VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DXIX. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. I , dyscinésies ; gen. CXIV. — SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. I.

Car. Défaut de réunion ou de convergence des axes optiques , par affection tonique de l'un des yeux.

S-esp. I. Vulgaire ; par l'habitude de n'exercer qu'un œil ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

S-esp. II. Asthénospastique ; par affection spasmodique des muscles d'un œil , et faiblesse des muscles de l'autre.

Strabisme buffonien ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

Rap. A. Amblyopie clusitique ; SAUV. , cl. VI , ord. I , gen. III , esp. 5.

Esp. III. Trisme.

Syn. Tic, *trismus*; SAUVAGES, cl. IV, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. II. — LINNÉ, cl. VII, motoires; ord. I, spastiques; gen. CXXIV. — CUELLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; gen. XLIX. — SAGAR, cl. VII, spasmes; ord. I, toniques partiels; gen. II. Capistre; VOGEL, cl. V, spasmes; gen. CCVIII.

Car. Rigidité spasmodique affectant particulièrement la mâchoire inférieure.

S-esp. I. Néophytique.

Attaquant les enfans de naissance entre les deux premières semaines de la vie.

Trisme néophytique; SAUV., *loc. cit.*; espars

Mal de mâchoire; BAIJON, *loc. cit.* — BAUMES, des convulsions dans l'enfance, pag. 319.

La sarrette.

S-esp. II. Traumatique; à l'occasion d'une plaie.

Bibl. J. G. BRENDÉL, de *spasmo maxilla inferioris*; Gotting. 1755.

BILFINGER, traité du tétanos ou du mal de mâchoire; *maladie de l'Amérique*; Gott. 1764.

LE FOULON, mémoire sur le tétanos à la suite des plaies; *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*; tom. III, an VI, pag. 257.

Rap. A. Trisme traumatique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

Angine spasmodique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. X, esp. 18.

Convulsion vulnérable; SAUV. IV, ord. III, gen. XIII, esp. 2.

B. Après l'opération d'un stéatome dans l'aîne; J. DE PLENCIZ, *acta et observata medica*; Pragæ 1773, pag. 170.

C. Trisme après l'extraction de deux dents; *rec. pér. de la soc. de méd. de Paris*; tom. II, pag. 137.

D. Trisme par une plaie faite au tendon du second orteil par un clou, *ibid.*

E. Trisme par une plaie d'arme à feu à la main; BODIN, *ibid.*, tom. V, pag. 293.

S-esp. III. Trisme cataleptique.

Trisme compliqué avec la catalepsie; L. HIORTZ BERG, *kongl. svenska vetenskaps aca-*

*demiens handlingar for ar 1778 ; Stockholm ,
vol. xxxix , pag. 70.*

Esp. IV. Torticolis.

Syn. Torticolis, *obstipitas* ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. III. — SAGAR , cl. VII , ord. I , toniques partiels ; gen. III.

Tête de travers , *caput obstipum* ; VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DXIII.

Car. Inflexion tonique de la tête à droite ou à gauche , en avant ou en arrière.

Rap. A. Torticolis spasmodique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6.

B. Torticolis huméral ; le visage restant tourné en dehors vers l'humérus ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 21.

C. Torticolis latéral ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

Esp. V. Contracture.

Syn. Contracture ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. IV. — LINNÉ , cl. XI , vices ; ord. VII , difformités ; gen. CCC. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. III ; dyscinésies ; gen. CXVI. — SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. IV.

Car. Rigidité soutenue avec inflexion d'un ou de plusieurs membres.

Rap. A. Contracture spasmodique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. II.

B. Digitie , *digitium* ; courbure constante et forcée de la première phalange des doigts ; VOGEL , cl. V , spasmes ; gen. CCXXI.

Esp. VI. Crampe.

Syn. Crampe , *crampus* ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. V. — SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. V.

Car. Rigidité subite et passagère d'un muscle ou de deux avec douleur.

Rap. A. Crampe idiopathique ; SAUV. , *loc. cit.*, esp. I.

Esp. VII. Priapisme.

Syn. Priapisme ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. VI. — LINNÉ , cl. VII , motrices ; ord. I , spastiques ; gen. CXXII. — VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen. CLXXIII. — SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. I , toniques partiels ; gen. VI.

Car. Érection involontaire et fatigante du membre viril sans desir amoureux.

Rap. A. Satyriase chronique; SAUV., cl. VIII, ord. II, gen. XIII, esp. 2.

Esp. VIII. Catalepsie.

Eth. de katalambano, j'arrête.

Syn. Catalepsie; JUNCER, *tab.* XLV. — SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXV. — LINNÉ, cl. VII, motrices; ord. I, spastiques; gen. CXXIX. — VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCXXX. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. V, assoupissemens; gen. XXV. PINEL, cl. IV, névroses; ord. IV, affections comateuses; gen. LXI.

Bibl. H. F. DELIUS, *de catalepsi*; Erlang. 1754.

L. E. HERSCHEL, *gedanken von der starrsucht oder catalepsi*; Berlin 1768.

J. G. BAUMER, *de extaseos et catalepseos notione ac rationali curatione*; Giessæ 1776.

G. L. FABRI, *tractatus pathologicus de catalepsi*; Halæ 1780.

Car. Etat permanent de contraction des muscles, avec privation du sentiment, du mouvement musculaire et des sens, et affoiblis-

sement du pouls et de la respiration : néanmoins les membres ayant assez de flexibilité pour se prêter à des changemens de position qu'ils conservent.

Rap. A. Catalepsie mélancolique ; SAUV. , loc. cit. , esp. 5.

B. Tétane admirable ; SAUV. , cl. IV , ord. 11 , gen. VII , esp. 13.

C. Extase cataleptique ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXVI , esp. 3.

D. Extase catoche , avec roideur du corps ; SAUV. , ibid , esp. 1.

E. Apoplexie cataleptique ; SAUV. , cl. II , ord. 1 , gen. XLII , esp. 8.

Gen. XXXII. NARCOSÉ.

Eth. de narke , engourdissement , stupeur. Dénomination adoptée dans cet ouvrage pour exprimer un genre de maladie dont les synonymes sont les suivans.

Syn. Affections carotiques , apoplectiques.

Assoupissemens , *comata* ; SAUVAGES , cl. VI , débilités ; ord. V. — LINNÉ , cl. VI , quiétales ; ord. 11 , soporeuses. — SAGAR , cl. IX , débilités ; ord. V.

Bibl. (a) PECHLIN, *de apoplexiâ*; *Leidæ* 1667; et coll. de HALLER, tom. I, pag. I.

L. HEISTER, *de apoplexiâ magis chirurgicis quam aliis medicamentis curandâ*; *Helmstad* 1752.

J. MOLINARI, *de apoplexiâ*; *Viennæ* 1753.

D. HOHED, *de apoplexiâ*; *Lugduni-Batav.* 1753.

CH. G. LANGE, *de apoplexiâ*; *Jenæ* 1754.

* M. ALBERTI, *de majori frequentiâ apoplexiæ, in eruditis quam alius sortis hominibus observandâ*; *Halæ-Magdeb.* 1755.

G. E. HAMBERGER, *de apoplexiâ*; *Jenæ* 1755.

A. STORCK, *de apoplexiâ*; *Lugd.-Batav.* 1757.

TISSOT, *de variolis, apoplexiâ et hydropse*; *Lausannæ* 1761; coll. de SANDIFORT, tom. I, pag. I; et *œuvres générales*, tom. V, pag. 191.

J. WEPFER, *historiæ apoplecticorum, etc.*; *Venetis* 1762.

(a) Les auteurs que l'on va énumérer n'appartiennent pas tous au vrai genre de l'apoplexie; on a cru devoir cependant les ranger dans cet article et marquer d'un astérisque * ceux qui s'y rapportent plus particulièrement.

* CH. A. MANGOLD, *diss. docens apoplexiæ plures præter sanguineam et serosam dari species*; Erford 1765.

A. WESTPHAL, *de medelis quibusdam quæ parantur apoplexiæ, suspectis partim et noxiis, partim laudandis*; Gryphiswald 1767.

MARQUET, *traité de l'apoplexie, paralysie et autres affections soporeuses, etc.*; Paris 1770.

J. G. LEIDENFROST, *de quibusdam ad præcavendam apoplexiam spectantibus*; Duisburg. ad Rhen. 1771.

J. CH. NIEMANN, *de apoplexiæ pathologiâ et therapeiâ*; Halæ 1772.

PONSARD, *traité de l'apoplexie, etc.*; Liège 1775. -- Paris 1782.

F. O. KRËBS, *de apoplexiâ peripneumoniam indicante*; Helmst. 1780.

STOLL, *de apoplexiâ*; *dissert. med.*, tom. I, pag. 302.

B. G. CHANDLERS, *an inquiry in to the various theories and methods of cure in apoplexies and paralysies*; Canterbury 1784.

LAMBRY, *an et in quo asphyxia differat ab apoplexiâ?* Nancy 1787.

* ZULIANI, *de apoplexiâ præsertim nerveâ*; Brixen 1789.

KIRKLAND, *a commentary on apoplectu and paralytic affections*, etc., Lond. 1791.

N. X. 2. A. RICHARD, *essai médical sur l'apoplexie*; Montpellier, an. x.

Car. État soporeux plus ou moins profond, avec lésion quelconque de la respiration; les mouvemens volontaires étant très-diminués ou abolis, et l'action du cœur et des artères subsistant. — *XXIX.*

Esp. I. Narcoze modérée.

Car. Assoupissement soutenu avec un sentiment obscur et la respiration lente.

Rap. A. Apoplexie nerveuse; KIRKLAND, *loc. cit.*, *esp. 2.*

S-esp. I. Cataphore.

Eth. de kataphero, l'assoupis.

Syn. Cataphore; SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. XXIX. — LINNÉ, cl. VI, quiétales; ord. I r, soporeuses; gen. XCIX. — VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCXXXII. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. XXIX.

Car. Le malade est assoupi; excité il se ré-

veille assez facilement, mais il retombe bientôt dans un état comateux.

Rap. A. Cataphore somnolente ; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.

B. Somnolence ; LINNÉ, cl. VI, quiétales ; ord. II, soporeuses ; gen. XCVI. — VOGEL, cl. VI, adynamies ; gen. CCXXXIII.

C. Typhomanie ; SAUV., cl. VII, débilités ; ord. V, assoupissemens ; gen. XXVII. — LINNÉ, cl. VI, quiétales ; ord. II, soporeuses ; gen. CXVII. — SAGAR, cl. IX, débilités ; ord. V, assoupissemens ; gen. XXVII.

D. Léthargie ; SAUVAGES, cl. VI, débilités ; ord. V, assoupissemens ; gen. XXVIII. — LINNÉ, cl. VI, quiétales ; ord. II, soporeuses ; gen. XCVIII. — SAGAR, cl. IX, débilités ; ord. V, assoupissemens ; gen. XXVIII.

E. Hypophose, apparition du blanc de l'œil en dormant ; VOGEL, cl. VI, adynamies ; gen. CCXXXIV.

S-esp. II. Carus.

Syn. Carus (de caros) ; SAUVAGES, cl. VI, débilités ; ord. V, assoupissemens ; gen. XXX. — LINNÉ, cl. VI, quiétales ; ord. II, soporeuses ; gen. C. — VOGEL, cl. VI, adynamies ;

gen. CCXXXI. — SAGAR, cl. IX, débilités; ord. v, assoupissemens; gen. XXX. — *Ord. v, assoupissemens*.

Car. Le malade, excité, se réveille plus difficilement et se rendort plus profondément.

Rap. A. Cataphore, coma; SAUV., cl. VI, ord. v, gen. XXIX, esp. 2.

B. Surdité comatique; SAUV., cl. VI, ord. i, gen. IX, esp. 7.

Var. A. Carus solaire, par un coup-de-solcil; SAUV., *loc. cit.*, esp. 12.

B. Catoché diurne; assoupissement profond avec des symptômes rétaniques, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; SAUV., cl. VI, ord. i, gen. VIII, esp. 6.

Esp. II. Narcose violente.

Car. Sommeil très-profond avec insensibilité et respiration stertoreuse.

S-esp. I. Apoplexie.

Eth. d'apoplectein, frapper, abattre, rendre stupide, sans sentiment.

Syn. Apoplexie; JUNCKER, *tab.* CXVII. — SAUVAGES, cl. VI, débilités; ord. v, assou-

pissemens ; gen. XXXI. — LINNÉ, cl. VI, quies-
tales ; ord. II. — soporeuses ; gen. CI. — VOI-
GEL, cl. VI, adynamies ; gen. CCXXIX. — CUL-
LEN, cl. II, névroses ; ord. I, assoupissemens ;
gen. XLII. — SAGAR, cl. IX, débilités ; ord. V,
assoupissemens ; gen. XXXI. — PINEL, cl. IV, né-
vroses ; ord. IV, affections comateuses ; gen. LX.

Car. Renversé subitement comme si on étoit
frappé de la foudre, le malade tombe dans
un sommeil profond, avec ronflement et une
respiration sonore.

Rap. A. Apoplexie nerveuse ; KIRKLAND,
loc. cit., esp. I.

Apoplexie foudroyante.

B. Paraphonie stertoreuse ; ronflement des
apoplectiques ; SAUV., cl. VI, ord. III, gen.
XVII, esp. 6.

C. Asphyxie apoplectique ; effet d'une apo-
plexie foudroyante ; SAUV., cl. VI, ord. IV,
gen. XXIV, esp. 10.

D. Hémiplegie apoplectique ; paralysie de
la moitié du corps, venant après une attaque
d'apoplexie, plus souvent après l'apoplexie mo-
dérée, ou première espèce d'apoplexie ner-
veuse de KIRKLAND ; SAUV., cl. VI, ord. III,
gen. XIX, esp. 7.

Gen. XXXIII. CLONISME.

Eth. de klôneo , j'agite , je mets en mouvement.

Syn. Convulsions cloniques ; ETMULLER , *colleg. pract.* , pars II , cap. IX.

Mouvements convulsifs de RIVIÈRE.

Spasmes cloniques ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. III et IV. — SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. III et IV.

Bibl. BAUMES , des convulsions dans l'enfance ; in-8.^o 1789.

ZEIT , *dissert. de convulsionibus infantum* ; coll. de STOLL , tom. III , 1790 , pag. 179.

Car. Contraction et relâchement alternatif et involontaire des muscles ou organes moteurs.

Esp. I. *Eclampsie.*

— *Syn.* Eclampsie ; SAUVAGES , cl. IV , spasmes ; ord. IV , cloniques généraux ; gen. XVIII.

— VOGEL , cl. V , spasmes ; gen. CLXXXIX.

— SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. IV , cloniques généraux ; gen. XIX.

Épilepsie des enfans ; BAUMES , *loc. cit.* , pag. 1381 , chap. IX.

Mouvements convulsifs.

Bibl. N. ROSEN, de epilepsiâ infantili ; Upsal. 1754.

Car. Clonisme aigu avec des paroxismes qui se renouvellent à de courts intervalles ; et qui suspendent toutes les fonctions des sens.

Rap. A. Éclampsie puerpérique ; I. C. GEHLER *de clampsia parientium, morbo gravi quidem, neque adeo funesto ; sectio prior Lipsiæ 1776. — Sectio altera Lipsiæ 1777.*

Esp. II. Epilepsie.

Eth. d'*epi lambaneistai*, saisir, surprendre tout-à-coup.

Syn. Épilepsie ; JUNCKER, *tab. LIV.* — SAUVAGES, cl. IV, spasmes ; ord. IV, cloniques généraux ; gen. XIX. — LINNÉ, cl. VII, motrices ; ord. II, agitateurs ; gen. CXLIII. — VOGEL, cl. V, spasmes ; gen. CLXXXVIII. — CULLEN, cl. II, névroses ; ord. III, spasmes ; gen. LIII. — SAGAR, cl. VII, spasmes ; ord. IV, cloniques généraux ; gen. XX. — PINEL, cl. IV, névroses ; ord. II, spasmes ; gen. XLIX.

Mal caduc ; haut mal ; mal d'Hercule ; mal de

de la terre ; mal de Saint-Jean ; mal des éomices ; maladie sacrée ou divine.

Bibl. A. I. RUGEMER, de epilepsiâ ; Wurceb.

1752.

C. VAN WIERT, de epilepsiâ ; Traj. ad Rhen. 1752.

A. WATTS, de epilepsiâ ; Lugd.-Batav.

1753.

J. G. FALCK ; de epilepsiâ seu convulsivis motibus virginum ; Gotting. 1753.

P. SAMSON, de epilepsiâ et præcipue ejusdem sic dictis specificis ; Helmst. 1756.

F. CH. JUNCKER, disp. sistens raram epilepsiæ speciem ; Halæ 1763.

M. LOCHER, observ. pract. circa luem veneream, epilepsiam et maniam ; Bruxellis 1764.

I. B. PASQUALATI, de epilepsiâ ; Vindob. 1766 ; et coll. de WASSERBERG, tom. III, 1775, pag. 367.

CH. R. HANNES, de puerò epileptico, fo- liis aurantiòrum sanato ; Vesaliæ 1766 ; et coll. de SANDIFORT ; tom. III, pag. 311.

H. FR. DELIUS, de ustione crânii in epilepsiâ ; Erlang. 1768.

*PH. A. BOEHMER, de nonnullis momentis
Tom. II.*

ad curationem epilepsiæ spectantibus; Halæ 1768.

S. A. D. TISSOT, traité de l'épilepsie; Paris 1770.

W. THRELFAL, *essay on epilepsy*, etc.; London 1772.

J. COLBATSH, *abandlung von den misteln und dessen kraft wider die epilepsie*, etc.; Altenb. 1776.

Cases of insanity, the epilepsy, etc.; Lond. 1781.

PH. TURPIN, *de epilepsiâ*; coll. de WEBSTER; Edinb. 1781, tom. II, pag. 147, dissert. II.

SAILLANT, *sur le siège de l'épilepsie*; *mém. de la soc. roy. de méd.*; ann. 1782-83, pag. 88 des mém.

Car. Clonisme chronique avec lésion absolue de l'exercice des sens, ordinairement composé d'une attaque qui revient par intervalles et qui est suivie de lassitudes plus ou moins fortes.

Rap. A. Epilepsie essentielle ou maladie sacrée d'HIPPOCRATE; SAILLANT, *hist. et mém. de la soc. roy. de méd.*; ann. 1779, pag. 305, *hist.*

B. Apoplexie épileptique; SAUV., cl. vi, ord. v, gen. xxxi, esp. 8. Assoupissement apoplectique formant la seconde période naturelle de l'épilepsie.

C. Dyspermatisme épileptique; SAUV., cl. ix, ord. iiii, gen. xxxi, esp. 8.

S-esp. I. Précursive.

Le paroxysme est précédé d'une sensation quelconque, qui d'une partie du corps monte à la tête.

Epilepsie pèdisymptomatique; SAUV., *loc. cit.*; esp. 6.

S-esp. II. Aprécursive.

L'attaque survient tout-à-coup, et pour l'ordinaire sans cause évidente.

Epilepsie cérébrale; CULLEN, *loc. cit.*, esp. 1.

Esp. III. Convulsion.

Syn. Convulsion; SAUVAGES, cl. iv, spasmes; ord. iiii, cloniques partiels; gen. xiii. — LINNÉ, cl. vii, motoires; ord. ii, agitatoires; gen. cxlii. — VOGEL, cl. v, spasmes; gen. cxci. — CULLEN, cl. ii, névroses; ord. iiii, spasmes; gen. l. — SAGAR, cl.

VII, spasmes; ord. III, cloniques partiels;
gen. XIV.

Bibl. PH. C. FABRICIUS, *de miris quibusdam motibus spasmodico-convulsivis vagis*; Helmst. 1751.

G. E. HAMBERGER, *de convulsionum natura*; Jenæ 1751.

H. A. NOKKEN, *de convulsione*; Traj. ad Rhen. 1752.

P. S. MULLER, *convulsionum et epilepsiæ infantum ex leviori dolore prodeuntium rationes medicæ*; Halæ 1757.

PH. C. FABRICIUS, *de motibus convulsivis*; Helmstadt 1763.

J. GESSLER, *de convulsione*; Harderovic. 1765.

I. KOCH, *de convulsionibus juvenem decussatim distorquentibus*; Argentor. 1770; et coll. de BALDINGER, tom. VI, pag. 305.

Car. Clonisme général ou particulier; l'exercice des sens restant libres.

Rap. A. Hiéranose, convulsion générale; SAUV., *loc. cit.*, esp. II. — LINNÉ, cl. VII, ord. II, gen. CXLIV. — VOGEL, cl. V, gen. CXC.

B. Tremblement involontaire ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 6.

C. Chorée précipitée ; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XXI, esp. 2. On ne peut marcher qu'en courant : c'est la volubilité de la langue lorsqu'il est question de la parole.

D. Convulsion habituelle ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 12. Elle affecte la tête ou le pied ; est perenne.

E. Cillose, tremblement continuel des cils supérieurs ; VOGEL, cl. V, gen. CCIII.

F. Clignotement, convulsion des paupières, *Nictatio* ; LAUTH, gen. 63. — *Hippos* ; LINNÉ, cl. VII, ord. II, gen. CXXXVII. — Cincèse ; VOGEL, cl. V, gen. CCI.

G. Nystagme (la souris) ; spasme clonique de l'œil ou de la paupière ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. IX. — SAGAR, cl. VII, ord. III, gen. IX.

Strabisme spasmodique ; convulsion clonique des muscles de l'œil ; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. I, esp. 4.

Hippos : VOGEL, cl. V, gen. CXCIX.

H. Tic hypocondrique ; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. II, esp. 8. Distorsion involontaire des muscles qui meuvent les joues, les yeux

et la mâchoire ; laquelle passant en habitude est vulgairement appelée *le tic*.

I. Convulsion abdominale, occupant les muscles du bas-ventre ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 10.

K. Convulsion intermittente, ayant son siège dans les extrémités ; SAUV. , *ibid* , esp. 17.

Esp. IV. Palpitation.

Syn. Palpitation ; JUNCKER , *tab. XXXIII.* — SAUVAGES , cl. IV, spasmes ; ord. III , cloniques partiels ; gen. XV. — LINNÉ , cl. VII , motoires ; ord. II , agitatoires ; gen. CXXXII. — VOGEL , cl. V , spasmes ; gen. CCXIII. — CULLEN , cl. II , névroses ; ord. III , spasmes ; gen. LIV. — SAGAR , cl. VII , spasmes ; ord. III , cloniques partiels ; gen. XVI.

Bibl. BECK , *de palpitatione cordis* ; Giessæ 1718 ; et coll. de HALLER , tom. II , pag. 499.
CH. E. DELILLE , *tractatus de palpitatione cordis* , etc. ; Zwollæ 1755.

J. MILLIES , *de palpitatione cordis* ; Lugd. Batav. 1756.

DE BERGEN , *de palpitatione cordis* ; Francof. ad Viad. 1740.

Cat. Mouvement du cœur déréglé, fréquent,

convulsif avec oppression, difficulté de respirer, abattement des forces et même défaillances.

Var. A. Palpitation vive; mouvement violent et contre nature du cœur.

B. Palpitation foible; mouvement modéré, obscur ou tremblotant du cœur.

Palpitation tremblotante; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4. — LIEUTAUD, *précis de médec. prat.*, in-8.^o, tom. 1, pag. 398.

Esp. V. Hoquet.

Syn. Hoquet; SAUVAGES, cl. v, essouffemens; ord. 1, convulsifs; gen. IV. — LINNÉ, cl. VIII, supprimeurs; ord. 1, suffocatoires; gen. CLIII. — VOGEL, cl. v, spasmes; gen. CCXII. — SAGAR, cl. VIII, essouffemens; ord. 1, spasmodiques; gen. IV.

Bibl. F. H. BRUNING, *diss. sistens singultum morbum, symptoma, signum*; Traj. ad Rhen. 1758.

Car. Secousse du diaphragme suivie d'une inspiration tout-à-coup interrompue et sonore.

Rap. A. Hoquet passager; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

S-esp. I. Hoquet épileptico-maniaque ; participant de l'épilepsie et de la manie ; SAUV., *loc. cit.* , esp. 29.

Esp. VI. Eternuement.

Syn. Eternuement ; SAUVAGES , cl. v , essoufflemens ; ord. i , convulsifs ; gen. ii. — LINNÉ , cl. viii , suppressoires ; ord. i , suffocatoires ; gen. cliv. — VOGEL , cl. v , spasmes ; gen. cciv. — SAGAR , cl. viii , essoufflemens ; ord. i , spasmodiques ; gen. ii.

Bibl. A. E. BUCHNER , *de sternutationis commodis et incommotis* ; Halæ 1757.

Car. Mouvement convulsif de la tête et du tronc , avec expiration violente , sonore et subite.

Gen. XXXIV. Toux.

Eth. de *tussis* , mot latin rendu en français par *toux*.

Syn. Toux ; SAUVAGES , cl. v , essoufflemens ; ord. i , convulsifs ; gen. v. — LINNÉ , cl. viii , suppressoires ; ord. i , suffocatoires ; gen. clv. — VOGEL , cl. v , spasmes ; gen. ccv. — CUL-

LEN, cl. I, pyrexies; ord. V, flux; gen. XL, catarre. — SAGAR, cl. VIII, essoufflemens; ord. I, spasmodiques; gen. V.

Bibl. ROSEN, *de tussi, pars prior*; Upsal. 1739; et *pars posterior*; Upsal. 1741; et coll. de HALLER, tom. II, pag. 51.

RICHTER, *de tussi*; Gotting. 1747; et *opusc. medic.*, tom. I, pag. 343.

S. J. VEDEKIND, *de tussi in genere et epidemiâ illâ quæ hoc anno sæviit*; Rintel 1766.

Car. Expulsion sonore et faite par secousse de l'air contenu dans le poumon.

Esp. I. Simple.

Les secousses de la toux ne sont point interrompues, précipitées,

S-esp. I. Toux accidentelle, déterminée par quelque cause externe sur la trachée-artère; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

Rap. A. Dysphagie russiculeuse; toux et impossibilité d'avaler, provenant de quelques gouttes d'eau tombées dans la trachée-artère; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 7.

S-esp. II. Toux gutturale, provenant d'une

cause qui affecte particulièrement le gosier ;
SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

S-esp. III. Toux xérolaryngée ; par sécheresse de la gorge ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 23.

S-esp. IV. Toux indéterminée, dont il est très-difficile de découvrir la cause ; QUARIN, *tentam. de cicutâ*, obs. IV.

Esp. II. *Quinteuse.*

Syn. Coqueluche ; toux convulsive ; toux fêrine.

Bibl. BOURDELIN, *ergo tussi puerorum clangosæ vulgo coqueluche, emesis?* Paris 1752, et coll. de HALLER, tom. II, pag. 22.

TH. FORBES, *de tussi convulsivâ* ; Edinb. 1754 ; et coll. de HALLER, tom. II, pag. 97.

J. F. CH. EBELING, *de tussi infantum convulsivâ* ; Gotting. 1768.

J. MILLAR, *observations on the asthma and on the hooping congh, etc.* ; London 1769.

CH. J. MELLIN, *von den keichhusten der kinder, welcher in den jahren 1768 und 1769, etc.* ; Franckf. 1770.

J. GABLA, *de tussi convulsivâ infantum* ; Vindob. 1772.

G. KIRKLAND, *de pertussi*; Edinb. 1772.

W. BUTTER, *a treatise on the kinkcongh*, etc.; Lond. 1773.

A. MURRAY, *de tempore corticem peruvianum in tussi convulsivâ exhibendi*; Gotting. 1776; et coll. de MURRAY, tom. I, pag. 305.

STRACK, *de tussi convulsivâ infantum*; Mogunt. 1777; et coll. de FRANCK, tom. III, pag. 218.

STOLL, *de tussi convulsivâ*; coll. d'EYEREL, tom. II, 1789, pag. 208.

Car. Toux convulsive dans laquelle une seule inspiration est suivie de cinq ou six expirations successives, avec une sorte de sifflement, des anxiétés et un sentiment de strangulation; elle revient par accès et amène souvent le vomissement.

Gen. XXXV. ASTHME.

Eth. d'aazo, je respire.

Car. Difficulté de respirer, essentielle, aiguë ou chronique, périodique ou continue.

Esp. I. Paroxistique; asthme.

Syn. Asthme; SAUVAGES, cl. v, essouffemens; ord. II, oppressifs; gen. VIII. — LINNÉ,

cl. VIII, suppressoires ; ord. 1 , suffocatoires ;
 gen. CLXI. — VOGEL , cl. VI , adynamies ;
 gen. CCLXVIII. — CULLEN , cl. II , névroses ;
 ord. III , spasmes ; sect. II , des fonctions
 vitales ; gen. LV. — SAGAR , cl. VIII , essoufle-
 mens ; ord. II , suppressifs ; gen. VIII. — MAC-
 BRIDE , cl. I , universelles ; ord. VII , essou-
 flemens ; gen. III.

Bibl. J. FLOYER , *a treatise of the asthma* ;
 Lond. 1698 ; en franç. par JAU , Paris 1761 ;
 en allem. par SCHERF , Leips. 1782. Voyez
 l'édition anglaise de FLOYER , Lond. 1753.

H. RIDLEY , *observationes medicæ , inter quas
 aliquanto fusius agitur de asthmate et hydro-
 phobiâ* ; L. B. 1738.

C. F. VALENTINI , *asthmatis pathologica con-
 sideratio* ; Kiliæ 1751.

J. JUNCKER , *de asthmatis verâ pathologiâ
 et rationali therapeiâ* ; Halæ 1752.

F. B. DE SAUVAGES , *de respiratione diffi-
 cili* ; Monspel. 1757.

S. AURIVIL , *de asthmate* ; Upsal. 1763.

J. W. FEYERABEND , *de asthmate* ; Reg. 1764.

J. MILLAR , *observations on the asthma* ,
 etc. ; London 1769.

D. F. BOST , *dissert. sistens historiam asth-
 matis* ; Erford. 1774.

I. D. A. KREVEL , *de asthmate* ; Halæ 1774.

J. C. MAYER ; *de asthmate ejusque speciebus* ; Gotting. 1779.

T. WITHERS , *a treatise on asthma* ; Lond. 1786.

M. STOLL , *de asthmate* ; coll. d'EYEREL , tom. II , 1789 , pag. 78.

Car. Difficulté subite de respirer , avec un sentiment de suffocation , avidité pour l'air frais et sifflement dans l'inspiration et l'expiration , venant par paroxismes aigus.

Rap. A. Paraphonie sifflante ; SAUV. , cl. VI , ord. III , gen. XVII , esp. 7.

S-esp. I. Humide.

Sentiment de plénitude et d'embarras dans la poitrine ; expectoration avant l'accès et sur-tout à la fin , moins abondante néanmoins que dans l'asthme pituiteux (voy. ci-dessus tom. II , pag. 33 , *Sorte* 7.) ; toux comprimée pendant le fort du paroxisme.

S-esp. II. Sec.

Resserrement spasmodique de la poitrine avec des anxiétés de suffocation plus considérables ; la fin de l'accès n'est pas marquée par l'ex-

pectoration, et le paroxisme se déclare plus subitement et plus violemment.

Epilepsie du poumon de VANHELMONT.

Asthme occulte et sec; ETMULLER, *coll. med.*, cap. XIV.

Asthme convulsif; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

Voy. J. LAW, *de asthmate recidivo spasmodico*; Edinb. 1762.

Formes.

Sor. I. Phthisie asthmaticque; SAUV., cl. X, ord. I, gen. II, esp. 5.

Esp. II. Suffocant; orthopnée.

Syn. Orthopnée (de *orthos*, droit, levé; et *pnæo*, je respire.); SAUVAGES, cl. V, essoufflemens; ord. II, oppressifs; gen. IX. — LINNÉ, cl. VIII, suppressoires; ord. I, suffocatoires; gen. CLXII. — VOGEL, cl. VI, adynamies; gen. CCLXIX. — CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes; sect. II, des fonctions vitales; gen. LVI. — SAGAR, cl. VIII, essoufflemens; ord. II, suppressifs; gen. IX. — MACBRIDE, cl. I, universelles; ord. VIII, essoufflemens; gen. II.

Car. Difficulté de respirer aiguë, avec des plus vives angoisses de suffocation.

Rap. A. Orthopnée spasmodique ; SAUV., loc. cit., esp. 3.

B. Orthopnée épidémique à Forges en 1774 ; CIZEVILLE, dans LEPECQ DE LA CLOTURE, collect. d'observat. sur les malad. et constitut. épidém.

C. Orthopnée cardiaque ; SAUV., loc. cit., esp. 2. — Catarre suffocant ; ETMULLER, coll. medic., cap. XIV. — Syncope cardiaque, id.

Pesanteur de tête, douleur de poitrine, difficulté de respirer, avec aphonie, danger de suffocation, anxiété, quelquefois de la toux et pouls lent et rare.

Esp. III. Continu ; dyspnée.

Syn. Dyspnée (de dys, difficilement ; et pneo, je respire.) ; SAUVAGES, cl. V, essouffemens ; ord. II, oppressifs ; gen. VII. — LINNÉ, cl. VIII, suppressoires ; ord. I, suffocatoires ; gen. CLX. — VOGEL, cl. VI, adynamies ; gen. CCLXVII. — CULLEN, cl. II, névroses ; ord. III, spasmes ; sect. II, des fonctions vitales ; gen. XVI. — SAGAR, cl. VIII, essouffemens ; ord. II, suppressifs ; gen. VII. — MACBRIDE, cl. I, universelles ; ord. VII, spasmes ; gen. I.

Car. Difficulté de respirer, continuëlle, chronique, avec toux fréquente, dans laquelle on n'éprouve pas un resserrement, mais plutôt un sentiment de réplétion et d'embarras dans la poitrine.

Gen. XXXVI. PHTHISIE.

Eth. de *phthino* ou *phthoo*, je corromps; ou *phtheïro*, je flétris.

Car. Dépérissement et consommation générale du corps, avec formation de pus dans une partie, le plus souvent interne, et fièvre hectique lente.

Nota bene. VOGEL observe que, dans l'atrophie, la graisse seule se consume et ne se remplace point; tandis que, dans le *tabes* et la phthisie, les chairs se fondent également.

Esp. I. Gutturale.

Car. Sentiment d'érosion dans le larynx, avec difficulté chronique de respirer, voix grêle ou rauque et crachats suspects ou purulens.

Rap. A. Dysphagie nauséuse; SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 9.

Esp. II.

Esp. II. Pulmonaire.

Syn. Pulmonie, JEANNET DES LONGROIS ;
de la pulmonie ; *Paris* 1781.

Phthisie ; SAUVAGES , cl. X , cachexies ; ord.
I , consomption ; gen. II. — LINNÉ , cl. X ,
difformités ; ord. I , maigreurs ; gen. CCIX.
— VOGEL , cl. VIII , cachexies ; gen. CCCX.
— CULLEN , cl. I , pyrexies ; ord. IV , hé-
morragies , gen. XXXVII , suite. — SAGAR , cl.
III , cachexies ; ord. I , consomption ; gen. II.

Bibl. G. E. STAHL , *de phthisi* ; *Halæ* 1704 ;
et coll. de HALLER , tom. II , pag. 369.

P. G. SCHACHER , *progr. quo incisio phthi-
sici continetur cadaveris* ; *Lips.* 1730 ; et coll.
de HALLER , tom. II , pag. 395.

C. F. KALTSCHMID , *de phthisi pulmonali
ejusque præservatione* ; *Jenæ* 1751.

D. VASSE , *an ulceribus pulmonum suffimi-
gium à balsamicis ?* *Paris.* 1751.

J. RAULIN ; observations de médecine avec
des remarques contre l'usage du lait dans la
pulmonie ; *Paris* 1754.

G. G. RICHTER , *de phthisi infantum pul-
monaria* ; *Gotting.* 1758.

F. CH. JÜNCKER , *de phthisi per operationem
chirurgicam curanda* ; *Halæ* 1760.

Essai théorique et pratique sur la phthisie ;
Paris 1760.

P. CHEVALIER, *an phthisi pulmonali idiopathicae præcavendæ , parca sed frequens sanguinis missio ?* Paris. 1761.

G. F. SIGWART, *de phthisi ;* Tubing. 1765.

C. HALL, *de phthisi pulmonali ;* L. B. 1765.

M. HINDE, *de phthisi pulmonali ;* L. B. 1765.

R. HARKE, *de phthisi pulmonali ;* L. B. 1767.

READ, sur les effets salutaires du séjour des étabes dans la phthisie ; Paris 1767.

R. STARKE, *de phthisi pulmonali ;* Lugd.-Batav. 1767.

P. J. BUCH'OZ, traité de la phthisie pulmonaire ; Paris 1769.

R. DE L'ISLE, traité des maladies de poitrine , connues sous le nom de phthisie pulmonaire , etc. ; Valence 1769.

ROZIERE DE LA CHASSAGNE , manuel des pulmoniques ; Paris 1770.

A. VAN DER PLUYM, *de phthisi pulmonali ;* Lugd.-Batav. 1771.

CH. F. JØGER, *diss. prima de phthisi pulmonali casu notabiliore et epicrissi illustratâ ;*

Tubing. 1772. — *Secunda diss.*; *idi*; et coll. de BALDINGER, tom. IV, pag. 201--261.

J. RINGELMANN, de *phthisi*; *Herbipoli* 1777.

AMAR, *instruccion curativa y preservativa de dolores de costado y pulmonias*; Madrid 1777.

D'ASSY D'ARPAJEAN, observations sur la guérison d'une *phthisie pulmonaire*; *Lausanne* et *Paris* 1778.

SCHROEDER, *tractatus de pneumonide ejusque speciebus*; *Gotting* 1779.

J. HALLILAY, de *phthisi pulmonali*; coll. de WEBSTER, tom. I, 1781, pag. 323.

TH. REID, *essay on the nature and cure of the phthisis pulmonalis*; *Lond.* 1782-1785; en français par PETIT D'ARSON, *Lyon* 1792.

EVERS, *diss. med. in contagium phthisicum inquirens*; *Gotting* 1782.

RAULIN, traité de la *phthisie pulmonaire*; *Paris* 1782. — Nouvelles observations sur la *phthisie*; *Paris* 1785.

G. CORP, de *phthisi pulmonali*; *Edinb.* 1782; et *diss. med. Edinburgens.*, 1782.

R. KENTISH, de *phthisi pulmonali idiopathica*; *Edinb.* 1784; et *dissert. med. Edinb.* 1784.

M. I. MARX, *abhandlung von der schwindlungen-sucht und den mitteln wider dieselbe*; Hannover 1784.

MARIANO NARDUCCI, *sovra il contagio della tisischezza*, etc.; Perouze 1785.

CHAVET, *de phthisi pulmonali hereditaria*; Munster 1787.

C. SMYTH, *an account of the effects of swinging*, etc.; London 1787; sur le balancement de l'escarpolette.

RYAN, *an inquiry in to the nature, causes and cure of the consumption of the lungs*, etc.; Lond. 1788.

CASTELLANI, *sulla pulmonare tisischezza*; 1791.

PORTAL, *observ. sur la nature et sur le traitement de la phthisie pulmonaire*; Paris 1792.

MAY, *essay on pulmonary consumptions*; Lond. 1792.

BAUMES, *de la phthisie pulmonaire*; Montp. an 111.

Car. Avec la rougeur de la langue et des gencives, la blancheur des dents, la coloration des joues, la vivacité des sens et une urine jaune-claire presque inodore; il y a toux, dyspnée,

amaigrissement successif porté jusques au marasme, quelquefois crachement de sang et expectoration d'abord visqueuse, ensuite purulente. La fin de la maladie est ordinairement marquée par quelques flux colliquatifs.

Rap. A. Toux phthisique; SAUV., cl. v, ord. 1, gen. v, esp. 17.

S-esp. I. Phthisie pulmonaire de naissance. Maladie connée et se développant successivement dans l'adolescence par les signes qui lui sont propres; PORTAL, *loc. cit.*, pag. 1, art. 1.

Phthisie pulmonaire; ROLLO, *traité du diabète sucré*, etc.; Paris, an vi, part. 1, pag. 77; et part. 11, pag. 131.

Phthisie pulmonaire tuberculeuse; BAUMES, *loc. cit.*, tom. 11, pag. 262, chap. 11.

Rap. A. Phthisie sèche; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

B. Phthisie humide; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

C. Dyspnée tuberculeuse; SAUV., cl. v, ord. 11, gen. VII, esp. 2.

S-esp. II. Phthisie hémoptique.

Phthisie pulmonaire marchant sous les apparences d'une hémoptysie.

Bibl. WAGNER, de hæmoptoes, imprimis vero habitualis seu phthisicæ..... curatione; Lipsiæ 1742; et coll. de HALLER, tom. II, pag. 277.

WERLHOFF, de phthisi ex hæmoptysi; opera medica, in-4.^o, pag. 791.

LEIDENFROST, de illâ hæmoptysi quam phthisis sequi solet, etc.; Duisbourg 1782.

DE MEZA, vis corticis peruviani suspecta in hæmoptoes et phthiseos curatione; acta societ. medic. Hauniensis, tom. I, pag. 40.

Car. Le sang sort moyennement, et quelquefois en petite quantité; mais il reparoît par périodes et donne lieu à une maladie constitutionnelle, tendant par elle-même à la pulmonie.

Rap. A. Hémoptysie habituelle; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. II, esp. 2.

B. Hémoptysie phthîsique; SAUV., loc. cit., esp. 9.

Var. A. Hémoptysie tuberculeuse; SAUV., loc. cit., esp. 10.

S-esp. III. Phthîsie colliquative.

Avec sueurs abondantes, écoulement copieux

d'urine , expectoration abondante et quelquefois des éfloreſcences.

Phthiſie ſcorbutique ; SAUV. , *loc. cit.* ,
eſp. 4.

Var. A. Diarrhée colliquative ; SAUV. , cl.
IX , ord. II , gen. XVI , eſp. 13.

B. Etisie éphidroſique ; SAUV. , cl. X , ord.
I , gen. I , eſp. 6.

Eſp. III. Hépatique.

Bibl. SCHROEDER , *de phthiſi ſect. I ; Gotting.* 1783.

Car. Douleur rongearite , mais ſourde et continue dans l'hypocondre droit , avec toux ſèche et vaine , fébricule fixe et erratique , redoublemens après le repas ; pour l'ordinaire avec inappétence abſolue , quelquefois avec la couleur ictérique du corps.

Eſp. IV. Ovairique.

Car. Douleur compressive et continue , plus ou moins obſcure dans l'une des régions iliaques , avec fébricule fixe ou erratique , paroxiſmes irréguliers et maraſme progressif.

Obs. Madame B. M. avoit présenté les symptômes qui caractérisent la phthisie ovarique; on avoit attribué sa maladie à une dyspepsie nerveuse; il y avoit en effet plusieurs indices dyspeptiques. La douleur sourde de la région iliaque droite se soutenoit avec une intensité variable; la fièvre étoit continue, lente, hectique. Des médecins consultants déclarèrent qu'il y avoit une phthisie hépatique; enfin la malade rendit des matières purulentes par le fondement, ce qui fit douter qu'il n'y eût quelque foyer dont le siège ne tomboit pas bien sous les sens. La malade succomba. Son corps fut ouvert en ma présence par M. *Montagnon*. A part les phénomènes propres au marasme, la poitrine étoit en bon état; le foie étoit volumineux, mais très-sain. L'ovaire droite seule présentoit un grand sac dont l'intérieur s'étoit fondu par la suppuration. La partie contiguë avec l'intestin rectum avoit formé adhérence avec lui; l'abcès avoit percé dans le centre de cette adhérence; et c'est par cette voie que le pus, dont une partie étoit repompée, s'évacuoit par intervalles par l'anus, notamment dans certaines positions.

Esp. V. Cellulaire.

Nota bene. Le siège de cette phthisie, qu'on ne doit pas confondre avec la phthisie cellulaire de DE HAEN, *rat. med.*, tom. III, cap. 5, pag. 89, occasionnée par une inflammation érythématique lente des bronches; est souvent dans la capacité abdominale; dans le tissu cellulaire des muscles adossés à l'épine; et qui communique, sous le ligament de poulpart, avec les muscles de la cuisse: elle est souvent la compagne des abcès profonds.

Car. Douleur plus ou moins vive dans toute autre partie qu'un organe; avec hecticie, sueurs nocturnes, diarrhée colliquative: il a quelquefois de la toux, même de la difficulté de respirer.

Gen. XXXVII. GASTROREXIE.

Eth. de *gaster*, ventre; et *orexis*, appétit.

Car. Desir extraordinaire des alimens liquides ou solides.

Esp. I. Boulimie.

Syn. Boulimie; SAUVAGES, cl. VIII, vésa.

nies ; ord. II , morosités ; gen. VIII. — LINNÉ ,
cl. V , mentales ; ord. III , pathétiques ; gen.
LXXIX. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. II ,
dysoréxies ; sect. I , appétits erronés ; gen. IOI.
— SAGAR , cl. XIII , vésanies , ord. II , mo-
rosités ; gen. VIII.

Bibl. F. LINDENER , *de fame caninâ* ; Halæ
1760.

Car. Appétit pour les alimens , plus grand
que l'estomac ne peut en digérer.

S-esp. I. Voracique.

Boulimie des gros mangeurs sans affection
sensible de l'estomac ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. 1.

Boulimie voracique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

Addéphagie ; VOGEL , cl. VII , hyperæsthè-
ses ; gen. CCXCVII.

S-esp. II. Cardio-syncopale.

Boulimie avec le sentiment d'une faim qui
menace de syncope ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. 2.

Boulimie cardialgique ; SAUV. , *loc. cit.* ,
esp. 2.

Bulime ; VOGEL , cl. VII , hyperæsthèses ;
gen. CCXCVI.

S-esp. III. Emétique.

Boulimie avec appétence d'une grande quantité de nourriture qu'on rejette aussitôt par le vomissement; CULLEN, *loc. cit.*, esp. 3.

— Boulimie canine; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

Cynorexie; VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses; gen. CCXCVIII.

Esp. II. Polydipsie.

Syn. Polydipsie; SAUVAGES, cl. VIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. IX. — LINNÉ, cl. V, mentales; ord. III, pathétiques; gen. LXXX. — VOGEL, cl. VII, hyperæsthèses; gen. CCXCV. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. II, dysorexies; sect. 1, appétits erronés; gen. CII. — SAGAR, cl. XIII, vésanies; ord. II, morosités; gen. IX.

Car. Desir excessif de la boisson.

Esp. III. Antropophagie.

Bibl. Antropophagie, crime et non, selon qu'on l'envisage; GRÜNNER, *almanach pour les médecins*, en allem., ann. 1792, art. 13.

Car. Desir insurmontable de manger de la chair humaine.

Gen. XXXVIII. ALGIE.

Eth. d'algeia, douleur.

Syn. Douleurs; SAUVAGES, cl. VII. — LINNÉ, cl. IV. — VOGEL, cl. IV. — SAGAR, cl. IV. — MACBRIDE, cl. I, universelles; ord. IV.

Néuralgie; CHAUSSIER, *tableau synoptique de la néuralgie, suivant la nomenclature méthodique de l'anatomie.*

Bibl. G. E. HAMBERGER, *de dolore in genere*; Jenæ 1750.

J. H. FURSTENAU, *de doloribus*; Rintelii 1753.

A. E. BUCHNER, *de salutaribus et nocivis dolorum effectibus*; Halæ 1768.

N. DIMSDALE, *de dolore*; Edinb. 1771.

M. A. PETIT, discours sur la douleur; Lyon an VII.

Car. Douleur notable, fixe, souvent irradiante; plus ou moins vive, obtuse ou déchirante; quelquefois avec élancemens, pulsations et tiraillemens dans une partie du corps, sans indices d'inflammation et sans fièvre du moins essentielle.

Rap. A. Douleur spastico-flatulente des premières voies; D. E. ROSEN, *de doloribus spastico-flatulentibus primarum viarum*; Lond. Goth. 1771.

Formes.

Sor. 1. Syncope doloïrique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 2.

2. Vomissement doloïrique; G. HUNTER, *giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo sæcolo*; tom. III, Venet. 1786, pag. 488.

3. Oubli céphalalgique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. 6.

4. Insomnie doloïrique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXII, esp. 6.

5. Éclampsie doloïrique; affection convulsive de la maladie de Roanne; J. B. DESGRANGES, *journal de medec.*; mai 1793, tom. XCIV, pag. 3; et juin 1793, *ibid*, pag. 126.

Esp. I. Céphalalgie.

Eth. de *kephalos*, tête; et *algeia*, douleur.

Bibl. POLZA, *de dolore capitis*; coll. d'EYEREL, tom. II, 1789, pag. 173.

Car. Douleur plus ou moins forte , occupant quelque partie de la tête.

S-esp. I. Gravative.

Syn. Douleur de tête , SENNERT , tom. III , pag. 192.

Douleur céphalique ; FR. HOFMAN , tom. VI , pag. 247.

Céphalalgie ; SAUVAGES , cl. VII , douleurs ; ord. II , de tête ; gen. XI. — LINNÉ , cl. IV , douloureuses ; ord. I , intrinsèques ; gen. XL. — VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen. CXL. — SAGAR , cl. IV , douleurs ; ord. II , de tête ; gen. XI.

Pesanteur , *gravedo* , LINNÉ , cl. IV , douloureuses ; ord. I , intrinsèques ; gen. XLII.

Carebarie ; VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen. CXLIV.

Bibl. N. G. BALEMANN , *de cephalalgia* ; imprimisque illâ , quæ consensualis ex abdomine est ; Helmstadt 1755.

Car. Pesanteur de tête , ou sensation incommode dans laquelle , il semble que la tête soit intérieurement distendue , enflée et comme surchargée.

Rap. A. Céphalalgie pulsative ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6.

B. Céphalalgie rhumatique ; TODE , *acta soc. med. Haun.* , tom. 1 , pag. 99.

S-esp. II. Tensive.

Syn. Céphalée ; SAUVAGES , cl. VII , douleurs ; ord. 11 , de tête ; gen. XII. — VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen. CXLI. — SAGAR , cl. IV , douleurs ; ord. 11 , de tête ; gen. XII.

Bibl. TISSOT , de morbo nigro , schirris viscerum , cephalæa , etc. ; Lausan. 1760 ; et coll. de SANDIFORT , tom. 1 , pag. 67 ; en français par VICAT.

Car. Douleur vive et tensive , aiguë et continue de la tête , s'irritant à la plus légère occasion.

Rap. A. Céphalée sereuse ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7.

S-esp. III. Fixe.

Syn. Migraine , hemicrania ; SAUVAGES , cl. VII , douleurs ; ord. 11 , de tête ; gen. XIII. — LINNÉ , cl. IV , douloureuses ; ord. 1 , intrinsèques ; gen. XLI. — VOGEL , cl. IV , dou-

leurs; gen. CXLIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. II, de tête; gen. XIII.

Clou; *clavus*; VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CXLII.

Bibl. TISSOT, de la migraine; *traité des nerfs*, chap. XXII.

Car. Douleur aiguë et périodique, occupant fixement les deux côtés de la tête, sur-tout les tempes, le front, les arcades sourcilières.

Rap. A. Migraine lunatique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 10.

Esp. II. *Prosopalgie*.

Eth. de *Prosopon*, face, visage; et *algia*, douleur.

Syn. Tic douloureux.

Bibl. PUJOL, essai sur la maladie de la face, nommée le *tic douloureux*; Paris 1787.

J. M. WEISSE, de *dolore faciei*, *prosopalgia dicto*; Jenæ 1796; et coll. de BRERA, tom. IV, pag. 134.

Car. Vibrations momentanées et douloureuses qui, comme des traits électriques, se font sentir de temps en temps dans certains lieux déterminés

déterminés de la face ou sur tout autre point des tégumens de la tête, et qui se joignent le plus souvent à des mouvemens convulsifs des muscles limitrophes; sans aucun vice extérieur et sensible à la vue pendant la durée des élancemens spasmodiques, et sans aucun reste de douleur ni de sensibilité morbide dans les lieux précédemment affectés lorsque la douleur est dissipée.

Esp. III. Otalgie.

Eth. d'otos, oreille; et *algeia*, douleur.

Syn. Otalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. II, de la tête; gen. XV. — LINNÉ, cl. IV; douloureuses; ord. I; intrinsèques; gen. XLIV. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CXLVIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. II, de la tête; gen. XV. — MACBRIDE, cl. I, universelles; ord. IV, douleurs; gen. VI.

Car. Douleur plus ou moins violente de l'oreille, sans indices d'inflammation.

Esp. IV. Ophtalgie.

Eth. d'ophtalmos, œil; et *algeia*, douleur.

Syn. Ophtalmodynîe; PLENCK, *de morbis oculorum*; Viennæ 1783, pag. 83.

Car. Douleur plus ou moins intense de l'œil, sans inflammation.

Rap. A. Ophthalmodynïe spasmodique ; PLENCK, *loc. cit.*, esp. 3.

Esp. V. Odontalgie.

Eth. d'odon, dent ; et *algeia*, douleur.

Syn. Odontalgie ; SAUVAGES, cl. VII, douleurs ; ord. II, de la tête ; gen. XVI. — LINNÉ, cl. IV, douloureuses ; ord. I, intrinsèques ; gen. XLV. — VOGEL, cl. IV, douleurs ; gen. CXLV. — CULLEN, cl. I, pyrexies ; ord. II, phlegmasies ; gen. XXIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs ; ord. II, de la tête ; gen. XVI. — MACBRIDE, cl. I, universelles ; ord. IV, douleurs ; gen. V.

Bibl. JOURDAIN, nouveaux élémens d'odontalgie ; Paris 1756.

F. E. GLAUBRECHT, *analecta de odontalgia, ejusque remediis variis, præcipue magnetæ*, Argentor. 1765.

MAHON, le dentiste observateur ; Paris, an VI.

Car. Douleur des dents et des gencives.

I. *Odontalgie (gingivale) par le travail intérieur des dents.*

Syn. Dentition difficile.

Odaxisme (d'*odaxismos* , prurit douloureux qui se fait sentir aux gencives avant la sortie des dents) ; VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen. CXLVII.

Bibl. C. CH. SCHMIEDEL , de *dentitione præsertim infantum difficili* ; Erlang. 1751.

BRUNNER , de *eruptione dentium lacteorum* ; coll. de WASSERBERG , tom. I , 1775 , pag. 303.

Car. Gonflement douloureux des gencives avec anxiétés , salivation , diarrhée , etc. , dans les enfans qui ont à percer des dents.

S-esp. I. Nerveuse.

Odaxisme nerveux , provenant d'une extrême mobilité du système , et attaquant principalement les enfans qui ont une grosse tête.

S-esp. II. Maxillaire.

Odaxisme maxillaire , occasionné par une trop forte résistance des gencives.

Rap. A. Odontalgie par la dentition ; SAUV. , cl. VII , ord. II , gen. XVI , esp. 5.

Formes.

Sor. 1. Vomissement par la dentition ; SAUV., cl. IX , ord. II , gen. XIII , esp. 4.

2. Eclampsie par la dentition ; SAUV., cl. IV , ord. IV , gen. XVIII , esp. 13.

3. Diarrhée par la dentition ; SAUV., cl. IX , ord. II , gen. XIII , esp. 15.

4. Toux par la dentition ; SAUV., cl. V , ord. I , gen. V , esp. 12.

II. *Odontalgie* (dentaire) *par quelque lésion extérieure de la dent.*

Syn. Rhumatisme odontalgique ; HOFFMAN , tom. II , pag. 330.

Douleur ou mal des dents ; BELL , *cours de chirurgie* , tom. IV , pag. 145.

Car. Douleur distensive , pulsative ou lancinante et rongeante des mâchoires , le plus souvent avec insomnie , quelquefois avec enflure extérieure et salivation.

S-esp. I. Carieuse.

Douleur produite par la carie d'une ou de plusieurs dents.

Odontalgie carieuse ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

Mal de dents qui survient quand le nerf est à nu ; BELL , *loc. cit.* , esp. 1.

Rap. A. Salivation carieuse ; SAUV. , cl. IX , ord. III , gen. XXIII , esp. 16.

S-esp. II. Maxillaire.

Douleur odontalgique sans carie. Douleur de dents produite par les affections des parties éloignées ; BELL , *loc. cit.* , esp. 3.

Esp. VI. Œsophalgie.

Eth. d'oio , je porte ; *phago* , je mange ; et *algeia* , douleur.

Syn. Dysphagie (de *dys* , difficilement ; et *phago* , je mange.) ; SAUVAGES , cl. VII , douleurs ; ord. III , pectorales ; gen. XVII. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. III , dyscinésies ; gen. CXV. — SAGAR , cl. VI , suppressions ; ord. II , des choses qu'on avale ; gen. VII.

Bibl. VATER , de *deglutitionis difficilis et impeditæ causis abditis* ; Viteb. 1750 ; et coll. de HALLER , tom. I , pag. 577.

Car. Difficulté douloureuse de la déglutition , sans gêne de la respiration.

S-esp. I. Libre.

Difficulté d'avaler , sans qu'aucun corps étranger obstrue le passage de la déglutition.

Rap. A. Déglutition difficile , provenant d'un spasme de l'œsophage ; TH. PERCIVAL, *medic. transact.*, etc., vol. 11 , art. 8 , pag. 90.

S-esp. II. Empêchée,

Difficulté de la déglutition , occasionnée par des corps étrangers accidentels qui irritent l'œsophage.

Rap. A. Dysphagie mécanique ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. 3.

B. Dysphagie de déglutition ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 10.

C. Esquinancie par déglutition ; SAUV. , cl. 111 , ord. 111 , gen. XX , esp. 9.

Esp. VII. *Sternalgie*.

Eth. de *sternum* , et *algeia* , douleur.

Syn. *Angina pectoris* ; HEBERDEN , *medical transactions* , etc. , volume the second , art. 6. — *Ibid* vol. the third , art. 1. — WALL , *ib.* , art. 2 ; et *medical tracts* , etc. , art. 8. — SMITH dans MACBRIDE , *a methodical introduction* , etc. — BERGER , *kongl vetenskaps akademien* ,

etc. , 1780 , art. 3. — WICHMANN , idées sur le diagnostic ; *biblioth. german.* , tom. 11 , pag. 226.

Bibl. ELSNER , *abhandlung uber die brustbræune* , etc. ; Königsberg 1778 ; traité de l'*angina pectoris*.

G. BUTTER , *a treatise on the disease commonly called angina pectoris* , etc. London 1791.

Car. Sentiment extrêmement pénible , d'abord peu durable , menaçant de suffocation , sans changement apparent dans l'acte de la respiration venant subitement , reprenant par accès , ayant son siège variable dans le sternum , et causant , dans la suite , une douleur spasmodique à l'un des bras ou aux deux ensemble , sur-tout au lieu de l'insertion du muscle pectoral à l'humérus.

Le paroxisme prend ordinairement en marchant , et cesse lorsqu'on s'arrête , au moins dans les premiers temps de la maladie.

Obs. Le citoyen F..... , architecte de Montpellier , éprouvoit depuis environ un an , lorsqu'il marchoit , une douleur spasmodique très-forte qu'il rapportoit au sternum , et qu'il éprou-

voit en marchant , mais d'une manière si vive qu'il étoit forcé de s'arrêter , crainte de suffoquer. La douleur s'étendoit comme un trait jusqu'à l'épaule. Arrêté , la douleur se dissipoit , pour revenir de temps en temps , par accès très-courts , lorsque le malade marchoit plus ou moins vite. Les accès tendoient de plus en plus à se rapprocher , et la maladie avoit été méconnue par ceux qui avoient été consultés avant moi. Je ne pus méconnoître la sternalgie (a). Je conseillai de suite la méthode de quelques médecins anglais qui emploient deux vésicatoires ou deux cautères appliqués à un bras et à une cuisse en sautoir , et l'usage interne du vin antimonié d'Huxam ; ce traitement fut sans succès. J'y substituai le musc à dose graduellement augmentée : l'efficacité de ce médicament n'a point été problématique.

Esp. VIII, Gastralgie.

Eth. de *gaster* , estomac ; et *algeia* , douleur.

Car. Douleur quelconque fixée dans une partie de l'estomac.

(a) On pourroit appeler aussi cette maladie *asthme sternal* ; *apnose*.

100. S-esp. I. Cardialgie.

Eth. de *cardia*, nom de l'orifice œsophagien de l'estomac; et *algeia*, douleur.

Syn. Cardialgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs, ord. IV, abdominales internes; gen. XX. — LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. XLVIII. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLVIII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XIX.

Bibl. G. G. RICHTER, de *cardialgiâ*; Gotting. 1750; et *opusc. medic.*; tom. I, pag. 389.

J. J. F. B. A MILLER, de *cardialgiâ*; Vindobonæ 1762.

P. I. HARTMANN, de *cardialgiâ*, *colicâque funestâ ab ingestis ortâ et multiplici spasmodorum genere imprimis St-Viti stipatâ*; Traj. ad Viad. 1775.

W. TRNKA DE KRZOWITZ, *historia cardialgiæ*, etc.; Vindobonæ 1785.

STOLL, de *cardialgiâ*; coll. d'EYEREL, tom. I, pag. 528.

Car. Douleur notable et soutenue de l'épigastre, avec vives anxiétés et menace de syncope.

Var. A. Cardialgie flatulente ; SAUV., loc. cit., esp. 3. — H. MARCHAND, de cardialgiâ flatulentâ ; Argentor. 1754.

Flatulence infantile ; SAUV., cl. IX, ord. IV, gen. XXXIV.

B. Cardialgie infantile ; SAUV., loc. cit., esp. 11.

Colique lactique ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 20. — BUCCHAVE, *colicæ lactentium cura ; acta reg. soc. med. Haun.*, tom. 1, pag. 317, art. XXIV.

C. Cardialgie organique ; BERGER, de cardialgiâ habituali ex perverso ventriculi situ ; acta soc. med. Haun., vol. 1, pag. 171.

S-esp. II. Gastrodynie.

Eth. de gastrôn, estomac ; et odyne, douleur.

Syn. Gastrodynie ; SAUVAGES, cl. VII, douleurs ; ord. IV, abdominales internes ; gen. XXI. — SAGAR, cl. IV, douleurs ; ord. IV, abdominales internes ; gen. XX.

Car. Affection plus ou moins douloureuse de l'estomac, sans menace de défaillances.

Var. A. Gastrodynie flatulente ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

B. Gastrodynie périodique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7.

C. Gastrodynie astringente , serrement d'estomac ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 9.

D. Gastrodynie attérente ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 10.

S-esp. III. Pyrose.

Eth. de *pyr* , feu.

Syn. Pyrose ; SAUVAGES , cl. VII , douleurs ; ord. III , de poitrine ; gen. XVIII. — CULLEN , cl. II , névroses ; ord. III , spasmes ; sect. III , des fonctions naturelles ; gen. LVIII. — SAGAR , cl. IV , douleurs ; ord. III , de poitrine ; gen. XVII.

Soda ; LINNÉ , cl. IV , douleurs ; ord. I , intrinsèques ; gen. XLVII. — VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen. CLIV. — CULLEN , cl. II , névroses ; ord. II , adynamies ; gen. XLV.

Car. Chaleur anxieuse de l'épigastre , avec ascension d'une humeur qui remonte de temps en temps au gosier , et y laisse pour l'ordinaire une âcreté brûlante.

Rap. A. Pyrose vulgaire ; SAUV., *loc. cit.*,
esp. 1.

Cardialgie sputatoire ; SAUV., cl. VII, ord.
IV, gen. XX, esp. 5.

Var. A. Pyrose suédoise ; SAUV., *loc. cit.*,
esp. 4.

Formes.

Sor. 1. Bulimie acidique ; SAUV., cl. VIII,
ord. II, gen. VIII, esp. 7.

2. Salivation pyrosique ; SAUV., cl. IX, ord.
III, gen. XXIII, esp. 2.

Esp. IX. Entéralgie.

Eth. d'*enteros*, intestin ; et *algeia*, douleur.

Car. Douleur notable, fixée dans une partie
quelconque des intestins.

S-esp. I. Cholérée.

Eth. de *chole*, bile ; et *rhæo*, je coule.

Syn. Diarrhée cholique ; JUNKER, *tab. CXII.*

Cholera ; SAUVAGES, cl. IX, flux ; ord. II,
de ventre, sect. II, non sanguinolens ; gen.
XV. — LINNÉ, cl. IX, évacuatoires ; ord. III,
de l'abdomen ; gen. CLXXXVII. — VOGEL, cl.

II, flux; ord. II, apocénoses; gen. CX. —
 CULLEN, cl. II, névroses; ord. III, spasmes;
 sect. III, des fonctions naturelles; gen. LX.
 — SAGAR, cl. V, flux; ord. III; de ventre
 non sanglans; gen. XV.

Bibl. J. F. MESSER, *de cholera morbo*;
Halæ 1710; et coll. de HALLER, tom. III,
 pag. 73.

A. VATER, *de cholera humidâ*; *Viteberg.*
 1733.

J. H. J. BAVER, *de cholera*; *Altdorf.* 1751.

MAYER HIRSCH, *de cholera humidâ*; *Gissæ*
 1751.

B. L. TRALLES, *historia cholerae atrocis-*
simæ, etc.; *Vratislaviæ* 1753.

P. H. ISENBERN, *de cholera*; *Tubecæ* 1759.

C. A. APPUHN, *de cholera humidâ*; *Götting.*
 1760.

C. F. KALTSCHMID, *de cholera*; *Jenæ* 1760.

H. L. HOFFMANN, *de cholera morbo*; *Vind.*
 1761.

J. SIDREN, *de cholera*; *Upsal.* 1768.

J. LEMANN, *de cholera*; *Edinb.* 1778.

E. B. MÉTFORD, *de cholera*; *Edinb.* 1777.

STOLL, *de cholera*; coll. d'EYEREL, tom.
 II, pag. 240.

Car. Fortes anxiétés avec vomissemens et déjections fréquens d'une matière bilieuse, il y a en même temps tranchées, abattement des forces, et pour l'ordinaire crampes dans les extrémités inférieures.

Rap. A. Cholérée spontanée; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

B. Cholérée indienne; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

C. Hématémèse cholérique; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. IV, esp. 9.

S-esp. II. Iléose.

Eth. d'eileos, de *ano eilesis*, révolution de l'intestin; ou d'eilestai, convulsion de l'intestin; ou d'ileo, qui est le nom d'un intestin.

Syn. Iléosie; THIERRY, observations de physique et de médecine, faites en différens lieux de l'Espagne, etc.; Paris 1791, tom. 1, pag. 131.

Ilæus, ilée; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. 11, de ventre; sect. 11, non sanguinolens; gen. XIV. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLXII. — SAGAR, cl. V; flux; ord. 111, de ventre non sanglans; gen. XIV.

Iliaque, *iliaca*; LINNÉ, cl. IX, évacua-

toires ; ord. III, de l'abdomen ; gen. CLXXXVI,
 Passion iliaque ; JUNCKER, *tab. CVII.*
Volvulus, convolvulus, miserere.

Bibl. J. G. LEIDENFROST, *de volvulo intestini singulari* ; Duisburg. 1750.

C. F. KALTSCHMID, *de ileo*, Jenæ 1753.

R. INNES, *de ileo* ; Edinb. 1753.

J. E. HEBENSTREIT, *progr. aetii amideni anecdoton lib. IX, cap. XXVIII, exhibens tenuioris intestini morbum, quem ileon et chondapsum dicunt, etc.* ; Lips. 1757.

J. BOOT, *de ileo* ; Edinb. 1761.

J. G. GALLESKY, *abhandlung von miserere, oder von der darmgicht, etc.* ; Mitau und Riga 1767.

J. P. BEUCKE, *de ileo* ; Argentor. 1768.

L. GROLL, *de volvulo* ; Harderovic. 1765.

P. A. GADOLLA, *de vomitu intestinorum, sive volvulo confirmato* ; Viennæ 1771.

J. SIDREN, *de passione iliaca* ; Upsaliæ 1775.

C. F. SEYSIRIAT, *de passione iliaca* ; Monsp. 1776.

Car. Douleurs abdominales avec borborigmes, constipation opiniâtre et vomissement.

par lequel on rend, sur la fin, des matières fécales.

Var. A. Iléose spasmodique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

Rap. A. Vomissement iléosique; SAUV., *ch. ix*, ord. *ii*, gen. *xiii*, esp. 24.

B. Iléose indien; SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

B. Iléose volvuleux; avec engagement réciproque ou intus-susception des intestins; SAUV., *loc. cit.*, esp. 7.

S-esp. III. Colique.

Syn. Colique; SAUVAGES, *cl. vii*, douleurs; ord. *iv*, abdominales internes; gen. *xxii*. — LINNÉ, *cl. iv*, douloureuses; ord. *i*, intrinsèques; gen. *l*. — VOGEL, *cl. iv*, douleurs; gen. *clx*. — CULLEN, *cl. ii*, névroses; ord. *iii*, spasmes; sect. *iii*, des fonctions naturelles; gen. *lix*. — SAGAR, *cl. iv*, douleurs; ord. *iv*, abdominales internes; gen. *xxi*.

Bibl. J. CH. STOCK, *de clysterum emollientium usu in colicâ suspecto*; Jenæ 1757.

T. VAN ZELST, *de podagra et dolore colico*, etc.; Lausan. 1760.

PH. A. BOEHMER, *de colicâ*; Halæ 1772.

G. H. LANGGUTH, *de diversâ colicam curandi methodo*; Vittemb. 1762.

A. H. DULHAUSEN, *de doloribus intestinorum, vulgo colicis dictis*; Lugd. Batav. 1750.

F. G. HERNANDEZ, *tratado del dolor colico, etc.*; Madrid 1750.

M. REYE, *de dolore colico*; Gotting. 1769.

B. THOMAS, *de colicâ*; Edinb. 1770.

P. J. HARTMANN, *de cardialgiâ colicâque funestâ ab ingestis ortâ et multiplici spasmodorum genere, imprimis St-Viti stipatâ*; Traj. ad Viad. 1775.

C. C. R. SIEMERLING, *de colicâ ejusque speciebus*; Gotting. 1778.

E. B. METFORD, *de colicâ*; Edinb.; coll. de WEBSTER, 1781, tom. 11, ord. IV, maladies nerveuses, diss. 4, pag. 60.

STOLL, *de colicâ*; coll. d'EYEREL, tom. 11, pag. 115.

Car. Douleurs du bas-ventre, se faisant particulièrement ressentir autour du nombril avec un sentiment plus ou moins aigu de tortillement.

Var. A. Colique spasmodique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 7.

Colique des nourrissons; SAUV., *loc. cit.*

Tom. II.

esp. 20. — BUCCHAVE, traitement de la colique des nourrissons; *acta reg. soc. reg. Haun.*, vol. 1, pag. 317, art. XXIV. — EBERLE, de *colicâ infantum*; *Argentor.* 1783.

B. Colique bilieuse; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5. (Les vomissemens bilieux ne sont ici que l'effet du spasme, cause de la colique, suivant CULLEN.)

C. Colique venteuse; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

Iléose physode; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIV, esp. 9.

Cholérée sèche; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XV, esp. 2.

Iléose météorique; GORCY, *journ. de méd.*, tom. XC, pag. 420.

Voy. CUNRAD, de *colicâ flatulentâ*; *Regiom.* 1698. — CAMERARIUS, de *colicâ spasmodicâ*; *Tubing.* 1720. — LOHR, de *colicâ flatulentâ Gedanensibus familiari*; *Erford* 1726. — NEUHAUS, *casus colicæ hystericæ cum epicrîsi*; *Argent.* 1769.

S-esp. IV. Tenesme.

Eth. en grec *teinesmos*, de *teino*, je tends.

Syn. Tenesme; SAUVAGES, cl. IX, flux;

ord. II, de ventre; sect. I, non sanglans;
 gen. XIX. — LINNÉ, cl. IX, évacuatoires; ord.
 III, abdominales; gen. CXCIV. — VOGEL,
 cl. IV, douleurs; gen. CLXVI. — SAGAR, cl. V,
 flux; ord. III, de ventre non sanguinolens;
 gen. XIX.

Car. Envie fréquente, mais inutile, d'aller
 à la selle, avec effort douloureux et évacua-
 tion d'une petite quantité de glaires.

Var. A. Tenesme spontané; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.

B. Tenesme indien; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

C. Tenesme oriental; SAUV., *loc. cit.*,
 esp. 10.

Esp. X. Proctalgie.

Eth. de *proctos*, anus; et *algeia*, douleur.

Syn. Proctalgie; SAUVAGES, cl. VII, dou-
 leurs; ord. V, externes et des membres; gen.
 XXXII. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. V,
 locales des parties externes; gen. XXX. — MAC-
 BRIDE; cl. I, universelles; ord. IV, douleurs;
 gen. XII.

Proctica; LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord.
 I, intrinsèques; gen. LIX.

Clunésie ; VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen.
CLXVII.

Car. Douleur à l'extrémité du rectum sans
tenesme.

Var. A. Protalgie intertrigineuse (écorchure
à l'anus) ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

B. Proctalgie brésilienne (le ver des Por-
tugais , finissant , après des douleurs énormes ,
par l'ulcère et la mort) ; SAUV. , *loc. cit.* ,
esp. 6.

Esp. XI. Hépatalgie.

Eth. d'*ipar* , foie ; et *algeia* , douleur.

Syn. Hépatalgie ; SAUVAGES , cl. VII , dou-
leurs ; ord. IV , abdominales internes ; gen. XXIII.
— SAGAR , cl. IV , douleurs ; ord. IV , abdo-
minales internes ; gen. XXII.

Hépatique , *hepatica* ; LINNÉ , cl. IV , dou-
loureuses ; ord. I , intrinsèques ; gen. LI.

Car. Douleur fixe dans l'hypocondre droit ;
affectant le foie , sans indices d'inflammation
ou d'obstruction manifeste dans cet organe.

Var. A. Hépatalgie infarctive ; SAUV. , *loc.*
cit. , esp. 3.

B. Hépatalgie pétitienne ou de PETIT (par le gonflement et l'étranglement de la vésicule du fiel); SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

C. Hépatalgie ictérique (colique hépatique avec jaunisse , ictère spasmodique , jaunisse nerveuse); BRUNING, *de ictero spasmodico infantum*; *Vesaliæ et Lipsiæ* 1773.

Esp. XII. Splénalgie.

Eth. de *splin*, rate; et *algeia*, douleur.

Syn. Splénalgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXIV. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXIII.

Splénique, *splenica*; LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. LII.

Car. Douleur fixe dans l'hypocondre gauche, occupant la rate sans indices d'inflammation et d'obstruction, sans fièvre vive.

Nota bene. La contraction spasmodique et la rénitence du foie dans l'hépatalgie, et de la rate dans la splénalgie, peuvent facilement en imposer pour une obstruction.

Esp. XIII. Néphralgie.

Eth. de *nephros*, rein; et *algeia*, douleur; *nephros* provenant lui-même de *nephrein*, pleuvoir.

Syn. Néphralgie; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. IV, abdominales; gen. XXV. — SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. IV, abdominales internes; gen. XXIV.

Car. Douleur fixe dans les lombes, ayant son siège dans les reins, sans symptômes de *néphritie* (voy. le Gen. LVIII, *Esp.* XI, tom. III, pag. 207), de *calcul* (Gen. XLIX; *Esp.* IX, tom. III, pag. 106), ni de *lumbagie* (voy. Gen. IX, *Esp.* III, tom. I, pag. 299).

Esp. XIV. Cystalgie.

Eth. de *kysis*, vessie; et *algeia*, douleur.

Car. Douleur spasmodique de la vessie.

Esp. XV. Mictalgie.

Eth. du latin *meire*, pisser; *mictio*, l'action de pisser; et *algeia*, douleur.

Syn. Dysurie; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord.

III, sérieux; gen. XXVII. — LINNÉ, cl. IV, douloureuses; ord. I, intrinsèques; gen. LVII. — VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CLXIV. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. V, épischèses; gen. CXXIV. — SAGAR, cl. VI, suppressions; ord. I, d'humeurs sérieuses; gen. IV.

Bibl. A. WEGELIN, *de dysuriâ*; Argentor.

1779.

Car. Douleur et ardeur de l'urètre pendant le passage des urines.

Var. A. Dysurie primitive; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

Dysurie ardente (ardeur d'urine sans maladie de vessie évidente, et sans symptômes locaux d'affection syphilitique); CULLEN, *loc. cit.*, esp. 1.

B. Dysurie coïtique; provenant d'un échauffement extrême dans l'acte vénérien.

C. Dysurie néonymphale (arrivant aux nouvelles mariées qui ont affaire à un homme vigoureux); SAUV., *loc. cit.*, esp. 14.

D. Dysurie chronique (familière aux gens qui prennent l'âge de retour); CH. BISSET, *medical essays and observations*; Newcastle 1766, pag. 151, art. 13.

Esp. XVI. Élytralgie,

Eth. d'elytron , vagin ; et *algeia* , douleur.

Syn. Pudendagre ; SAUVAGES , cl. VII , douleurs ; ord. V , externes et des membres ; gen. XXXIII. — SAGAR , cl. IV , douleurs ; ord. V , locales des parties externes ; gen. XXXI.

Ædema ; VOGEL , cl. IV , douleurs ; gen. CLXVIII.

Bibl. M. BERDOE , *an essay on the pudendagra* ; Lond. 1772.

Car. Douleur du vagin et des grandes lèvres , sans dysurie.

Esp. XVII. Métralgie,

Eth. de metra , matrice ; et *algeia* , douleur.

Syn. Hystéralgie (d'hysteros , matrice ; et *algeia* , douleur) ; SAUVAGES , cl. VII , douleurs ; ord. IV , abdominales internes ; gen. XXVII. — LINNÉ , cl. IV ; douloureuses ; ord. I , intrinsèques ; gen. LV. — VOGEL , cl. IV , douleurs , gen. CLXIX. — SAGAR , cl. IV , douleurs ; ord. IV , abdominales internes ; gen. XXV.

Car. Douleur fixe dans l'hypogastre , ayant

son siège dans la matrice , sans apparence d'accouchement et sans fièvre inflammatoire.

Rap. A. Métralgie après l'accouchement ;
BALDINGER , *de doloribus post partum ; Jena*
1770.

Esp. XVIII. Didymalgie.

Eth. de *didymos* , double , jumeau ; nom affecté aux testicules ; et *algeia* , douleur.

Car. Douleur des testicules.

Esp. XIX. Arthronalgie.

Eth. d'*arthron* , articulation ; et *algeia* , douleur.

Syn. Entorses ; *distorsio*.

Bibl. P. L. DAGOREAU , dissert. sur les entorses ; *Paris* an X-1802.

Car. Distension violente de l'appareil fibreux qui environne et affermit les articulations , accompagnée de douleur et de gonflement , et toujours produite par un mouvement forcé.

S-esp. I. Entorse avec irritation.

Premier temps ou premier degré de l'arthronalgie.

Car. Irritation , douleur , gêne des mouvemens , engorgement de l'articulation.

S-esp. II. Entorse avec inflammation.

Second temps ou second degré de l'arthronalgie.

Car. Gonflement de toute l'articulation , avec douleurs vives et continues , progrès de l'engorgement , chaleur incommode , rougeur et fièvre.

S-esp. III. Entorse avec suppuration.

Troisième temps ou temps chronique de l'arthronalgie.

Car. L'engorgement qui se dissipoit augmente ; une douleur sourde se fait sentir seulement après la fatigue du membre ; elle augmente , il survient une tumeur qui blanchit , abcède , s'ouvre par plusieurs trous qui deviennent fistuleux et qui souvent se compliquent de carie.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES

DU TOME SECOND.

*EXPOSÉ méthodique des classes, des genres,
des espèces et des formes des maladies.*

CLASSE DEUXIÈME.

Oxigénèses.

THÉORIE de cette classe, pag. 5-26.

Les considérations générales relatives à l'action de l'oxigène sont calquées sur celles du calorique, 6.

Rôle important que joue l'oxigène, 7.

Comment il parvient dans le corps des animaux, et phénomènes dépendans de la décomposition du gaz oxigène, 7-8.

L'oxigène est stimulant, condensant, fluidifiant, colorant ; comment et pourquoi ? 9.

De sa fixation résulte la combustion ; l'oxide, l'acide, le sel en sont les produits, *ib.*

Phénomènes dus à la respiration du gaz oxigène, 9-10.

La respiration tend-elle à échauffer ou à rafraîchir, 10-11.

Idées des anciens sur le *pneuma*, 11.

Effets généraux de l'oxigène, 13.

Utilité de la réunion des gaz oxigène et azote, *ib.*

Le premier de ce gaz est seul considéré dans les phénomènes de la respiration, 14.

Son action lorsqu'il surabonde, *ib.*

Rapport qui existe entre cette action et les maladies inflammatoires, 15.

Utilité et influence de la lumière dans l'oxigénation, 16.

Différence qu'on doit trouver entre les inflammations phlegmoneuses et les inflammations érysipélateuses, 17.

L'oxigénation pathologique est prouvée par la formation des acides, 19.

Effets résultans de l'oxigène en excès ou en défaut, 20.

L'augmentation de l'oxigène donne lieu à l'accroissement de la force de cohésion, aux maladies par excès de ton, *ib.*

La diminution de l'oxigène influe sur l'augmentation de l'hydrogène et du carbone, 21.

Énoncé des faits qui le confirme, 21-22.

Maladies dues à l'oxigène en excès, 22.

Affections morbifiques dépendantes de l'oxigène en défaut, 23.

Division naturelle de la classe des *oxigénèses* en deux sous-classes, 23.

La première par *suroxigénation*, *ib.*

La deuxième par *désoxigénation*, *ib.*

Utilité de cette division pour la pratique, *ib.*

Et simplicité des préceptes médico-chimiques, 24.

Réflexions et preuves directes en faveur de ces préceptes, fournies par le portrait d'HIPPOCRATE, *ib.*

SOUS-CLASSE PREMIÈRE.

Désoxigénèses.

Énonciation des genres qui, composant cette sous-

classe, constituent depuis le genre XIII jusqu'au genre XXIII de la distribution nosologique, 26.

Et donnent onze genres qui sont l'anémie, la cyanose, la blennose, l'adynamie, la gastrose, l'helminthèse, le stuporisme, la démence, le goître, la dyscinie et la véranie, *ib.*

Genre XIII. Anémie, 27. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (a), *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapport, *ib.*

Genre XIV. Cyanose, 27. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Mélactère nuancé, 28. — B. Périodique, *ib.*

Genre XV. Blennose, 28. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Pyrétique, 29. — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 30.

Sous-espèce I. Continue, 30. — Rapports, *ib.* — Variétés, *ib.*

Sous-espèce II. Intermittente, 30. — Variété A. Quotidienne, 31. — B. Quarte, *ib.*

Sous-espèce III. Rémittente, 31. — Rapports, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce II. Blennose apyrétique, 32. — Caractère, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes (b), 32-35.

Espèce III. Blennose fluante, 35. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

(a) F. FORKENBECK, *dissert. inquirens causam perfectæ depletionis vasorum in cadavere detectæ*, etc.; Harderwick 1779; et coll. de BALDINGER, vol. III, pag. 157.

(b) WICHELHAUSEN, *de phthisi pituitosâ*; Götting. 1783.

Sous-espèce I. Rinorrhée, 36. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce II. Cystirrhée, 36. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, *ib.* — Bibliographie, 37. — Caractère,
ib. — Rapports (a), *ib.*

Sous-espèce III. Phallorrhée, 37. — Ethymologie,
ib. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce IV. Métorrhée, 38. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, *ib.* — Bibliographie (b), *ib.* — Caractère,
39. — Rapport, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Sous-espèce V. Elytrorrhée, 39. — Ethymologie, *ib.*
— Caractère, 40.

Sous-espèce VI. Proctorrhée, 40. — Ethymologie, *ib.*
Synonymie (c), *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapport, *ib.*

Genre XVI. Adynamie, 41. — Ethymologie, *ib.* —
Synonymie, *ib.* — Bibliographie (d), *ib.* — Caractère,
ib.

§. I. Adynamie générale, 41.

Espèce I. Asthénie, 41. — Ethymologie, *ib.*

Sous-espèce I. Corporelle, 42. — Synonymie, *ib.* —

(a) On transportera aux rapports de la sous-espèce II, le rapport B de la sous-espèce VI.

(b) J. L. DOUSSIN-DUREUIL, de la gonorrhée bénigne ou sans virus vénérien, et des fleurs blanches; *Paris* an VI.
— J. B. BLATTIN, du catarre utérin ou des fleurs blanches; *Paris* an IX.

(c) Proctorrhée; SAGAR, cl. V, flux; ord. III de ventre non sanglans; gen. XX.

(d) *Some thoughts on the relaxation of human bodies, etc.* Lond. 1783.

Caractère, *ib.* — Rapports (a), *ib.* — Variété A., *ib.*
 — Formes, *ib.* — Sortes (b), 42-49.

(a) La langueur (LINNÉ, gen. CXI), la lassitude (LINNÉ, gen. XC; VOGEL, gen. CCXXII), la torpeur (VOGEL, gen. CCXXIV), l'adynamie (VOGEL, gen. CCXXV) et la ptose ou l'impuissance de relever la paupière supérieure (VOGEL, gen. CCXXXV) sont des rapports naturels de cette sous-espèce.

(b) 1.^o Hectique, pag. 46, sorte 7, rap. A. Fièvre anas-tomose de BOERHAAVE. — Fièvre hectique anglicane de GRANT, *an inquiry in tho the nature, rise and progress of the fevers*, etc.; Lond. 1771; et traduct. franç., tom. I.

2.^o Rhumatisme dorsal, pag. 46, sorte 8.

Var. B. Masturbation; onanisme.

En lisant avec attention le trait d'histoire qui a rapport au vice d'onan, on s'apercevra facilement que c'est mal à propos qu'on donne le nom d'onanisme à la masturbation.

Bibl. S. A. D. TISSOT, *de morbis ex-manustupratione*; Lausannæ 1758-80. -- L'onanisme, etc.; 8^e édit., Lausan. 1785. -- *Della tabe dorsale*, etc.; Venise 1785; trad. angl. -- G. H. CH. HUSCHKE, *de masturbatione*; Jena 1788. -- *Voy. tableau de l'onanisme*; LE NICOLAIS DU SAULSAI, *journ. de méd.*, tom. XXVIII, pag. 224. -- LA VARENNE, *observ. sur les funestes effets de la masturbation*; *journ. de médec. milit.*, tom. II, pag. 346. -- ESTOR, *observ. sur quelques effets produits par la masturbation*; *journal de médecine ou annales de la société de médecine-pratique de Montpellier*, tom. I, pag. 110, première partie.

Rap. A. Oubli onanistique; SAUV., cl. VIII, ord. IV, gen. XXI, esp. I.

B. Tétanos onanistique; PARANT, *journ. de méd. milit.*, tom. VII, pag. 314.

3.^o On peut compter parmi les autres sortes omises d'asthénie, le hoquet inanitique; SAUV., cl. V, ord. I, gen.

Sous-espèce II. Mentale, 50. — Caractère, *ib.* — Variété A. Exercice outré des facultés mentales, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes (a), 50-57.

Espèce II. Lipothymie, 58. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapport (b), *ib.*

Espèce III. Syncopé, 58. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 59. — Rapport, *ib.*

IV, esp. 8. -- La phthisie hémoptique; SAUV., cl. X, ord. 1, gen. 11, esp. 5. -- Le mal d'estomac des nègres; DAZILLE, observ. sur les maladies des nègres; 2.^e édit.; Paris 1792. -- La cardialgie bradypepte; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XX, esp. 9. -- Diverses hernies par relâchement; SAUV., cl. I, ord. VI, gen. XLIII, esp. 1; gen. XLIV, esp. 11; gen. XLVI, esp. 1 et 2; gen. XLVII, esp. 1, 2 et 4; gen. XLIX, esp. 1 et 3. -- La distocie par débilité de la mère; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXVI, esp. 1. -- La fistule lacrymale par foiblesse du sac lacrymal; RICHTER, *mém. sur la fistule lacrymale*, 1778, esp. 3. -- L'avortement par relâchement de la matrice; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. VII, esp. 2. -- Le bubon atonique; SWÉDIAUR, *malad. vén.*, 4.^e édit., tom. II, pag. 343. -- Les ulcères mercuriels atoniques; SWÉDIAUR, *ibid.* pag. 434. -- La luxation par laxité séreuse des ligamens; SAUV., cl. I, ord. VI, gen. LX, esp. 7 et 9, etc.

(a) L'ennui (VITET, cl. V, ord. 1, gen. XVIII.), l'athymie (VOGEL, gen. CCXXXIX.), l'hypocrisie (VITET, cl. V, ord. 11, gen. XIX, avec les espèces III, IV, V, VI, VII, VIII et IX.) et la bassesse (VITET, cl. V, ord. 11, gen. XXII.) sont des rapports naturels omis de cette sous-espèce.

(b) Scotomie: lipothymie momentanée de la vue; LINNÉ, cl. VI, ord. III; gen. CXI.

Espèce IV. Asphyxie , 59. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (a) , 60-61. — Caractère , 61.

Sous-espèce I. Pulmonaire , 62. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*

Sous-espèce II. Corporelle , 62. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Asphyxie des noyés , 62. — Bibliographie (b) , 62-63. — Variété B. Asphyxie des suffoqués , 63. — Bibliographie , *ib.*

§. II. Adynamie particulière , 64.

Espèce V. Dysopie , 64. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie (c) , *ib.* — Bibliographie (d) , *ib.* — Caractère , *ib.*

(a) E. PH. BLECH , *de aeris dephlogisticati in asphyxiâ ;* Gotting. 1785.

(b) J. G. BRENDÉL , *experimenta circa submersos in animalibus instituta ;* Gotting. 1754. -- *Extrait from the Journal of the board of police, etc. ;* Edimb. 1775. -- CH. F. JÆGER , *experimenta de submersis , etc. ;* Tubing. 1779 ; et coll. de FRANK , vol. VI , pag. 78. -- A. J. TESTA , *della morte apparente di annegati , etc. ;* Florence 1780. -- J. FULLER , *some new hints relative to the recovery of persons drownded , etc. ;* Lond. 1784. -- DESGRANGES , *mém. sur les moyens de perfectionner l'établissement public formé à Lyon en faveur des personnes noyées , etc. ;* Lyon 1790. Supplém. ; Lyon 1790. Rapprochement , *idem ;* Lyon 1792.

(c) Hémalopie ; VOGEL , cl. VI , adynamies ; gen. CCXLV. -- Mydriase : dilatation de la pupille nuisant à la vue ; VOGEL , *ibid* , gen. CCXXXVIII.

(d) GLEIZE , *règlement de vie , ou comment doivent se conduire ceux qui sont affligés de la foiblesse de la vue , etc. ;* Orléans et Paris 1787.

Sous-espèce I. Myopique , 64. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 65. — Caractère , *ib.* — Rapport (a) , *ib.*

S-espèce II. Nyctalopique , 65. — Synonymie (b) , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , 66.

Sous-espèce III. Colorique , 66. — Caractère , *ib.*

Espèce VI. Dysosmie , 66. — Synonymie , *ib.* — (c). — Caractère , *ib.*

Espèce VII. Dysgeustie , 66. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , 67. — Caractère , *ib.*

Espèce VIII. Dysecœe , 67. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — (d). — Caractère , *ib.* — Variété A. Myringique , *ib.* — B. Monaute , *ib.*

Espèce IX. Dysphonie , 67. — Ethymologie , *ib.* — (e). — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Psellique , 68. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Bégayement (f) , *ib.* — B. Grasseusement , *ib.* — C. Lambdacisme , 69. — D.

(a) B. Strabisme des myopes ; SAUV., cl. IV , ord. I , gen. I , esp. 9.

(b) Héméralopie : cécité nocturne ; VOGEL , cl. VI , gen. CCKLIV.

(c) Bibl. LANG , de odoratu , ejusque læsionibus ; opusc. , tom. III , pag. 92. -- SCHEFFEL , de olfactu deficiente ; Gryphisw. 1747.

(d) Bibl. E. BUCHNER , de auditûs difficultate circa febrium acutarum decrementum occurrente ; Halæ 1769.

(e) Bibl. R. A. VOGEL , de larynge humano et vocis formatione ; Erford 1747 ; et opusc. medic. , pag. I. -- E. LONG-FOR , de voce humanâ ; Edinb. 1784 ; et dissert. medic. Edinburg. 1784.

(f) DE MANSE , mém. sur le bégayement ; académ. des sciences et belles-lettres de Beziers , 1766.

Blésité (a), 70. — E. Balbutiement (b), 71. — F. Mo-
gilagique, 72. — G. Jottacismique, *ib.*

Sous-espèce II. Paraphonique, 73. — Synonymie, *ib.*
Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.* Variété A. Pubertique,
74. — B. Nasale, *ib.*

Espèce X. Dyspermatisme, 74. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, 75. — Bibliographie, *ib.* — Caractère,
ib. — Rapports, *ib.*

Espèce XI. Dysesthésie, 75. — Ethymologie, *ib.* —
Caractère, *ib.* — Rapports, 76.

Genre XVII. Gastrose, 76. — Ethymologie, *ib.* —
Synonymie, *ib.* — Bibliographie (c), 76-77. — Carac-
tère, 77.

Espèce I. Pyrétique, 77. — Synonymie, *ib.* — Bi-
bliographie (d), 78. — Caractère, 79. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Légère, 79. — Synonymie, *ib.* — Ca-
ractère, *ib.* — Rapports, 80.

Sous-espèce II. Grave, 80. — Synonymie, *ib.* — Ca-
ractère, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce II. Apyrétique, 81. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Anorexie, 81. — Ethymologie (e), *ib.*

(a) Traulotis : prononciation vicieuse des lettres S et R ;
VOGEL, cl. VI, gen. CCLVIII.

(b) DE BERGEN, de balbutientibus ; Franc. ad Viadr. 1756.

(c) PH. J. NAGEL, de vitiis primarum viarum morbisque
exinde oriundis ; Argentor. 1761. — PH. A. BOEHMER, de
cruditatibus ac impuritatibus primarum viarum ; Halæ 1776. —
G. F. HILDEBRAND, geschichte der unreinigkeiten in magen
und gedarmen, etc. ; Brunswick 1789-90.

(d) PH. A. BOEHMER, de febrium gastricarum symptoma-
tibus ; Halæ 1785.

(e) D'oregomai, je desire, j'appette ; et d'a, privatif ;
SAUV., cl. VI, ord. II, gen. XI.

— Synonymie , *ib.* — Bibliographie (a) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Saburrale , *ib.* — B. Admirable , *ib.* — C. de SWART , 82.

Sous-espèce II. Adipsie , 82. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*

Sous-espèce III. Nausée , 82. — Ethymologie , *ib.* — (c). — Caractère , 83. — Rapport , *ib.*

Sous-espèce IV. Vomissement , 83. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , 83-84.

Sous-espèce V. Flatulence , 84. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Nidoreuse , *ib.* — B. Acide , *ib.*

Sous-espèce VI. Dyspepsie , 85. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Apepsie , *ib.* — B. Dyspepsie , *ib.* — C. Diaphtore , *ib.* — Formes de la gastrose apyrectique , 86. — Sortes (c) , *ib.*

Genre XVIII. Helminthèse , 89. — Ethymologie , *ib.*

(a) T. POLZER , *de appetitu deleto* ; coll. de WASSERBERG , tom. III , pag. 56.

(b) Bibl. C. F. KALTSCHMID , *de nausea* , etc. ; Jena 1765. — CH. H. SCHNIZLEIN , *dissert. inaug. med. sistens observationes quasdam de nausea* ; Erlang. 1787.

(c) Parmi ces sortes , doivent être comprises les suivantes : Baillement stomachique ; SAUV. , cl. V , ord. 1 , gen. III , esp. 3. -- Hoquet gloutonier ; SAUV. , cl. V , ord. 1 , gen. IV , esp. 2. -- Hoquet cacochylique ; SAUV. , *ibid.* , esp. 3. -- Céphalalgie stomachique ; SAUV. , cl. VII , ord. II , gen. XI , esp. 4. -- Cardialgie saburrale ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XX , esp. 1.

— Synonymie , *ib.* — Bibliographie (a) , 89-93. — Caractère , 93.

Espèce I. Par l'ascaride lombrical , 93. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 94. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Pyrétique , 95. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (b) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Légère , *ib.* — Caractère , *ib.* — B. Grave , 96. — Caractère , *ib.* — Formes , *ib.* — Sortes , *ib.*

Sous-espèce II. Apyrétique , 97. — Caractère , *ib.* — Formes , 98. — Sortes (c) , *ib.*

Espèce II. Par l'ascaride vermiculaire , 102. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Intestinale , 102. — Formes , *ib.* — Sortes , *ib.*

Sous-espèce II. Cystique , 103. — Rapport , *ib.* — Formes , *ib.* — Sortes , *ib.*

Espèce III. Par le dragoneau , 103. — Caractère , *ib.*

(a) A. E. BUCHNER , *de pruriente naso, frequenti vermium indice* ; Halæ 1757. -- J. GUIDETTI , *dei vermi humani* , etc. ; Florence 1783.

(b) S. MUSGRAVE , *an essay on the nature and cure of the worm fever* , etc. ; Lond. 1776. -- S. C. PHILITES , *februm verminosarum pathologia* ; Gotting. 1785.

(c) Parmi ces sortes doivent se trouver les suivantes : Hé-morragie vermineuse ; coll. de FRANK , vol. x , pag. 371. -- Balbutiement vermineux , *ibid* , pag. 370. -- Ruminat-ion vermineuse ; GOLDACHEN , *de ruminatione humanâ* , etc. ; Halæ 1783. -- Hoquet vermineux ; FRANK , *loc. cit.* , pag. 272. -- Anxiété vermineuse , *ibid* , pag. 369. -- Ozène vermineux , *ibid* , pag. 370. -- Epilepsie vermineuse ; SIGWART , *exemplum epileptici verminosi* , etc. ; Tubing. 1767.

Sous-espèce I. Intestinale, 104. — Caractère, *ib.* —
Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Sous-espèce II. Cellulaire, 104. — Bibliographie, *ib.*
— Caractère, 105.

Espèce IV. Par le trichure, 105. — Bibliographie,
ib. — Caractère, 106.

Espèce V. Par la douve, 106. — Caractère, *ib.*

Espèce VI. Par le tania, 106. — Bibliographie (a),
ib. — Caractère, 109. — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce VII. Par l'hydatide, 109. — Bibliographie
(b), *ib.* — Caractère, 111. — Formes, *ib.* — Sortes
(c), *ib.*

Espèce VIII. Par le bicorné rude, 114. — Bibliogra-
phie, *ib.* — Caractère, 115.

Espèce IX. Par la furie infernale, 115. — Carac-
tère, *ib.*

Espèce X. Par la mite psorique, 116. — Synonymie,
ib. — Bibliographie (d), *ib.* — Caractère, 117. — Va-
riété A. Gale épidémique, 118.

(a) A. J. G. G. BATSCH, *naturgeschichte der bandwurmgattung überhaupt und ihrer arten ins besondere*, etc.; Halæ 1786.

(b) J. T. G. AB ECKARDT, *dissert. sistens observationem hydatidum in hepate inventarum*, etc.; Jenæ 1797; et coll. de BRERA, vol. IV, pag. 157.

(c) Grossesse vésiculaire; SAUV., cl. X, ord. II, gen. X, esp. 4. — Hernie simulée à l'occasion d'une hydatide dans le ligament rond de la matrice; séance publique de l'école de médecine de Paris, an VIII.

(d) L. CH. JUNKER, *de damno ex scabie repulsâ et re-
medio illud avertente*; Halæ 1750.

Sous-espèce I. Gale miliaire , 118. — Rapports , *ib.*

II. Gale boutonnée , 118. — Rapports , 119. —

Formes , *ib.* — Sortes (a) , *ib.*

Espèce XI. Par le pou , 121. — Synonymie , *ib.* —

Caractère , *ib.* — Variété A. Phthiriasis interne , *ib.* —

B. Vésical , *ib.* — C. Péculaire , 122. — D. Inguinal , *ib.*

Espèce XII. Par le crinon , 122. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*

Espèce XIII. Par le pou du bois , 122. — Caractère , 123.

Espèce XIV. Par la sangsue , 123. — Rapport , *ib.*

Espèce XV. Par des larves ou par des vers indéterminés , 124.

Sous-espèce I. Vers dans le cerveau , 124.

Sous-espèce II. Vers dans les sinus frontaux , 124. — Bibliographie (b) , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce III. Vers dans les oreilles , 125.

Sous-espèce IV. Vers dans les dents , 125. — Bibliographie , *ib.*

Sous-espèce V. Vers dans les poumons , 125.

Sous-espèce VI. Vers dans l'estomac ou dans les intestins , 125. — Rapports , *ib.*

Sous-espèce VII. Vers dans les organes urinaires , 126. — Rapports , *ib.*

Sous-espèce VIII. Vers dans la peau , 126. — Rapports , *ib.*

(a) Ischurie galense ; VERBECKMOES , *actes de la société de médecine* , etc. de Bruxelles , tom. 1 , pag. 177.

(b) M. TROJA , *rarissima observatio de magno lumbrico in frontali sinu reperto et totam ejus cavitatem replente* ; Napoli 1771.

Genre XIX. Stuporisme , 127. — Ethymologie , *ib.*
— Caractère , *ib.*

Espèce I. Apnéique , 127. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Par le gaz hydrogène , 127. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 128. — Rapports (a) , *ib.*

Sous-espèce II. Par le gaz hydrogène sulfuré , 128.
— Caractère , *ib.*

Sous-espèce III. Par le gaz azote , 129. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce IV. Par le gaz acide carbonique , 129.
— Bibliographie (b) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , 130.

Sous-espèce V. Par le gaz carboné , 130. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce VI. Par la fumée , 131. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce VII. Par un arôme , 131. — Rapports (c) , *ib.* — Caractère , 133.

Espèce II. Synéqué , 133. — Bibliographie (d) , *ib.*
— Caractère , 134. — Rapport A. Fièvres intermittentes , 135. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (e) , *ib.* —

(a) LABORIE , CADET et PARMENTIER , observations sur les fosses d'aisance , et moyens de prévenir les inconvéniens de leur vidange ; Paris 1778.

(b) HARMANT , mémoire sur les funestes effets du charbon allumé , etc. ; Nancy 1775.

(c) THUNBERG , *arbor toxicaria macassariensis* ; Upsal. 1787.

(d) MARTINI , *analecta ad miasmologiam* ; Gotting. 1776.

(e) G. M. GATTENHOF , *caloris febrilis examen* ; Heidelberg 1775 ; et coll. de FRANK , vol. VII , pag. 63. -- *Id.* *Frigoris febrilis examen* ; Heidelberg 1776 ; et coll. de FRANK , vol. VII , pag. 1. -- TH. SKEETE , *experiments and obser-*

Caractère , 140. — B. Fièvres remittentes , 141. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 142. — Caractère , 143.

Sous-espèce I. Fièvre quotidienne , 143. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Intermittente , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 144. — Rapports , *ib.* — B. Rémittente , 145. — Synonymie , *ib.* — Rapports , 146.

Sous-espèce II. Fièvre tierce , 146. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Intermittente , *ib.* — Synonymie , 147. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 148. — Rapports , *ib.* — B. Rémittente , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 149. — Caractère , 150. — Rapports , *ib.*

Sous-espèce III. Double-tierce , 157. — Caractère , *ib.* — Variété A. Intermittente , *ib.* — Rapports , *ib.* — B. Rémittente , 158. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 160. — Rapports , 161.

Sous-espèce IV. Fièvre quarte , 164. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport (a) , *ib.* — Variété A. Intermittente , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports typiques , 165. — Symptomatiques , 166. — B. Rémittente , 167. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce V. Fièvre erratique , 168. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Quinte , 169. — B. Sextaine , *ib.* — C. Septaine , *ib.* — D. Octaine , *ib.* — E. Nonaine , *ib.* — F. Décimaine , 170. — G. Vague , *ib.*

variations on quilled and red peruvian bark, etc.; Lond. 1786.
-- J. P. FRANK, *de periodicarum affectionum ordinandis familiaribus*, vol. X, pag. 383.

(a) Algor interne; SAUV., cl. VII, ord. 1, gen. IX, esp. 2.

Formes de fièvre intermittente , 170. — Bibliographie , *ib.* — Sortes (a) , *ib.*

Espèce III. Synoque , 173. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport A. Fièvre putrido-sanguine , 174. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 182. — Rapports (b) , *ib.*

Sous-espèce I. Fièvre putride , 183. — Synonymie , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce II. Fièvre maligne , 184. — Synonymie , *ib.* — Rapports 185. — Variété A. Fièvre d'hôpital , 186. — B. Fièvre de prison (c) , 187. — C. Fièvre de vaisseau , 188. — D. Fièvre des camps , 189.

Sous-espèce III. Fièvre pétéchiiale , 190. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports (d) , 191.

Sous-espèce IV. Fièvre jaune , 194. — Caractère , *ib.* — Rapports (e) , *ib.*

Sous-espèce V. Fièvre suette , 196. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

(a) Algor fiévrenx ; SAUV. , cl. VII , ord. II , gen. IX , esp. 3. -- Coryza fiévrenx ; SAUV. , cl. IX , ord. I , gen. XXII , esp. 6.

(b) Débilité fébrile ; C. F. KALTSCHMID , *de causis debilitatis febrilis* ; Jenæ 1765. -- Catarrhe suffocant ; J. GATSELEFF , *de catarrho suffocativo in morbis acutis malignis* ; Halæ 1760.

(c) H. G. F. SOELLING , *de febre carcerum* ; Marburg. 1790 ; et coll. de BRÉRA , tom. IV , pag. 197.

(d) Epidémie de Carouge en 1754 , *synochus miliaire* ; SAUV. , cl. II , ord. I , gen. III , esp. 14.

(e) J. H. CHAUFFESSIÉ , *specimen sistens historiam febris flavæ americanæ* ; Halæ 1794 ; et coll. de BRÉRA , tom. IV , pag. 31.

Sous-espèce VI. Fièvre dysentérique , 196. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce VII. Fièvre colliquative , 199. — Caractère , *ib.* — Rapports (a) , *ib.*

Sous-espèce VIII. Peste , 200. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (b) , *ib.* — Caractère , 202. — Rapports , *ib.*

Formes de fièvre putride , 204. — Sortes , *ib.* — Fièvre avec charbon (c) , 205. — Angine (d) , *ib.* — Pneumonie , 206. — Variole , *ib.* — Erysipèle , 208. — Pleurésie , *ib.* — Catarrhe (e) , *ib.* — Scarlatine , 209. — Rougeole , 210. — Aphtes , *ib.* — Phlyctènes , *ib.*

(a) Ephémère hématydotique ; SAUV. , cl. II , ord. I , gen. I , esp. 10.

(b) BAUMER , *de peste in quâ simul questio movetur an pestis inoculatio sub certis conditionibus , rationi consentanea* , etc. ; Halæ 1770. -- F. L. MELTZERS , *beschreibung der pest ann. 1770-72 in Moskau ; Moskau 1776.* -- G. ORREI , *memorabilia pestis quæ ann. 1770 in Jassayâ et 1771 in moscua grassata est ; Patropoli 1783.* -- J. A. DOLST , *diss. inaug. medic. sistens observationes nonnullas de peste ; 1784.* -- A. CANESTRINI , *pestis diagnosis* , etc. ; Salzburg 1795. -- E. H. SMYTH , *essay on the plague of athens ; Newyork 1797.*

(c) MALACARNE , *de febre carbunculosa , deque carbone bovillo ; Patav. 1797 ; et coll. de BRÉRA , vol. III , pag. 1.*

(d) J. TAYLOUR , *de cynanche gangrænosâ ; Edinb. et coll. de WEBSTER , ord. III , tom. I , pag. 466.* -- G. DANIEL , *de cynanche typho ; Edinb. 1782 ; et diss. medic. Edinburg. 1782.*

(e) STAHL , *de febre catarrhali malignâ ; Halæ 1708* -- BAUMER , *de febre catarrhali malignâ ; Giessæ 1773.*

Espèce IV. Lypothymique , 211. — Synonymie , *ib.* —
Bibliographie (a) , 212. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Crotalique , 212. — Rapports , 213.

II. Scytalique , 213. — Rapports , *ib.*

III. Couleuvrique , 214. — Rapports , *ib.*

Espèce V. Narcotique , 215. — Synonymie , *ib.* —
Bibliographie (b) , *ib.* — Caractère , 218.

§. I. Produits simples , 218.

Sous-espèce I. Par des plantes de la diandrie (c) , 218.

II. Par des plantes de la triandrie , 219. — Ra-
phanie , *ib.*

(a) P. RUSSEL , *an account of indian serpens* , etc. ; Lond. 1796. -- Voyez dans *philosophical transactions* , etc. , vol. LXXIX , pag. 1 , ann. 1789 , art. III , les observations de M. E. W. GRAY , sur la classe d'animaux appelés par LINNÉ *amphibies* , principalement sur les moyens de distinguer les serpens vénimeux de ceux qui ne le sont pas.

(b) J. COOKE , *a treatise of poisons vegetable , animal and mineral , with their cure* ; Lond. 1770. -- TH. CAELS , *de Belgii plantis* , etc. ; Bruxelles 1774. -- E. G. BOSE , *de diagnosi veneni ingesti et sponte in corpore geniti* ; Lipsiæ 1774. -- B. WILMER , *observations on the poisonous vegetables* , etc. ; Lond. 1780. -- J. G. REYER , *de venenorum actione* , etc. ; Kilise Holsat. 1782.

(c) J. E. WICHMAN , *beytrag zur geschichte* , etc. ; Leips. et Zelle 1771. -- J. L. HERMANN , *abhandlung und gegründete wahrnehmungen von der Eriebelkrankheit* , etc. ; Cassel 1774. -- MODEL , *dissert. sur l'ergot ; récréat. physiq. , éconóm. et chim.* , trad. par PARMENTIER ; Paris 1774 , tom. II , pag. 345 , 377 , 401 , 441. -- VETILLARD , *mém. sur l'ergot , la maladie qu'il produit et la manière de la guérir* ; Nancy 1774. -- CH. G. RÆSSIGS , *abhandlung uber des mutterkorn* , etc. ; Leips. 1786.

Sous-espèce III. Par des plantes de la tétrandrie, 221.

IV. Par des plantes de la pentandrie, 221.

V. Par des plantes de l'hexandrie, 228.

VI. Par des plantes de l'octandrie, 228.

VII. Par des plantes de la décandrie, 228.

VIII. Par des Plantes de l'icosandrie, 229.

IX. Par des plantes de la polyandrie, 230.

X. Par des plantes de la monadelphie, 231.

XI. Par des plantes de la diadelphie, 233.

XII. Par des plantes de la syngénésie, 233.

XIII. Par des plantes de la monœcie, 233.

XIV. Par des plantes de la dioecie, 234.

XV. Par des plantes de la polygamie, 235.

XVI. Par des plantes de la cryptogamie, 235.

— Bibliographie (a). — Caractère, 239. — Rapports,

ib.

— §. II. Produits de la fermentation, 239.

Sous-espèce XVII. Par le produit fermenté (b) de la vigne, 239. — Rapports, 240.

§. III. Plantes narcotiques indéterminées, 240.

Sous-espèce XVIII. Par le *jatropha umbellata*, 240.

Genre XX. Démence, 241. — Ethymologie, ib. —

(a) M. J. N. FELDNER, *dissert. exhibens prodromum ad historiam fungorum agri Vindobonensis*; Vienna 1775. — H. J. TODE, *fungi dittonis Mecklenburgensis selecti*; Lunebourg 1791.

(b) PH. F. GMELIN, *de noxis ex abusu potuum spirituosorum in hominem sanum et ægrum redundantibus*; Tubing. 1767. — *Observations on the pernicious consequences, etc.*; Dublin 1788.

Synonymie , *ib.* — Bibliographie (a) , *ib.* — Caractère , 243.

Espèce I. Oubli , 243. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Coïtigue , 243.

II. Sénile , 243.

Espèce II. Imbécillité , 244. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Incohérente , 244.

II. Niaise , 244.

III. Bête , 244. — Variétés , 245.

Espèce III. Idiotisme , 245. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce I. Microcéphalique , 245.

Espèce IV. Crétinisme , 246. — Bibliographie (b) , *ib.* — Caractère , *ib.*

Genre XXI. Goître , 246. — Synonymie , 247. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Espèce I. Goître cellulaire , 247.

Sous-espèce I. Séreux , 248. — Rapport , *ib.*

II. Mellicérique , 248.

III. Stéatomatique , 248. — Rapports , *ib.*

Espèce II. Goître thyroïdien , 248. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

(a) S. TH. QUELMALZ , *de epidemica mentis alienatione ; Lipsia 1752.*

(b) V. MALACARNE , lettre au professeur FRANK sur l'état des crétins ; Turin 1788 ; et coll. de FRANK , vol. IX , pag. 241. -- Voy. CORE , observations faites dans les Pyrénées , etc. , *traduct. franç.* ; Paris 1789. ; et *gazette de santé* , ann. 1789 , n.º 38.

Genre XXII. Dyscinie, 249. — Ethymologie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Tremblement, 249. — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Tremblement débilitique, 250.

II. Tremblement palpitant, 250.

III. Tremblement paralytodé, 250.

IV. Tremblement sénile, 250.

Espèce II. Chorée, 250. — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 251. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Tétanique, 251.

Espèce III. Béribéri, 251. — Caractère, 252. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Béribéri épileptiforme, 252.

Genre XXIII. Vésanie, 252. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Mélancolie, 252. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, 253. — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 254. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Mélancolie illusoire, 254. — Variété A. Craintive, *ib.* — B. Inanimique, 255. — C. Morbidique, *ib.* — D. Religieuse, 256. — E. Phronique, *ib.* — F. Stupéfactive, *ib.* — G. Zoantropique, 257. — H. Féminine, *ib.* — I. Gaie, *ib.* — K. Plaintive, 258. — L. Suicidique, *ib.* — M. Erotomanique, *ib.* — N. Nympholepsique, 259. — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce II. Nostalgie, 259. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, 260. — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Nostalgie compliquée, 260.

Espèce III. Démonomanie, 261. — Ethymologie ;

ib. — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère,
ib. — Rapports, *ib.*

Sous-classe DEUXIÈME.

Suroxigénèses.

Sous-classe destinée aux maladies dans lesquelles il paroît que l'oxigène est en excès, 262.

Les genres nombreux qui la forment sont les suivans ; au nombre de trente-sept : le *phantasme*, la *physéose*, le *mentisme*, l'*agrypnie*, la *névrose*, la *paraphrynie*, le *salacisme*, le *tonisme*, la *narcose*, le *clonisme*, la *toux*, l'*asthme*, la *phthisie*, la *gastroxexie*, l'*algie*, la *toxicose*, la *paralysie*, l'*amaigrissement*, l'*épischésie*, le *spermatisme*, la *diarrhée*, la *cénose*, le *diabète*, la *grossesse*, l'*avortement*, le *calcul*, la *concretion*, 263.

Le *leucome*, la *parectamie*, la *pneumatose*, l'*emphraxie*, le *polype*, la *phlegmose*, le *phlegmon*, la *phlegmonitie*, la *variole* et la *vaccine*, 264.

Genre XXIV. *Phantasme*, 264. — *Ethymologie*, *ib.* — *Caractère*, *ib.*

Espèce I. *Berlue*, 264. — *Synonymie*, *ib.* — *Bibliographie*, 265. — *Caractère*, *ib.*

Sous-espèce I. *Myode*, 265.

II. *Réticulaire*, 265.

III. *Étincélante*, 265.

IV. *Colorante*, 266.

Espèce II. *Bévue*, 266. — *Synonymie*, *ib.* — *Caractère*, *ib.*

Sous-espèce I. *Métamorphosique*, 266.

II. *Chancelante*, 266.

III. *Diminutive*, 267.

IV. *Multipliative*, 267.

Sous-espèce

Sous-espèce V. Eloignée , 267.

Sous-espèce VI. Palpébrale , 267.

Espèce III. Vertige , 267. — Ethymologie , *ib.* —
Synonymie , 268. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Psychique , 268.

II. Accidentel , 268.

III. Traumatique , 268.

Espèce IV. Bourdonnement , 269. — Synonymie , *ib.*
— Caractère , *ib.* — Variété A. Sifflement d'oreilles ,
ib. — B. Bruissement d'oreilles , *ib.* — C. Coup de
marteau , *ib.*

Sous-espèce I. Oxicoïque , 269.

Espèce V. Paracuse , 269. — Ethymologie , *ib.* —
Synonymie , 270. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Baricoïque , 270.

II. Oxicoïque , 270.

III. Doublée , 270.

IV. Bruyante , 270.

V. Opposée , 271.

Espèce VI. Hydrophobie , 271. — Ethymologie , *ib.*
— Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère ,
ib. — Rapports , *ib.*

Espèce VII. Antipathie , 272. — Ethymologie , *ib.*
— Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère ,
ib. — Formes , *ib.* — Sortes , *ib.*

Espèce VIII. Cochemar , 273. — Synonymie , *ib.* —
Bibliographie (a) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

(a) SCHEIDT , de *ephalie* ; Basil. 1618. — OHEIM , de *in-*
cubo ; Altd. 1678. — PETERMANN , de *ephalie* ; Lipsiæ 1688.
— FISCHER , de *ephalie* ; Erf. 1728. — HUISINGA , de *in-*
cubo ; Lugd. Batav. 1734. — JOSA , de *ephalie* ; Budæ 1778.

Espèce IX. Somnambulisme, 274. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 275. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Mélancolique, 275. — Rapports, *ib.*

Genre XXV. Physéose, 275. — Ethymologie, *ib.* — Caractère, 276.

Espèce I. Orgueil, 276. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Hauteur, 276. — Caractère, *ib.*

II. Fierté, 276. — Caractère, *ib.*

III. Arrogance, 276. — Caractère, *ib.*

IV. Dédain, 276. — Caractère, *ib.*

Espèce II. Vanité, 277. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Prétention, 277. — Caractère, *ib.*

II. Affectation, 277. — Caractère, 278.

III. Coquetterie, 278. — Caractère, *ib.*

Espèce III. Vaine gloire, 278. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Magnificence, 278. — Caractère, 279.

II. Dissipation, 279. — Caractère, *ib.*

III. L'important, 279. — Caractère, *ib.*

IV. Grandomanie, 279. — Caractère, 280.

V. L'avantageux, 280. — Caractère, *ib.*

VI. Fanfaronade, 280. — Caractère, *ib.*

Espèce IV. Présomption, 280. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Pédonterie, 280. — Caractère, *ib.*

II. Suffisance, 281. — Caractère, *ib.*

Espèce V. Caprice, 281. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Bisarrerie, 281. — Caractère, *ib.*

II. Le fantasque, 281. — Caractère, *ib.*

Espèce VI. Singularité, 282. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. L'original, 282. — Caractère, *ib.*

Espèce VII. Distraction, 282. — Caractère, *ib.*

Espèce VIII. Le dissipé, 282. — Caractère, 283.

Sous-espèce I. Le volage, 283. — Caractère, *ib.*

Espèce IX. Le babillard, 283. — Caractère, *ib.*

Espèce X. Frivolité, 284. — Caractère, *ib.*

Espèce XI. Inconséquence, 284. — Caractère, *ib.*

Espèce XII. Curiosité, 284. — Caractère, *ib.*

Espèce XIII. Prévention, 285. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Entêtement, 285. — Caractère, *ib.*

II. Opiniâtreté, 285. — Caractère, *ib.*

III. Obstination, 285. — Caractère, *ib.*

IV. L'implacable, 286. — Caractère, *ib.*

Espèce XIV. Imprudence, 286. — Caractère, *ib.*

Espèce XV. Le menteur, 286. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Le fourbe, 286. — Caractère, 287.

II. Le charlatan, 287. — Caractère, *ib.*

Espèce XVI. Impudence, 287. — Caractère, *ib.*

Espèce XVII. Effronterie, 287. — Caractère, *ib.*

Espèce XVIII. Insolence, 287. — Caractère, 288.

Sous-espèce I. Le railleur, 288. — Caractère, *ib.*

Espèce XIX. L'indépendant, 288. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Indocilité, 288. — Caractère, *ib.*

Espèce XX. Le mécontent, 288. — Caractère, 289.

Sous-espèce I. Le bourru, 289. — Caractère, *ib.*

II. Le grondeur, 289. — Caractère, *ib.*

III. Le boudeur, 289. — Caractère, *ib.*

Espèce XXI. Contradiction, 290. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Le chicaneur, 290. — Caractère, *ib.*

Espèce XXII. L'intrigant, 290. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Le brouillon, 291. — Caractère, *ib.*

Espèce XXIII. Insensibilité, 291. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Dureté, 291. — Caractère, *ib.*

II. Cruauté, 291. — Caractère, *ib.*

III. Ingratitude, 292. — Caractère, *ib.*

Genre XXVI. Mentisme , 292. — Éthymologie , *ib.*
— Bibliographie , *ib.* — Caractère , 293.

Espèce I. Mentisme imagiatif , 293.

Sous-espèce I. Méditabilité , 293. — Bibliographie
(a) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports (b) , *ib.*

Sous-espèce II. Sensibilité , 294. — Caractère , 295.
— Variété A. Tendresse , *ib.* — Caractère , *ib.* — B.
Pitié , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce III. Vivacité , 295. — Caractère , *ib.* —
Variété A. Esprit embrouillé , *ib.* — Caractère , 296.
— B. L'homme bouillant , *ib.* — Caractère , *ib.* — C.
Brutalité , *ib.* — Caractère , *ib.* — D. Brusquerie , *ib.*
— Caractère , *ib.* — E. Pétulance , *ib.* — Caractère , 297.
— F. Etourderie , *ib.* — Caractère , *ib.* — G. Le té-
méraire , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce IV. Enthousiasme , 297. — Synonymie ,
ib. — (c). — Caractère , *ib.* — Variété A. Extase , 298.
— (d) — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.* — B. Em-
phase , *ib.* — Caractère , *ib.* — C. Le chimérique , *ib.*
— Caractère , *ib.* — D. L'extravagant , 299. — Carac-

(a) G. F. SIGWART , *de vi imaginationis in producendis
et removendis morbis* ; Tubing. 1769.

(b) Impuissance morale ; BABLOT , *gazette salulaire* , 1786,
L. 4.

(c) Bibl. GERDESIUS , *diss. idea errans in ectasi seu en-
thusiasmus* ; Francof. 1692. -- ZORN , *diss. de philtis enthu-
siasticis anglico-batavis* ; Witeb. 1745.

(d) STOCKMANN , *diss. de somno..... ectasi , et ephialte* ;
Rostoch. 1625. -- PANECIUS , *diss. de ectasi* ; Witeb. 1695.
-- WEDEL , *pr. de ectasi putata Christi* ; Jena 1704. -- HANDT-
WIG , *diss. de ectasi* ; Rostoch 1755. -- OESFELD , *diss. de
ectasi* ; Halæ 1737.

tère , *ib.* — E. Métromanie , *ib.* — Caractère , *ib.* —
F. Mélomanie , *ib.* — Caractère , *ib.* — G. Tarantisme ,
ib. — (a). — Caractère , 300. — H. Pythonissisme , *ib.*
— Caractère , *ib.*

Sous-espèce V. Fanatisme , 300. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce VI. Inquiétude , 301. — Caractère , *ib.*
— Variété A. Souci , *ib.* — Caractère , *ib.* — B. Cha-
gria , *ib.* — Caractère , 302. — Rapports , *ib.* — C. Dés-
solation , *ib.* — Caractère , *ib.* — D. Désespoir , *ib.* —
Caractère , *ib.* — E. Regret , *ib.* — Caractère , 303. —
F. Repentir , *ib.* — Caractère , *ib.* — G. Remord , *ib.* —
Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.* — H. Honte , *ib.* —
Caractère , *ib.* — I. Misanthropie , 304. — Caractère ,
ib. — K. Mysoginie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce VII. Méchanceté , 304. — Caractère ,
ib. — Variété A. Calomnie , 305. — Caractère , *ib.* —
B. Médisance , *ib.* — Caractère , *ib.* — C. Le satyrique ,
ib. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce VIII. Frayeur , 305. — Caractère , 306.
— Variété A. Epouvante , *ib.* — Caractère , *ib.* — B.
Alarme , *ib.* — Caractère , *ib.* — C. Effroi , *ib.* — Ca-
ractère , *ib.* — Rapports , *ib.* — D. Terreur , 307. —
Caractère , *ib.* — Rapports (b) , *ib.*

(a) H. SWINBURNE , *travels into the two Sicilies* , etc. ,
tom. 1 , Lond. 1782. -- HUBNER , *de tarantismo* ; Argentor.
1674. -- MULLER , *de tarantulâ* ; Witeb. 1676.

(b) VILLEM DE LOOS , *de menstruorum per terrorem obs-
tructorum curâ* ; Ultraject. 1767. -- Dyshæmorrhœis pathémati-
que ; SAGAR , cl. VI , suppressions ; ord. III , du bas-ventre ;
gen. XI , esp. 2. -- Convulsions aménorrhéiques ; BRUCKMANN ,
enarratio choræ S. Viti , etc. ; 1786 , obs. 2.

— Espèce II. Mentisme , 307. — Bibliographie (a) , *ib.*
 Sous-espèce I. Joie , 309. — Caractère , *ib.* — Rap-
 ports , 310.

Sous-espèce II. Espérance , 310. — Caractère , *ib.* —
 Variétés , *ib.*

Sous-espèce III. Amour , 311. — Bibliographie , *ib.*
 — Caractère , *ib.* — Variété A. Amour sexuel , *ib.* —
 Rapports , *ib.* — B. Amour de la gloire , 312. — C.
 Amour-propre , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce IV. Desir , 313. — Caractère , *ib.* — Va-
 riété A. Ambition , *ib.* — Caractère , *ib.* — B. Avarice ,
ib. — Caractère , *ib.* — C. Sensualité , *ib.* — Caractère ,
 314. — D. Gourmandise , *ib.* — Caractère , *ib.* — E.
 Ivrognerie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce V. Haine , 314. — Caractère , *ib.* — Rap-
 ports , *ib.* — Variété A. Aversion , 315. — Caractère ,
ib. — B. Envie , *ib.* — Caractère , *ib.* — C. Vengeance ,
ib. — Caractère , *ib.* — D. Ressentiment , *ib.* — Ca-
 ractère , *ib.*

Sous-espèce VI. Jalousie , 316. — Caractère , *ib.* —
 Variété A. Par amour , *ib.* — B. Par vanité , *ib.* —
 C. par intérêt , *ib.*

Sous-espèce VII. Colère , 317. — Bibliographie , *ib.*
 — Rapports , *ib.* — Variété A. Le violent , 319. —
 Caractère , *ib.* — B. L'emporté , *ib.* — Caractère , *ib.*
 — C. L'impatient , *ib.* — Caractère , *ib.*

(c) ISENFLAMM , *de diverso pathematum animi in corpus
 imperio* , etc. , 1773. — DE MARÉES , *de animi perturbatio-
 num in corpus potentia* ; Gotting. 1775. — W. FALCONER ,
*a dissertation on the influence of the passions upon disorders
 of the body* ; Lond. 1788 ; en franç. , Paris 1788.

Genre XXVII. Agrypnie , 320. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (a) , *ib.* — Caractère , *ib.*

Genre XXVIII. Névrose , 320. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.*

§. I. Névroses pyrétiq.ues.

Espèce I. Névrose pyrétiq.ue , 321. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Lente , 321. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 322. — Variétés , *ib.*

Sous-espèce II. Vive , 324. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports (b) , *ib.*

§. II. Névroses apyrétiq.ues.

Synonymie , 324. — Bibliographie (c) , *ib.*

Espèce II. Spasme , 326. — Bibliographie (d) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

(a) *Bibl.* ETMULLER , *de vigiliis involuntariis* ; Lips. 1705. — LINDER , *de somno et insomniis* ; Königsb. 1751.

(b) Péripleurmonie nerveuse ; KREISIG , *de peripleurmonia nervosa* ; Lips. 1796.

(c) J. F. G. GOLDAGHEN , *de tensione nervorum in genere* ; Halle ad Salam 1770. — B. AUBERT , *de morborum quos nervosos aut vaporosos dicunt ; principis et elementis* , etc. ; Monsp. 1777. — A. THOMSON , *an inquiry in to the nature causes and method of cure of nervous disorders* , etc. ; Lond. 1781.

— COMPARETTI , *occursus medici de vagâ ingritudine ; infirmitatis nervorum* ; Venise 1781. — L. DESBOUET , *ragionamento fisico chirurgico sopra l'effetto della musica nelle malattie nervose* , etc. ; Livourne 1782. — J. HEINECKE , *de morbis nervorum eorumque frequentissimâ ex abdomine origine* ; Götting. 1783. — BRESSY , *recherches sur les vapeurs* ; Paris 1789.

(d) J. F. CARTHEUSER , *de variis spasmodorum causis et*

Sous-espèce I. Cohibant , 326. — Variété A. Métose ; 327. — B. Spasme intestinal, *ib.* — C. Retrécissement du rectum (a), *ib.*

Sous-espèce II. Flatueux , 328.

Sous-espèce III. (b).

remediis ; Francof. ad Viadr. 1752. -- F. BARELTO DE VEIGA , de motu spasmodico ; Lugd.-Batav. 1753. -- J. MARK , de spasmis sive motibus convulsivis optimaque iisdem medendi ratione tam generali quam speciali ; Halæ 1765. -- E. A. NICOLAI , de spasmi effectibus ; Jenæ 1767. -- S. HAHNEMANN , conspectus adfectuum spasmodicorum æthiologicus et therapeuticus , etc. ; Erlang. 1779.

(a) L. F. JOURDAN DUCHADOZ , *de proctostenia seu de morbois intestini recti angustis ; Mospel. 1771.*

(b) Epigénésique ; état spasmodique dépendant d'un développement du corps à quelque âge critique.

Var. A. Crue : développement dans la stature du corps avec mal-aise , quelquefois douleurs articulaires , et toujours avec des signes d'une irritabilité augmentée.

B. Age de sept ans : mal-aise avec un vice dominant d'irritabilité , souvent avec des retours anomaux de fièvre éphémère , chaleur , amaigrissement ; etc.

C. Puberté ; voy. G. ARMSTRONG , *an account of the disease most incident to children , from the birth , till the age of puberty ; Lond. 1783. -- G. D'AIGNAN , tableau des variétés de la vie humaine , etc. ; Paris 1786. -- G. G. AB EKEN , de noxis ex præmaturâ pubertate oriundis in physicâ educatione maximopere attendendis ; Jena 1788. -- V. T. L'EPINE , essai sur la puberté , etc. ; Paris an VII.*

D. Age de quarante ans ; J. B. P. CHOUFFE , *des accidens et des maladies qui surviennent à la cessation de la menstruation ; Paris en X. -- BECHARD , essai sur les maladies*

Formes, 328. — Sortes (a), *ib.*

Espèce III. Névrose hypocondrique, 332. — Synonymie, 333. — Bibliographie (b), *ib.* — Caractère, 336. — Rapports, 337. — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce IV. Névrose métrique, 338. — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, 339. — Caractère, 340.

Sous-espèce I. Flatulente, 341.

II. Convulsive, 341.

III. Stertoreuse, 341.

Formes, 341. — Sortes (c), *ib.*

Genre XXIX. Paraphrynie, 344. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, 345.

Espèce I. Délire, 345. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Délire doux, 346.

II. Délire fort, 346.

Espèce II. Manie, 346. — Ethymologie, *ib.* — Sy-

auxquelles les femmes sont le plus fréquemment exposées à l'époque de la cessation des menstrues; Paris an X.

(a) G. G. RICHTER, *judicium de phthisi nervosa*; Gotting. 1744; et *opusc. medic.* tom. III. — J. G. ROEDERER, *de phthisi infantum nervosa*; Gotting. 1762. — Hoquet nerveux; SAUV., cl. V, ord. I, gen. IV, esp. 25. — Dysphagie spasmodique; D. A. COURANT, *de nonnullis morbis convulsivis œsophagi*; Monspel. 1778. — Dystocie dolorique; M. HEFINGER, *de doloribus parturientium*; Vienne 1752. — VOGEL, *de anginis nervosis*; Budæ 1779.

(b) G. TURNER, *de morbo hypochondriaco*; Edinb. 1756; et coll. d'Edimb., vol. II, pag. 401. — J. N. A. LEUTHNER, *praktische theilung versuche*, etc.; Ulm 1781.

(c) Baillement hystérique; SAUV., cl. V, ord. I, gen. III, esp.

nonimie, *ib.* — Bibliographie, 346. — Caractère, 347.

Sous-espèce I. Manie vulgaire, 347.

II. Manie périodique, 347.

Genre XXX. Salacisme, 347. — Ethymologie, *ib.*

— Synonymie, 348. — Caractère, *ib.*

Espèce I. Masculin, 348. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Satyriase des jeunes-gens, 348.

II. Satyriase furieux, 348.

Espèce II. Féminin, 349. — Synonymie, *ib.* — Bi-

bliographie (a), *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Nymphomanie salacitique, *ib.* — B. Nymphomanie furibonde, 350.

Sous-espèce I. Métromanie douloureuse, 350.

Sous-espèce II (b).

Genre XXXI. Tonisme, 350. — Ethymologie, *ib.* — Caractère, *ib.*

§. I. Général.

Espèce I. Tétane, 350. — Ethymologie (c), *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (d), 351. — Caractère,

(a) G. A. OSTERTAG, *de metramania*, 1763.

(b) Métromanie (maniaque) avec accès de salacité sans désir du coït. -- Manie hystérique; SAUV., cl. VIII, ord. III, gén. XX, esp. 8.

(c) Spasme universel ou convulsion tonique permanente; P. CAMPET, *traité pratique des maladies graves des pays chauds*, pag. 1.

(d) CRAUS, *diss. de spasmo cynico*; Jena 1677. -- BILGUER, *diss. de tetano*; Argent. 1768. -- MUCKE, *diss. historia tetani nuper observati*; Jena 1770. -- TRNKA, *de tetano*; Vindob. 1777. -- BRONNER, *diss. trismus ex vulnere*; Goetting. 1784. -- CH. FR. G. P. FUNDEL, *observationes de*

352. — Rapports, *ib.* — Variété A. Holotonique, *ib.*
 — B. Opisthotonique, *ib.* — C. Emprosthotonique, *ib.*
 — D. Latéral, *ib.*

Sous-espèce I. Pyrétique, 353.

II. Apyrétique, 353. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.*

Sous-espèce III. Anesthésique, 353. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce IV. Comateux, 353. — Synonymie, *ib.* — Caractère, 354.

§. II. Particulier.

Espèce II. Strabisme, 354. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Vulgaire, 354.

II. Asthénospathique, 354. — Rapports, *ib.*

Espèce III. Trisme, 355. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Neophytique (a), 355.

II. Traumatique, 355. — Bibliographie (b), *ib.* — Rapports, 356.

spasmus tonicis visco albo persanatis; Jena 1784. — Projet d'instruction sur une maladie convulsive, fréquente dans les colonies de l'Amérique, connue sous le nom de *tétanos*; par la Société royale de médecine de Paris; Paris 1786. — LAURENT, mémoire clinique sur le *tétanos* chez les blessés; Strasbourg an v.

(a) Description d'une maladie qui a été funeste à un grand nombre d'enfans dans l'hôpital des femmes en couche de Dublin; par J. CLARKE, dans *the transactions of the royal irish academy*, etc.; Dublin 1790.

(b) ACKERMAN, de *trismo*; Halle 1775.

Sous-espèce III. Cataleptique , 356.

Espèce IV. Torticollis , 357. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Espèce V. Contracture , 357. — Synonymie , *ib.* — Caractère , 358. — Rapports , *ib.*

Espèce VI. Crampe , 358. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Espèce VII. Priapisme , 358. — Caractère , *ib.* — Rapports (a) , *ib.*

Espèce VIII. Catalepsie , 359. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (b) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , 360.

Sous-espèce I. (c). —

Genre XXXII. Narcose , 360. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (d) , 361. — Caractère , 363.

(a) Priapisme pubertique ; CAMPER , *prix de l'académie de chirurgie* . tom. V , part. II , pag. 844.

(b) ALBINUS , *de catalepsi* ; Franc. 1690. -- CAMERARIUS , *de catalepsi epilepticâ* ; Tubing. 1690. -- BRÉNDÉL , *de catalepsi* ; Witeb. 1700. -- WEDEL , *de affectibus soporosis et catalepsi* ; Jena 1708. -- DIONIS , *dissertation sur la mort subite et la catalepsie* ; Paris 1718. -- EHLEN , *de catalepsi* ; Herbig. 1754.

(c) Epilepsie cataleptique ; REHFELD , *morbi singularis epileptico cataleptici opis potissimum sanati historia* ; Gryphisw. 1788.

(d) SCHEID , *de ossiculis in cerebro humano mulieris apoplexiâ extinctæ* ; Argentor. 1687. -- HUGON , *de apoplexiâ* ; Basil. 1704. -- WUCCHERER , *de apoplexiâ* ; Erf. 1718. -- LUDOLFF , *diss. de apoplexiâ* ; Erf. 1722. -- SCHMID , *diss. sistens extinctum apoplexiâ ab hæmorrhoidibus suppressis* ; Altd.

Espèce I. Narcose modérée, 363. — Caractère, *ib.*
— Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Cataphore, 363. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, *ib.* — (a). — Caractère, *ib.* — Rapports,
364.

Sous-espèce II. Carus, 364. — Synonymie, *ib.* —
Caractère, 365. — Rapports, *ib.* — Variété A. Carus
solaire, *ib.* — B. Catoche diurne, *ib.*

Espèce II. Narcose violente, 365. — Caractère,
ib.

Sous-espèce I. Apoplexie, 365. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, *ib.* — Caractère, 366. — Rapports, *ib.*

Genre XXXIII. Clonisme, 367. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, *ib.* — Bibliographie (b), *ib.* — Carac-
tère, *ib.*

1723. -- STEVART, de *apoplexiâ*; Edinb. 1777. -- LANG,
de *apoplexiâ*; Frib. 1781. -- NICOLAI, diss. de *apoplexiâ*;
Jena 1781. -- CH. G. TH. KORTUM, de *apoplexiâ nervosâ*;
Goetting. 1785; et coll. de FRANK, vol. VI, pag. 1.

(a) EYSEN, de *comate somnolento*, Basil. 1674. -- EYSEL,
de *comate somnolento*, observato et curato; Erford 1704. --
J. F. CARTHEUSER, de *typhomaniâ*; Franc. ad Viad. 1750.

(b) VATER, de *morbis convulsivis*; Witeb. 1708. -- FIS-
CHER, de *convulsionibus habitualibus ex terrore*; Erford 1727.
-- TIDEMANN, de *motibus convulsivis infantum*; Groning.
1746. -- H. P. JUCH, de *convulsionibus*; Erfordt 1751. --
BÜCHNER, de *salutaribus et noxiis motuum convulsivorum symp-
tomaticorum effectibus*; Halæ 1762. -- A. F. WEDENBERG,
de *stramonii usu in morbis convulsivis*; Upsal. 1775; et coll.
de BALDINGER, tom. II, pag. 95. -- BAUMER, de *convul-
sionibus clonicis*; Giessæ 1778. -- GUILLEMIN, an in con-

Espèce I. Eclampsie , 367. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 368. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Espèce II. Epilepsie , 368. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (a) , 369. — Caractère , 370. — Rapports , *ib.*

Sous-espèce I. Précursive , 371.

II. Aprécursive ou subite , 371.

III. (b).

vulsionibus et motibus convulsivis indistinctus opii usus ? Nancy 1785.

(a) HEINRICI , de *epilepsiâ* ; Halæ 1710. -- ZWINGER , de *epilepsiâ* ; Basil. 1714. -- BECK , de *epilepsiâ* ; Basil. 1715. -- ALBERTI , de *epilepsiâ* ; Halæ 1718. -- J. J. STAHL , de *morbo caduco* ; Erford 1730. -- ROLFINCK , de *epilepsiâ* ; Jenæ 1737. -- KORTUM , de *epilepsiâ* ; Duisb. 1766. -- L. E. HIRSCHS , *gedanken die heilungs art der hinfallenden sucht betreffend* ; Berlin 1767. -- BALDINGER , de *epilepsiâ ex tumore duræ matris scirrhuso et carie cranii* ; Jena 1771. -- F. A. HOFFMANN , de *epilepsiâ* ; Vienn. 1776. -- SIGWART , de *puellâ post mensium suppressionem epilepticâ* ; Tübing. 1780. -- BROWN ; de *epilepsiâ* ; Edinb. 1781. -- J. F. CAPPEL , de *epilepsiâ ex tumore nervo vago inhærente* ; Helmst. 1781. -- REHFELD , *analecta historica ad theoriam epilepsiæ* ; Gryphisw. 1788. -- H. B. MITHOF , de *sede irritamenti in epilepsiâ aspersis practicis analectis* ; Goetting. 1789.

(b) Imitative.

L'attaque n'est déterminée que par l'impression que fait la vue d'un épileptique.

Rap. A. Histoire d'une maladie convulsive extraordinaire ; JUSSY , *journal de médec. milit.* , tom. 11 , pag. 53. -- LORENTZ , *ibid* , pag. 202-207. -- BAUMES , *ibid* , pag. 211.

B. Epilepsie par imitation , etc. ; J. L. MOREAU de la Sarthe , *journal de méd. de SEDILLOT* , tom. VI , pag. 226.

Espèce III. Convulsion , 371. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 372. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Espèce IV. Palpitation , 374. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (a) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Vive , 375. — B. Foible , *ib.*

Espèce V. Hoquet , 375. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (b) , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*

Sous-espèce I. Epileptico-maniaque , 376.

II. (c).

Espèce VI. Eternuement , 376. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (d) , *ib.* — Caractère , *ib.*

Genre XXXIV. Toux , 376. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (e) , 377. — Caractère , *ib.*

Espèce I. Simple , 377.

Sous-espèce I. Accidentelle , 377. — Rapport , *ib.*

II. Gutturale , 377.

III. Xérolaryngée , 378.

IV. Indéterminée , 378.

Espèce II. Quinteuse , 378. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie (f) , *ib.* — Caractère , 379.

(a) FELZ , *de palpitacione cordis* ; Basil. 1694. -- LUDOLFF , *palpitationis cordis pathologia et therapia* ; Erfordt 1727.

(b) J. B. N. *de singultu* ; Monspel. 1764. -- TSCHUDI , *de singultu* ; Basil. 1767.

(c) Hoquet périodique ; JAURION , *rec. pér. de la soc. de méd. de Paris* , tom. II , pag. 348.

(d) M. HOFFMANN , *ptarmographia* ; Altdorff 1710. -- SIDREN , *de sternutatione* ; Upsal. 1779.

(e) REINHARD , *de tussi* ; Altdorff 1700.

(f) I. C. GEHLER , *de tussi epidemica infantum convulsiva* , etc. ; Rostoch 1763. -- GREST , *de tussi convulsiva* ;

Genre XXXV. Asthme , 379. — Ethymologie , *ib.*
— Caractère , *ib.*

Espèce I. Paroxistique ; Asthme , 379. — Synonymie ,
ib. — Bibliographie (a) , 380. — Caractère , 381. — Rap-
port , *ib.*

Sous-espèce I. Humide , 381.

II. Sec , *ib.* — (b).

Formes , 381. — Sortes , *ib.*

Espèce II. Suffocant ; Orthopnée , 382. — Syno-
nimie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports (c) , 383.

Argent. 1778. -- C. F. NURNBERG , *diss. super pertussi ani-*
madversiones quasdam continens ; Witemb. 1783. -- FAIRT-
LOUGH , *de pertussi* ; Edinb. 1785. -- GALLEY , *de tussi con-*
vulsiva ; Edinb. 1785.

(a) DE BERGER , *de difficultate respirandi* ; Witeb. 1700.
-- EYSEL , *de caduco pulmonum* ; Erfordt 1705. -- FRAN-
KENAU , *de asthmate* ; Regiom. 1706. -- WEDEL , *de asth-*
matis mechanicâ ; Jena 1700-17. -- VAGNER , *de asthmate* ,
Hafn. 1706. -- ETMULLER , *de asthmate* ; Lipsiæ 1710. --
ZWINGER , *nosographia anhelantium* ; Basil. 1714. -- VATER ,
de ægris asthmaticis rite judicandis et curandis ; Viteb. 1724.
-- ALBERTI , *de spirandi difficultate* ; Halæ 1726. -- G. ABER-
NETHIE , *de asthmate* ; Edinb. 1754 ; et coll. d'Edimbourg ,
vol. II , pag. 95.

(b) EYSEL , *de caduco pulmonum* ; Erfordt 1705. -- Asthme
causé par la poussière de Pipécacuanha ; G. SCOTT , *gazette*
salutaire , ann. 1776 , n.º XLIII.

(c) C. F. KALTSCHMID , *de catarrho suffocativo* ; Jenæ
1763. -- E. A. NICOLAI , *de catarrho suffocativo* ; Jenæ 1763.
-- COOKSON , *de asthmate infantum suffocativo* ; Edinburg-
1780.

Espèce III. Continu ; Dyspnée , 383. — Synonymie ,
ib. — (a). — Caractère , 384.

Sous-espèce I. (b).

Genre XXXVI. Phthisie , 384. — Ethymologie , ib.
— Caractère , ib.

Espèce I. Pulmonaire , 385. — Synonymie , ib. —
Bibliographie (c) , ib. — Caractère , 388. — Rapport ,
389.

(a) Bibl. LAVATER , de *dyspnœa* ; Basil. 1715. -- J. F. CARTHEUSER , de *diversissimâ dyspnœa origine et curatione* ; Francof. ad Viad. 1753.

(b) Dyspnée lunaire ; A. FRANZERI , *memoria sobre una dificultad de respirar periodica , que manifiesta el influxo de la luna en el cuerpo humano* , etc. --- HALLÉ , *journal de médecine par CORVISARD* , tom. 1 , pag. 387. -- *Bulletin des sciences* , 2. année , n.º III , pag. 119.

(c) CH. BENNET , *theatri tabidorum vestibulum* , etc. ; Lond. 1654-57. -- *Tabidorum theatrum* , etc. ; Francof. 1665 ; Leydæ 1714-42 , Florent. 1755. -- R. MORTON , *phthisiologia , sive exercitationes de phthisi* ; Lond. 1689. -- BUGNOT , de *tabe pulmonali* ; Basil. 1705. -- WEDEL , de *phthisi* ; Jenæ 1714. -- VATER , de *ægris phthisicis et tabidis* ; Witeb. 1726. -- FISCHER , *diss. exhibens phthiseos cognitionem et curationem* ; Erfordt 1628. -- J. ARMSTRONG , de *tabe purulentâ* ; Edinb. 1732 ; et coll. d'Edimbourg , vol. 1 , pag. 61. -- J. G. BRENDDEL , de *phthiseos hecticæque discrimine et setaceorum utrobique usu* ; Gotting. 1754. HEUMANN , *observationes quædam anatomicæ ex corpore phthisici enecati desumptæ* ; Erford 1776. -- SHADWELL , de *phthisi pulmonali* ; Edinb. 1777. -- WEBER , de *phthisi pulmonali post hepatitisem exortâ* , etc. ; Argentor. 1779. -- CH. F. JÆGER , *corticis peruviani in phthisi pulmonali historiam et usum exhibens* ; Tubing. 1779 ; et coll.

Sous-espèce I. Phthisie pulmonaire de naissance , 389.
— Rapports , *ib.*

Sous-espèce II. Phthisie hémoptique , 389. — Bibliographie , 390. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce III. Phthisie colliquative , 390. — Variété A. Diarrhée colliquative , 391. — B. Ephidrosique , *ib.*

Espèce III. Hépatique , 391. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — (a).

Espèce IV. Ovaire , 392. — Caractère , *ib.*

Espèce V. Cellulaire , 393. — Caractère , *ib.*

Genre XXXVII. Gastroxie , 393. — Ethymologie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Espèce I. Boulimie , 393. — Synonymie (b) , *ib.* — Bibliographie (c) , 394. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce I. Voracique (d) , 394.

II. Cardio-synopale , 394.

III. Emétique , 395.

de BALDINGER , vol. VI , pag. 140. -- S. F. SIMMONS , *practical observations on the treatment of consumptions* ; Lond. 1780.

-- J. DE LONGROIS , de la pulmonie , etc. ; Paris 1781. --

D. VICI , *dissertazione sopra la tisi e la polmonale* ; Napoli 1781. -- OBERLEIN , *de phthisi ex ulcere* ; Giessæ 1782.

(a) *Rap. A.* Toux hépatique : SAUV. , cl. V , ord. I , gen. V , esp. 9.

(b) Polyphagie.

(c) J. F. CARTHEUSER , *de appetitu alimentorum præternaturali* ; Francf. ad Viad. , 1760. -- J. S. A. WOGAW , *de fame naturali et præter naturam auctâ* ; Jenæ 1774.

(d) Voracité remarquable ; BLANE , *account of a man* , etc. ; biblioth. britannique , *scienc. et arts* , tom. XIV , pag. 84. -- PERCY , *bull. des scienc.* , n.º III , 6. année , tom. III , pag. 119.

Espèce II. Polydipsie, 395. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — (a).

Espèce III. Antropophagie, 395. — Bibliographie (b), *ib.* — Caractère, *ib.*

Genre XXXVIII. Algie, 395. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (c), *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapports, (d), 397. — Formes, *ib.* — Sortes (e), *ib.*

(a) *Rap. A. Hydromanie* (fièvre, avec desir excessif pour la boisson, des enfans); *gazette salulaire*, année 1777, n.^o XXVIII.

(b) GRUNER, *de antropophago bercano, sectio prior historica*; Jenæ 1781. -- F. G. A. DE HATZFELD, *de antropophago bercano*; Jenæ 1781.

(c) J. MONTHEIT, *de dolore*; Edinb. 1726; et coll. d'Edimbourg, vol. 1, pag. 1. -- J. JUNKER, *de doloribus eorumque causis generatim*; Halæ Magdeb. 1755.

(d) B. Prurit; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. 1, vagues; gen. VIII. -- LINNÉ, cl. IV, douloureuses, ord. II, extrinsèques; gen. LXIV. -- VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. XXXVI. -- SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. 1, vagues; gen. VIII.

Bibl. WEDEL, de pruritu; Jena 1696. -- SOMMER, *de pruriginosis affectibus senum*; Altd. 1727. -- LOESCHER, *de pruritu senili totius corporis*; Witeb. 1728. -- ALBERTI, *de affectibus pruriginosis*; Halæ 1743. -- SEEGER, *de pruritu*; Lips. 1756.

C. Anxiété; SAUVAGES, cl. VII, douleurs; ord. 1, vagues; gen. V. -- LINNÉ, cl. V, mentales; ord. III, pathétiques; gen. LXXXIX. -- VOGEL, cl. IV, douleurs; gen. CXXXIV. -- SAGAR, cl. IV, douleurs; ord. 1, vagues; gen. V.

Bibl. SCHELHAMMER, de anxietate præcordiali; Jen. 1694. -- DE BUCHNER, *de causis anxietatis ægrotantium, ejusque curatione*; Halæ 1747. -- HAMBERGER, *de anxietatibus*; Jen. 1751.

(e) Hoquet douloureux; SAUV., cl. V, ord. 1, gen. IV, esp. 17.

Espèce I. Céphalalgie , 397. — Bibliographie (a) ,
 ib. — Caractère , 398.

Sous-espèce I. Gravative , 398. — Synonymie , ib. —
 Bibliographie , ib. — Caractère , ib. — Rapports , 399.
 — Sortes (b).

Sous-espèce II. Tensive , 399. — Synonymie , ib. —
 Bibliographie (c) , ib. — Caractère , ib. — Rapport , ib.

Sous-espèce III. Fixe , 399. — Synonymie , ib. — Bi-
 bliographie (d) , 400. — Caractère , ib. — Rapport , ib.

Espèce II. Prosopalgie , 400. — Ethymologie , ib. —
 Synonymie (a) , ib. — Bibliographie , ib. — Caractère ,
 ib.

(a) KROKIS , *de cephalalgia habituali cum vertigine* ; Regiom.
 1703. -- HANNEMANN , *de dolore capitis et epilepsia* ; Kilicæ
 1706. -- HELVIG , *de cephalalgia* ; Lugd. Batav. 1719. -- FR.
 HOFFMANN , *de dolore cephalico* ; Halæ 1731. -- JUNCKER ,
de doloribus capitis, scandalo medicorum difficulter removendo ;
 Halæ 1741. -- BEIFFUS , *de dolore capitis* ; Giessæ 1749. --
 W. TRNKA , *historia cophoseos et barycecia* ; Vindob. 1778.
 -- PLOUCQUET , *de cephalalgia* ; Tubing. 1787.

(b) Formes. Sor. 1. Agrypnie céphalalgique ; SAUV. , cl.
 VIII , ord. IV , gen. XXII , esp. 4. -- 2. Hoquet céphalique ;
 SAUV. , cl. V , ord. I , gen. IV , esp. 24.

(c) F. HOFFMANN , *de cephalæa* ; Halæ 1735. -- HESSLER ,
de cephalæa ; Erford 1743.

(d) CAMERARIUS , *de clavo* ; Tubing. 1703. -- EYSEL , *de*
cephalagra periodicâ ; Erfordt 1703. -- EGER , *de hemicrania* ;
 Halæ 1738. -- JUNCKER , *de hemicrania horologica* ; Halæ
 1747. -- ROSSEL , *de ovo cephalææ specie* ; Argentor. 1755.
 -- SCHOBELT , *de hemicrania* ; Berol. 1776. -- NICOLAI ,
hemicraniæ therapia ; Jena 1788.

(e) Affection particulière très-douloureuse de la face ; FO-
 THERGILL , *medical observations and inquiries etc.* ; Lond. 1776.

Espèce III. Oralgie, 401. — Ethymologie, *ib.* —
Synonymie, *ib.* — (a). — Caractère, *ib.*

Espèce IV. Ophtalgie, 401. — Ethymologie, *ib.* —
Synonymie, *ib.* — Caractère, 402. — Rapport, *ib.*

Espèce V. Odontalgie, 402. — Ethymologie, *ib.* —
Synonymie, *ib.* — Bibliographie (b), *ib.* — Caractère,
402.

I.^o Odontalgie gingivale, 404. — Synonymie, *ib.* —
Bibliographie (c), *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Nerveuse, 403.

II.^o Maxillaire, 403. — Rapport, *ib.* — Formes,
404. — Sortes (d), *ib.*

(a) Bibl. WAREN, *de catarrho et ex eo descendente otalgia*,
etc.; Rostoch 1663. -- VOLKAMER, *de otalgia*; Altorft 1733.
-- KALTSCHMID, *de otalgia*; Jena 1749.

(b) SENNERT, *de dentium dolore*; Witteb. 1629. -- ZEIDLER,
de dolore dentium; Lips. 1631. -- WAREN, *de catarrho et
ex eo descendentes odontalgia*, etc.; Rostoch 1663. -- PAULI,
de dolore dentium; Hafn. 1639. -- ROLFINCK, *de odontalgia*;
Jena 1669. -- STISLER, *de odontalgia*; Lugd.-Batav. 1675.
-- VESTI, *de odontalgia*; Erfordt 1697. -- SCHELAMMER,
de odontalgia tactu sananda; Jena 1701. -- J. DE FRITSCH,
de dentibus; Viennæ 1772. -- J. HUNTER, *a practical treatise
on the diseases of the teeth*; Lond. 1778. -- PLISSON,
*observation sur un nouveau moyen de guérir certaines douleurs
des dents*; Lyon 1788.

(c) WEDEL, *de dentitione infantum*; Jena 1678. -- F. CH.
ÖTTINGER, *de ortu dentium et symptomatibus quæ circa den-
titionem infantum occurrunt*; Tubing. 1770. -- J. J. PLENCK,
de morbis dentium ac gingivarum; Viennæ 1778. -- H. S. JACK-
SON, *physiologia et pathologia dentium eruptionis*; Edinb. 1778.
J. L. G. KEBEL, *de dentitione difficili*; Lips. 1806.

(d) Strabisme oclaxistique; M. HERZ, *journal der practis-*

II.° Odontalgie dentaire, 404. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Carieuse, 404. — Rapport, 405. —

(a).

Sous-espèce II. Maxillaire, 405.

III.° (b).

Espèce VI. Œsophagie, 405. — Ethymologie, *ib.*

— Synonymie, *ib.* — Bibliographie (c), *ib.* — Carac-

rière, *ib.*

Sous-espèce I. Libre, 406. — Rapport, *ib.*

II. Empêchée (d), 406. — Rapports, *ib.*

III. (e).

chen arzneykunde und wundarzneykunst, etc., par HUFELAND, vol. III.

(a) *Formes*. Sor. 1. Migraine odontalgique; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIII, esp. 2.

(b) III.° Odontalgie (dento-gingivale) par la transplantation des dents.

Rap. A. Ulcères à la gorge, au palais, avec éruption à la peau, à la suite des dents transplantées; DUNCAN, *medical commentaries*, ann. 1785. — WATSON, *medical transactions*, vol. III. G. SPENCE, mémoire sur une maladie qui vient quelquefois à la suite de la transplantation des dents; *journ. de médec. de BACHER*, tom. XCII, pag. 149.

(c) CH. CH. HAASE, *diss. medic. sistens causas difficilis deglutitionis*, etc.; Gotting. et Strasb. 1781. — J. BLEU-LAND, *observat. anatom. med. de sanâ et morbosâ œsophagi structurâ*; Leydæ 1785.

(d) *Voy.* T. BORDENAVE, *de corporibus extraneis intra œsophagum hærentibus*; Paris 1763.

(e) Jeu de nature (*dysphagia lusoria*); D. BAYFORD, *memoirs of the medical society of London*, vol. II; Lond. 1788, art. XXIV.

— Espèce VII. Sternalgie, 406. — Ethymologie, *ib.* —
Synonymie, *ib.* Bibliographie (a), 407. — Caractère,
ib. — Observation, *ib.*

— Espèce VIII. Gastéralgie, 408. — Ethymologie, *ib.*
— Caractère, *ib.*

— Sous-espèce I. Cardialgie, 409. — Ethymologie, *ib.*
Synonymie, *ib.* — Bibliographie (b), *ib.* — Caractère,
ib. — Variété A. Flatulente, 410. — B. Infantile, *ib.*
— C. Organique, *ib.*

— Sous-espèce II. Gastrodynie, 410. — Ethymologie,
ib. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A.
Flatulente, 411. — B. Périodyne, *ib.* — C. Astrin-
gente, *ib.* — D. Attérente, *ib.*

— Sous-espèce III. Pyrose, 411. — Ethymologie, *ib.*
— Synonymie, *ib.* — (c). Caractère, *ib.* — Rapport,

(a) G. B. SCHÖEFFER, *de anginâ pectoris vulgò sic dictâ*;
Gotting. 1788.

(b) POLZ, *de cardialgiâ*; Groning. 1704. -- SPERLING,
de cardialgiâ; Witeb. 1704. -- ZEHNER, *de cardialgiâ*; Witeb.
1704. -- WEDEL, *de cardialgiâ ex epitome praxeos clinicæ*;
Jen. 1719. *De cardialgiâ*; Jen. 1742. -- SCHAPER, *de cardialgiâ*;
Rostoch 1720. -- SENNERT, *de cardialgiâ*; Witeb. 1722. --
LUDOLFF, *dissert. sistens casum cardialgiæ*; Erfurt 1725. --
VAN DER DOES, *de cardialgiâ*; Lugd.-Batav. 1725. -- GÖ-
LIKE, *de cardialgiâ syncopica*; Franc. ad Viad. 1727. -- HOFF-
MANN, *de dolore cardialgico*; Halæ 1731. -- J. STAHL,
de cardialgiâ; Erfurt 1731. -- VIERTHALER, *de colico ven-
triculi spasmodico*; Lugd.-Batav. 1732. -- ALBERTI, *de co-
llicâ ventriculi*; Halæ 1735. -- JUCH, *de cardialgiâ*; Erfurt
1743. -- CARTHEUSER, *de cardialgiâ spuria*; Franc. 1745. --
ORTH, *de cardialgiâ*, etc.; Wirceb. 1750. -- LUTHER, *de
cardialgiâ*; Erfurt 1776.

(c) Bibl. LUDOLFF, *de ardore ventriculi*; Erfurt 1722. --

412. — Variété A. Suédoise, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce IX. Entéralgie, 412. — Ethymologie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Cholérée, 412. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (a), 413. — Caractère, 414. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce II. Iléose, 414. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (b), 415. — Caractère, *ib.* — (c). — Variété A. Spasmodique, 416. — B. Volvuleux, *ib.*

Sous-espèce III. Colique, 416. — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (d), *ib.* — Caractère, 417. — Variété

J. BLACK, de humore acido à cibus orto et magnesiâ; Edinb. 1754; et coll. d'Edimbourg, vol. 11, pag. 271.

(a) METTFORD, de cholera; Edinb. 1777. -- LYONS, de cholera; Edinb. 1785.

(b) SCHACHER, de morbis à situ intestinorum præternaturali; Lips. 1721. -- SCHODER, de mutuo intestinorum ingressu; Stet. 1729. -- BOSE, de coalitus viscerum ventris historia; Lips. 1776. -- CH. G. L. HEYNE, de ileo, etc.; Gotting. 1784. -- D. RAHN, de passionis iliaceæ pathologia; Halæ 1791. -- Voyez tom. III de cet ouvrage, pag. 430, rap. B.

(c) Rap. A. Coliques iliaques nerveuses; P. J. BARTHEZ, mém. de la soc. médic. d'émulat., 3.^e ann., pag. 402.

(d) ANHORN, de colicâ; Basil. 1705. -- EYSEL, de colicâ passione; Erfurt 1716. -- M. ALBERTI, de colicâ hæmorrhoidali; Halæ 1718. -- FABRICIUS, de colicâ; Rostock 1720. -- VATER, de passionibus colicis et iliacis prudenter attendendis et curandis; Witeb. 1726. De passione colicâ et hysterica; Witeb. 1726. -- JUCH, de colicâ simplici; Erfurt 1732. -- J. A. VEDEL, de colicâ; Jen. 1739. -- TEYCHMEYER,

A. Spasmodique , *ib.* — B. Biliëuse , 418. — C. Ven-
teuse , *ib.*

Sous-espèce IV. Tenesme , 418. — Ethymologie , *ib.*
— Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Spon-
tané , 419. — B. Indien , *ib.* — C. Oriental , *ib.*

Espèce X. Proctalgie , 419. — Ethymologie , *ib.* —
Synonymie , *ib.* — Caractère , 420. — Variété A. Inter-
trigineuse , *ib.* — B. Brésiliëne , *ib.*

Espèce XI. Hépatalgie , 420. — Ethymologie , *ib.* —
Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Infarc-
tive , *ib.* — B. Pétitiëne , 421. — C. Ictérique , *ib.*

Espèce XII. Splénalgie , 421. — Ethymologie , *ib.*
— Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Espèce XIII. Néphralgie , 422. — Ethymologie , *ib.*
— Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Espèce XIV. Cystalgie , 422. — Ethymologie , *ib.* —
Caractère , *ib.*

Espèce XV. Mictalgie , 422. — Ethymologie , *ib.* —
Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 423. — Caractère , *ib.*
— Variété A. Dysurie primitive , *ib.* — B. Coïtique ,
ib. — C. Néonymphale , *ib.* — D. Chronique , *ib.*

Espèce XVI. Elytralgie , 424. — Ethymologie , *ib.*
— Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère ,
ib.

Espèce XVII. Méturalgie , 424. — Ethymologie , *ib.*
— Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapports , 425.

*de doloribus colicis ; Jenæ 1740. -- JUNCKER , de morbis co-
licam consequentibus ; Halæ 1749. -- STOCK , de ictero colicæ
juncto ; Jenæ 1757. -- LANGGUTH , de diversâ colicam curandi
methodo ; Witeb. 1762.*

Espèce XVIII. Didymalgie , 425. — Ethymologie ,
ib. — Caractère , *ib.*

Espèce XIX. Arthronalgie , 425. — Ethymologie ,
ib. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Carac-
 tère , *ib.*

Sous-espèce I. Entorse avec irritation , 425. — Ca-
 ractère , 426.

Sous-espèce II. Entorse avec inflammation , 426. —
 Caractère , *ib.*

Sous-espèce III. Entorse avec suppuration , 426. —
 Caractère , *ib.*

FIN de la table analytique des matières du Tome II.

ERRATA.

PAGE 15, ligne 7 de la note, trouve-t-elle, lisez se trouve-t-elle.

Page 26, ligne 24, mélancolie, lisez vésanie.

Page 40, lignes 21 et 22, supprimez ces deux lignes.

Page 58, lignes 16 et 17, supprimez des forces.

Page 78, ligne 10, 4.^e partie, lisez 1.^e partie.

Page 83, ligne 19, rejection, lisez sortie active.

Page 103, ligne 11, après 1798, lisez et coll. de BRERA, tom. IV, pag. 1.

Page 184, ligne 3, 1085, lisez 1686.

Page 243, ligne 18, tome II, pag. 55, lisez tome III, pag. 55 et 103.

Page 305, ligne 16, S-esp. VII, lisez S-esp. VIII.

Page 320, ligne 14, sommeii, lisez sommeil.

Page 324, lignes 19 et 20, supprimez ces deux lignes et transportez-les au commencement de la page 326, à la 2.^e ligne.

Page 326, ligne 1, Esp. III, lisez Esp. II.

Page 332, ligne 25, Esp. IV, lisez Esp. III.

Page 359, ligne 16, 1754, lisez 1750.

Ibid, ligne 17, Herschell, lisez Hirschell.

Page 364, ligne 18, hypophose, lisez hypophase.

Page 371, ligne 6, esp. 8, lisez esp. 6.

Page 379, ligne 10, après convulsiva, lisez Viennæ 1780.

Page 413, ligne 25, après cholera, lisez Viennæ 1781.

Page 452, ligne 17, fiévreuse, lisez fiévreux.